

Maurizio Sighele*, Fausta Lui**

LA FENOLOGIA DELLE STERNE (*STERNIDAE*) IN PROVINCIA DI VERONA E SUL LAGO DI GARDA

Un singolo individuo di Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* sverna da alcuni anni nel basso Lago di Garda nel comune di Peschiera del Garda (Verona), osservato prevalentemente nel porticciolo turistico di Porto Bergamini. Il primo anno la specie pose dei dubbi di identificazione, probabilmente per la scarsa dimestichezza col piumaggio invernale di questa specie; l'osservazione invernale di *Sternidae*, infatti, non è molto frequente in Italia. Traendo spunto da questi avvistamenti, vengono qui considerate le segnalazioni presenti in letteratura di esemplari appartenenti a questa famiglia per la provincia di Verona e sul Lago di Garda, con l'aggiunta di numerosi dati non precedentemente pubblicati (da osservazioni personali degli autori o comunicate da altri). Da questa revisione risulta che nel Veronese non esistono altre segnalazioni invernali di *Sternidae* oltre a quelle del Mignattino piombato di Peschiera e, per quanto riguarda le osservazioni in periodo di passo o in quello estivo, le sole specie avvistate con una regolarità sono la Sterna comune *Sterna hirundo*, il Fraticello *Sterna albifrons* ed il Mignattino *Chlidonias niger*.

Indirizzi degli autori:

*Via Lungolori 5a, 37127 Verona (maudoc@ebnitalia.it)

**Via delle Rose 30, 41100 Modena (fausta@unimore.it)