Monitoraggio del GRILLAIO *Falco naumanni* in provincia di Verona

dati preliminari

Roberto Lerco • Maurizio Sighele

Associazione Verona Birdwatching



Segnalazioni di grillaio in provincia di Verona negli anni 2012-2014 in periodo post-riproduttivo



Segnalazioni di grillaio in provincia di Verona negli anni 2012-2014 in periodo pre e post-riproduttivo

Il grillaio (*Falco naumanni*) è specie che visita il Veneto solo durante i passi migratori. Considerato piuttosto sporadico fino alla metà degli anni 90 del XX secolo, in seguito questo falco è stato regolarmente osservato nei settori orientali della regione, seppur non abbondante, quasi esclusivamente in provincia di Venezia e di Treviso durante la migrazione pre-nuziale.

In provincia di Verona tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo il grillaio era ritenuto di doppio passo regolare dagli autori dell'epoca; osservato assieme al falco cuculo (*Falco vespertinus*), era anche stata ipotizzata la sua sporadica nidificazione.

Ma dopo quel periodo, forse per scarsa attenzione o per la difficoltà di distinguerlo dal gheppio (*Falco tinnunculus*), non si era più avuta notizia di questo falchetto fino a qualche anno fa, a parte una dubbia segnalazione dei primi anni 90 del secolo scorso in periodo tardo autunnale. Nel 2012, invece, il grillaio è stato osservato in Lessinia sia in periodo pre-nuziale che durante la migrazione post-riproduttiva.

In seguito a queste segnalazioni, per aumentare le conoscenze sulla presenza provinciale di questo falco, ipotizzando un suo passaggio in particolare nel periodo post-riproduttivo come agli inizi del XX secolo e considerando che questa specie è ritenuta di interesse comunitario, a partire dal 2013 l'associazione Verona Birdwatching ha promosso un monitoraggio per conoscere meglio la fenologia del grillaio in provincia di Verona.

Le segnalazioni sono state raccolte monitorando le aree collinari che scendono dalla Lessinia centro-orientale. Negli ultimi tre anni, seppur poco numeroso, il grillaio sembra frequentare regolarmente queste zone specialmente tra la seconda metà di agosto e la prima decade di settembre, mentre è più sporadico in periodo pre-nuziale, quando frequenta anche le zone di pianura.