



resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2006



© Copyright 2007 - Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura di), 2007: **Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006.** Parco Naturale Regionale della Lessinia, pp. 24.

In copertina: Zigolo delle nevi, di Maurizio Sighele, e Cincia dal ciuffo, di Roberto Lerco.



resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2006

a cura di

Maurizio Sighele

Paolo Parricelli



Presentazione

In questo resoconto sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti all'avifauna osservata nel corso del 2006 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia o nei territori immediatamente adiacenti. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli erratismi, le curiosità o l'interesse locale.

Sono stati raccolti e analizzati oltre 2.000 dati riferiti a 107 specie diverse di uccelli. Le osservazioni sono state effettuate sia durante il tempo libero, sia durante l'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, sia durante la raccolta dati in corso per un nuovo atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (progetto coordinato da M.Pesente, M.Morbioli e M.Sighele).

Per buona parte le segnalazioni provengono dalla *mailing list* "Verona birdwatching" (*vr bw*), rete telematica dove gli appassionati di birdwatching e di ornitologia possono scambiarsi le informazioni sull'avifauna in provincia di Verona tramite posta elettronica.



Hanno contribuito alla stesura di questo resoconto: Mick Allen, Maurizio Azzolini, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Maurizio Bertacco, Michele Bottazzo, Daniele Comin, Cesare Dal Bosco, Mauro D'offria, Vittorio Fanelli, Maurizio Ferrari, Cristiano Izzo, Roberto Lerco, Laura Lodde, Luca Longo, Fausta Lui, Giancarlo Marconi, Davide Massella, Luca Mazzola, Marco Morbioli, Andrea Nicoli, Paolo Parricelli, Marilena Perbellini, Marco Pesente, Elio Sauro, Greta Serafin, Maurizio Sighele, Luca Signori, Antonia Stringher, Wiebke Werwer.

L'elenco sistematico trae spunto dalle più recenti *check-list* degli uccelli italiani (BRICHETTI & FRACASSO, 2003-2006; BACCETTI *et al.*, 2004; VIOLANI & BARBAGLI, 2006).

La redazione si augura che questo primo resoconto possa ampliare le conoscenze sull'avifauna del Parco e stimolare la crescita di un numero sempre maggiore di osservatori. Si invitano tutti gli appassionati di Natura e gli amici del Parco a dare il proprio contributo per la pubblicazione dei prossimi annuari.



Le osservazioni più interessanti del 2006

Germano reale

Anas platyrhynchos

Questa anatra è osservata con una certa regolarità nelle pozze d'alpeggio, in particolare durante i periodi di passo migratorio.

2 indd. a San Giorgio il 13.08 (C.Izzo).

2 indd. a San Giorgio il 15.11 (M.D'offria).

Gallo cedrone

Tetrao urogallus

Tetraonide molto raro e localizzato nel parco. La Lessinia rappresenta il margine meridionale dell'areale di distribuzione di questa specie.

1 m. è stato avvistato in contrada Masselli di Bosco Chiesanuova il 14.04, dalle ore 8.00 alle 9.30 circa (D.Massella, E.Sauro). Il periodo e il sito d'avvistamento (corti e tetti della contrada) fanno sicuramente etichettare tale soggetto fra quelli cosiddetti "pazzi". Tali esemplari, nella bibliografia della specie ben noti e non così rari, hanno comportamento confidente o aggressivo nel periodo riproduttivo.

1 m. in Val di Revolto, sul Monte Terrazzo, il 26.05 (C.Dal Bosco, A.Stringher).

1 m. adulto ed un gruppo familiare sono stati osservati più volte in loc. Le Gosse di Roverè V.se a partire dal giorno 4.10 (L.Signori, M.Morbioli *et al.*).

Fagiano di monte

Tetrao tetrix

Questa specie è abbastanza facile da contattare in periodo riproduttivo, soprattutto nei settori orientali del parco (DE FRANCESCHI, 1981).

In alta Val di Revolto ascoltati alcuni indd. in canto il 27.04 (M.Morbioli).

Nell'adiacente arena di Campobrun (TN), 4 mm. il 16.05 (M.Bottazzo *et al.*).

In alta Val Fraselle osservati 6 mm. e 1 f. il 19.05 (M.Bottazzo *et al.*).

Nel Valon del Malera: 7-8 mm. in arena di canto l'1.05, il 3.05 e il 6.05 (P.Parricelli, G.Serafin *et al.*); 2-3 mm. l'11.06 (M.D'offria).



Gallo cedrone a Masselli - D.Massella

Francolino di monte***Bonasa bonasia***

Negli ultimi anni sono poche e localizzate le segnalazioni di questo Galliforme in Lessinia; tutte provengono dalla Foresta di Giazza e dall'area di Castelberto.

1 coppia a Malga Terrazzo il 14.04 (M.Morbioli).

Coturnice***Alectoris graeca***

A differenza della precedente, la popolazione di questa specie pare godere di una lenta ripresa negli ultimi anni.

1 o più indd. in canto in loc. Pigarolo il 17.04, il 3.05 e il 17.05 (P.Parricelli, M.D'offria *et al.*). Sempre nella stessa località, alcuni indd. in canto e 2 brigate di 6-8 indd. nel mese di agosto (M.Morbioli, P.Parricelli, G.Serafin, M.Bertacco).

Una covata di 6 juvv. a Malga Malera di Sopra il 26.07 (P.Parricelli, G.Serafin, M.Ferrari). Successivamente, nello stesso sito sono stati osservati 7 indd. il 13.10 e 6 indd. il 6.11 (P.Parricelli, G.Serafin).

Airone cenerino***Ardea cinerea***

Segnalazioni di questa specie (per lo più di soggetti isolati) non sono così rare, anche a quote elevate.

2 indd. a San Giorgio nel mese di agosto (C.Izzo).

1 ind. a San Giorgio il 2.09 e l'8.09 (C.Izzo).

Falco pescatore***Pandion haliaetus***

Questo rapace, migratore abbastanza regolare in provincia, è stato segnalato in passato una sola volta in Lessinia, nel passo primaverile (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002).

Quella del 2.09.2006 a Erbezzo rappresenta quindi la prima osservazione nota effettuata durante la migrazione post-riproduttiva (C.Izzo). La direzione seguita dal soggetto era E->W.

Falco pecchiaiolo***Pernis apivorus***


Specie migratrice trans-sahariana osservata sia nel doppio passo migratorio, specialmente in quello post-riproduttivo, sia come nidificante nelle zone boscate. Si ricordano le segnalazioni di nidificazione accertata o i gruppi in migrazione.

1 coppia in volo a festoni a Marezzane il 7.05 (L.Longo).

1 ind. che trasportava materiale per il nido a Vestenavecchia il 4.06 (R.Lerco, L.Lodde).

25-30 indd. tra Erbezzo e il Monte Tomba il 2.09 (C.Izzo).

52 indd. in quattro ore di osservazione in Lessinia centrale il 2.09 (M.D'offria).





Nibbio bruno con preda a Castelberto - C.Izzo

Nibbio bruno

Milvus migrans

Negli ultimi anni le osservazioni in Lessinia risultano più frequenti rispetto al passato, quando non era considerato nidificante (DE FRANCESCHI, 1991). Alcuni soggetti sono visitatori provenienti dalla vicina Val d'Adige, ma altri probabilmente nidificano nell'area lessinica.

1 ind. a Branchetto il 13.05, trasportava materiale per il nido (R.Lerco).

2 ind. in loc. Pigarolo il 13.05 (M.D'offria, R.Lerco, C.Izzo).

1 ind. a Castelberto il 9.06 con un piccolo mammifero nel becco (C.Izzo).

1 ind. nel Valon del Malera l'11.06 (M.D'offria).

1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria).

1 ind. ai Folignani di Sotto il 10 e il 30.07 (M.Morbioli, M.Sighele).

1 ind. a Spiazoi il 22.07 (C.Izzo, M.D'offria).

Biancone

Circaetus gallicus

Questa aquila migratrice nidifica irregolarmente nel parco, in particolare nei settori centro-orientali.

1 ind. a Malga Cornicello il 20.07 (M.Morbioli).

1 ind. ai Parpari il 22.07 (C.Izzo).

1 ind. a Cima Lobbia il 22.07 (M.Sighele).

1 ind. a Castel Malera il 18.08 (M.D'offria).

3 ind. a Bocca di Selva il 2.09 (C.Izzo).



Falco di palude***Circus aeruginosus***

Specie segnalata una sola volta in passato, nell'aprile 1993 (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002). Interessanti, quindi, le due osservazioni del 2006:

1 f. in volo sopra San Giorgio il 13.05 (C.Izzo, M.D'offria).

2 indd. in migrazione in alta Lessinia il 2.09 (M.D'offria).

Albanella reale***Circus cyaneus***

Specie osservata esclusivamente nei periodi dei passi migratori.

1 m. in caccia sui pascoli di San Giorgio il 27.10 (M.D'offria).

Astore***Accipiter gentilis***

Rapace sedentario della Lessinia, l'osservazione non è però così frequente poiché è poco numeroso e di abitudini abbastanza elusive.

1 ind. in volo territoriale nel Vaio dell'Anguilla, nei pressi del Ponte dell'Anguillara, il 29.03 (C.Izzo).

1 ind. che emetteva vocalizzazioni in loc. Pigarolo il 14.05 (M.D'offria, R.Lerco, C.Izzo).

1 juv. a Squarantello il 29.07 (C.Izzo).

1 juv. a San Giorgio il 2.09 (C.Izzo).

Poiana***Buteo buteo***

Specie piuttosto comune durante tutto il periodo riproduttivo. A partire dal mese di agosto è possibile osservare concentrazioni di parecchi indd., talora posati a terra in caccia di gruppo.

12 indd. sul Monte Belfiore l'11.08 (M.D'offria).

20 indd. tra Erbezzo e il Monte Tomba il 2.09 (C.Izzo).



Aquila reale

Aquila chrysaetos

Dopo le nidificazioni accertate tra il 1995 e il 2000 nell'alta Valle di Giazza, con l'involto di almeno 4 giovani (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), la coppia di aquile presente stabilmente nella Lessinia orientale sembra aver parzialmente abbandonato l'area. A partire dal 2001, nei tre nidi conosciuti e tenuti sotto controllo, non si sono più riscontrate nidificazioni. Tuttavia in tal zona, lo stesso anno e negli anni a seguire, soprattutto nel periodo autunnale, è risultato particolarmente facile osservare giovani soggetti isolati o accompagnati da uno o da entrambi gli adulti. Pertanto è probabile che in questi anni siano stati approntati e utilizzati nuovi nidi nelle confinanti vallate vicentine o trentine (Valli di Recoaro e del Chiampo o Val di Ronchi). Nel 2006, invece, l'8.08 è stato osservato 1 juv. involto da pochissimi giorni che chiedeva cibo a un genitore in Val di Revolto, Sengia Rossa (M.Bertacco), il che fa presumere che la nidificazione sia avvenuta poco distante. Altre segnalazioni:

Monte Potteghe - Val di Revolto: 1 juv. e 1 ad. il 21.08, 1 ind. il 19.11 e il 12.12, 2 indd. il 24.12 e il 28.12 (P.Parricelli, W.Werwer).

San Giorgio - Spiazoi - Merli: 1 ind. il 3.01 e il 14.05; 2 ad. e 1 juv. sono stati osservati in periodo post-riproduttivo dal 2.09 al 31.12 (P.Parricelli, L.Signori, M.D'offria, C.Izzo, G.Serafin, D.Benciolini *et al.*).

Folignani: 1 ind. il 29.03 e il 27.05 (C.Izzo).

Tracchi: 1 ind. l'8.09 (mobbato da 3 Falchi pecchiaioli), il 25.11 e il 23.12 (C.Izzo).

In Lessinia centro-occidentale si possono osservare con una certa regolarità soggetti, sia adulti che giovani, provenienti dall'area del Baldo o forse anche dalla Val d'Adige e dalla Valle di Ronchi, dove, vista la presenza di estese pareti rocciose, non si possono escludere siti di nidificazione mai rilevati finora.

Aquila reale - C.Izzo





La Val di Revolto e l'alta Val d'Illesi, area frequentata dall'Aquila reale - *R.Lerco*

Gheppio

Falco tinnunculus

Nidificante comune in Lessinia, dalla metà di luglio fino alla fine di agosto è possibile osservare concentrazioni di oltre 100 indd. a caccia di ortotteri sugli alti pascoli della Lessinia centrale (M.Morbioli).

Falco pellegrino

Falco peregrinus

La prima nidificazione certa entro i limiti territoriali del Parco (Val di Revolto) è stata documentata nel 1997 (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002). Prima di tale anno, le segnalazioni di Falco pellegrino disponibili erano poco numerose e riguardavano per lo più il periodo invernale o soggetti in migrazione autunnale. Le aree del Parco più idonee per la nidificazione sono le estese pareti rocciose presenti sul Corno d'Aquilio (versante Val d'Adige), nel Vaio dell'Anguilla, in alta Valpantena (Vaio della Marciora e Vaio dei Falconi), in Val Squaranto e in Val di Revolto.

1 ind. in loc. Pigarolo il 17.04 e il 3.05 (P.Parricelli).

1 cp. nel Vaio della Marciora il 13.05 (C.Isotta).

1 nido attivo a Squaranto con la successiva osservazione di un juv. involato il 31.05 e 1 juv. nei pressi della vicina Corbiolo l'1.07 (C.Isotta).

1 cp. a Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria, C.Izzo).

1 ind. ai Fognani di Sotto l'1.07 (M.Sighele).

1 ind in bassa Val Squaranto il 22.07 (C.Izzo).

2 indd. a Spiazoi il 22.07 (C.Izzo, M.D'offria).

1 ind. a Sengia Rossa l'8.08 (M.Bertacco).

1 juv. a San Giorgio il 13.08 (C.Izzo).

1 ind. a Rosaro il 28.10 (L.Lodde, C.Izzo).





Totani mori a San Giorgio - C.Izzo

Totano moro

Tringa erythropus

Questa specie tipicamente legata agli ambienti umidi può essere osservata in Lessinia nei periodi di passo migratorio, specie quello post-riproduttivo, presso le pozze d'abbeverata.

2 indd. a San Giorgio il 9.09 (C.Izzo).

Piro piro boschereccio

Tringa glareola

Analogamente alla precedente, anche questa specie è stata osservata nei periodi di passo migratorio presso le pozze d'alpeggio.

1 ind. nei pressi del Monte Tomba l'1.07 (M.Sighele).

1 ind. a San Giorgio nel mese di agosto (C.Izzo).

Picchio nero

Dryocopus martius

Specie localizzata nel settore centro-orientale del Parco dove insistono i boschi misti di conifere e latifoglie più estesi e maturi (Foresta dei Folignani e Foresta di Giazza). Sul finire degli anni '90 la specie è stata oggetto di ricerche condotte in periodo riproduttivo assieme alla Civetta capogrosso. Le indagini effettuate hanno permesso d'accertare la presenza di almeno 4 coppie nidificanti. Le cavità nido sono state localizzate perlopiù su abete bianco e faggio, nella fascia compresa tra i 1300 e 1550 m di altitudine (DE FRANCESCHI & DE FRANCESCHI, 2005).

1 ind. in volo sopra Erbezzo il 6.01 (M.Allen).

1 o più indd. in canto ai Folignani il 29.03, il 6.05 e il 15.07 (C.Izzo, M.Pesente *et al.*).

Alcuni indd. in canto a Malga Terrazzo il 14.04 e il 16.07 (M.Morbioli, M.Sighele).

1 ind. in canto a Sengia Rossa l'8.08 (M.Bertacco).

1 ind. in canto a Malga Derocon il 28.09 (P.Parricelli).

1 ind. ai Folignani il 26.11, il 22.12 e il 26.12 (P.Parricelli).

1 ind. in loc. Madonnina, Val di Revolto il 5.12 (P.Parricelli).

Tottavilla***Lullula arborea***

Questa allodola nidifica abbastanza diffusamente negli alti pascoli della Lessinia. Individui in canto sono stati ascoltati, ad esempio:

il 12.05 a Bocca di Selva (M.Morbioli);

il 13.05 e il 13.06 a Malga Vallina di Sotto (M.Morbioli);

il 15.06 a Malga Campedello (M.Morbioli).

Calandro***Anthus campestris***

Migratore trans-sahariano che nidifica in Lessinia soprattutto al Passo delle Fittanze, a Podestaria e tra San Giorgio e i Parpari da dove viene la segnalazione di 1 juv. il 22.07 (C.Izzo).

Merlo acquaiolo***Cinclus cinclus***

Questo passeriforme legato ai corsi d'acqua montani è facile da osservare lungo il corso del Torrente Fraselle (anche nell'abitato di Giazza) e nel Progno di Breonio. Si ricordano le evidenze di avvenuta riproduzione.

1 ind. a Molinovi, Vestenavecchia, il 10.05, con imbeccata (L.Longo).

1 juv. a Giazza il 22.07 (M.Sighele).



Merlo acquaiolo a Giazza - M.Sighele



Sordone a Bocca di Selva - G.Conca

Sordone

Prunella collaris

Assai sporadica durante il periodo riproduttivo, questa specie è più facile da incontrare, in gruppetti di pochi individui, nei mesi invernali. Le abbondanti nevicate dell'inverno 2005/2006 hanno favorito l'osservazione di alcuni Sordoni nelle poche zone erbose liberate dalla neve, in particolare nel parcheggio che si trova alla partenza del circuito di sci di fondo a Bocca di Selva.

Qui sono stati osservati da 6 a 15 indd. a partire da metà dicembre 2005 fino almeno al 22.01.2006 (M.Morbioli, M.Sighele, D.Comin *et al.*). Inoltre:

6 indd. a Branchetto il 20.01 (C.Izzo).

2-3 indd. a San Giorgio il 3.01 (M.D'offria *et al.*).

Nell'inverno successivo:

In loc. Pigarolo 6 indd. il 3.12, 4 indd. il 12.12 e 8 indd. il 28.12 (P.Parricelli).

10 indd. a Monte Grolla il 12.12 (P.Parricelli).

Cesena

Turdus pilaris

Nidificante con poche coppie tra Branchetto e Bocca di Selva, la Cesena è specie ben più numerosa nei mesi invernali.

100+ indd. a Bocca di Selva il 25.11 (C.Izzo).

Merlo dal collare

Turdus torquatus

Specie che si può osservare durante il periodo riproduttivo nella zona del Valon del Malera e nel comprensorio della Foresta di Giazza, in canto sui mughi. Le segnalazioni del 2006 sono comprese nel periodo tra l'1.05 e il 2.09. Nel Valon del Malera sono stati contattati almeno una decina di maschi cantori (M.D'offria, M.Sighele *et al.*).

Codirossone***Monticola saxatilis***

Questo turdide migratore trans-sahariano nidifica con regolarità, seppur poco numeroso, in Lessinia centro-orientale.

Nel Valon del Malera 2 mm. in canto l'1.05, 1 m. il 6.05, 2 mm. l'1.07 (M.D'offria, M.Sighele *et al.*).

1 ind. con imbeccata a Branchetto il 21.06 (M.Morbioli).

1 juv. involato da poco tra San Giorgio e i Parpari il 22.07 (C.Izzo).

1 juv. assieme ad una coppia di ad. a San Giorgio il 26.07 (M.Perbellini).

1 ind. a Branchetto il 28.10 (R.Lerco, L.Lodde), segnalazione tardiva.

Lùì verde***Phylloscopus sibilatrix***

Questa specie migratrice era considerata nidificante nella zona collinare e montana della provincia di Verona (DE FRANCESCHI, 1991), ma di recente sono assai poche le segnalazioni durante il periodo riproduttivo. Si ricorda questa osservazione, riferibile verosimilmente a ind. in passo migratorio.

1 ind. in canto nel Vaio dell'Anguilla il 16.04 (A.Berardo).

Beccafico***Sylvia borin***

Specie migratrice trans-sahariana per cui non sono note nidificazioni certe in Lessinia (DE FRANCESCHI, 1991). L'unica segnalazione in periodo riproduttivo è quella di 1 ind. in canto al Vaio del Buco, Val di Revolto, il 16.07 (M.Sighele).

Bigiarella***Sylvia curruca***

Anche questo silvide è un migratore trans-sahariano, nidificante nella zona degli arbusti contorti e dei pascoli con cespugli densi.

1 ind. in canto alla Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria, C.Izzo).

1 juv. a Malga Grolla il 24.06 (M.D'offria, C.Izzo).

1 ind. a Fognani di Sotto l'1.07 (M.Sighele).

1 ind. nel Valon del Malera l'1.07 (M.D'offria).

Culbianco***Oenanthe oenanthe***

Migratore piuttosto numeroso e diffuso come nidificante in tutta la Lessinia. Si ricorda una osservazione piuttosto tardiva.

1 ind. a Bocca di Selva il 28.10 (R.Lerco, L.Lodde).

Picchio muraiolo***Tichodroma muraria***

Specie più facile da osservare, a quote basse, durante i mesi invernali. In periodo riproduttivo, invece, le segnalazioni sono assai sporadiche.

1 ind. sul Monte Potteghe, verso la Val di Revolto, il 24.12 (P.Parricelli).

1 ind. al Ponte di Veja il 27.12 (P.Parricelli).

Averla maggiore***Lanius excubitor***

Questo passeriforme visita regolarmente la provincia di Verona nei mesi invernali, ma si tratta sempre di pochi individui.

1 ind. a Bocca di Selva il 7.01 (M.Sighele, A.Nicoli *et al.*).

2 indd. nella zona di San Giorgio il 6.11 (M.D'offria). Successivamente, un singolo ind. è stato osservato fino ai primi di gennaio 2007 (C.Izzo, P.Parricelli, L.Signori, D.Benciolini).

Gazza***Pica pica***

Corvide di cui non è nota la presenza in Lessinia (DE FRANCESCHI, 1986). Si sottolinea pertanto la presenza di 1 ind. in alta Val Squaranto il 27.10 (M.D'offria).

Corvo imperiale***Corvus corax***

Largamente diffuso in tutta la Lessinia, ma poco numeroso; si ricorda la maggiore concentrazione segnalata.

10 indd. nei dintorni di Fosse, verso il Corno D'Aquilio, il 23.01 (V.Fanelli).

Fringuello alpino***Montifringilla nivalis***

Passeriforme osservato soprattutto nei mesi invernali. Nidifica sul Carega, oltre i confini provinciali.

La situazione particolare dell'inverno 2005/2006 già descritta per il Sordone, ha favorito l'incontro piuttosto ravvicinato anche con questa specie a Bocca di Selva, dalla metà di dicembre 2005 a tutto il mese di gennaio 2006.

Sono stati osservati da 12 a 24 indd. (M.Morbioli, M.Sighele, M.Pesente *et al.*).

Un singolo ind. anche a San Giorgio il 9.01 (M.Azzolini).

Per l'inverno successivo, assai poco innevato, è nota una sola osservazione, quella di 5 indd. sul Monte Tomba il 6.11 (P.Parricelli).





Crocieri

Loxia curvirostra

Raramente osservata in periodo riproduttivo, è più facile incontrare questa specie nei mesi invernali, anche in notevoli concentrazioni.

20-60 indd. nella pineta di Santa Viola, Cerro Veronese, osservati almeno dal 3 al 23.01 (G.Marconi, C.Izzo *et al.*).

10-20 indd. alla pineta di San Giovanni in Loffa il 23.01 (V.Fanelli).

Alcuni indd. in canto a Malga Terrazzo il 14.04 (M.Morbioli).

Alcuni indd. a Malga Vallina di Sotto il 13.05 (M.Morbioli).

5 indd. il 26.11 e 8 indd. il 26.12 ai Folignani (P.Parricelli).

Ciuffolotto

Pyrrhula pyrrhula

Fringillide prevalentemente sedentario, in Lessinia risulta abbastanza diffuso, ma piuttosto elusivo.

1 ind. a San Giorgio il 3.01 (M.D'offria, F.Lui).

2 indd. nel Vaio della Marciora il 12.01 (P.Parricelli).

9 indd. ai Tracchi il 27.01 (P.Parricelli).

2-3 indd. nel Vaio dell'Anguilla il 29.03 (C.Izzo).

1 m. in canto poco sotto il Rifugio Revolto il 6.05 (M.Sighele *et al.*).

3-4 mm. in canto ai Folignani l'1.07 (M.Sighele).

15+ indd. a Malga Terrazzo il 16.07 (M.Sighele).

1 ind. ai Folignani il 23.11 (P.Parricelli).

Frosone

Coccothraustes coccothraustes

Passeriforme poco numeroso, visitatore quasi esclusivamente invernale.

4 indd. sul Corno d'Aquilio il 24.01 (V.Fanelli).

Alcuni indd. a San Giorgio il 6.11 (M.D'offria).

Zigolo giallo

Emberiza citrinella

Specie comune nei mesi estivi, nidificante. Si ricorda una segnalazione tardiva.

1 ind. a Bocca di Selva il 17.11 (P.Parricelli).

Zigolo delle nevi

Plectrophenax nivalis

Migratore e svernante irregolare in Lessinia, solo poche unità di questo passeriforme artico raggiungono ogni anno l'Italia. Per questo motivo, l'opportunità di potere osservare alcuni indd. di questa specie con relativa facilità nell'inverno 2005/2006, analogamente a quanto detto per Sordone e Fringuello alpino, ha richiamato a Bocca di Selva numerosi birdwatcher e fotografi, non solo dal circondario. È stato valutato, infatti, che siano accorsi almeno una sessantina di appassionati dalle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Trento, Bolzano, Mantova, Milano, Lodi, Pavia, Modena e Bologna.

La prima osservazione è stata segnalata l'8.12.2005 (M.Morbioli), l'ultima il 30.01.2006 (l'unica che proviene da Passo Fittanze, L.Mazzola), con un massimo di 8 indd. il 4.01 (M.Azzolini).

Per l'inverno successivo è nota una singola segnalazione:

1 ind. in loc. Pozza Morta il 26.11 (P.Parricelli).



Elenco delle specie segnalate nel 2006

Anseriformes

Anatidae

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Galliformes

Tetraonidae

Gallo cedrone *Tetrao urogallus*

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*

Francolino di monte *Bonasa bonasia*

Phasianidae

Coturnice *Alectoris graeca*

Quaglia comune *Coturnix coturnix*

Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Ciconiiformes

Ardeidae

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Falconiformes

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Biancone *Circaetus gallicus*

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Albanella reale *Circus cyaneus*

Sparviere *Accipiter nisus*

Astore *Accipiter gentilis*

Poiana *Buteo buteo*

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Falconidae

Gheppio *Falco tinnunculus*

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Charadriiformes

Scolopacidae

Totano moro *Tringa erythropus*

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Columbiformes

Columbidae

Colombaccio *Columba palumbus*

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo *Cuculus canorus*

Strigiformes

Strigidae

Allocco *Strix aluco*

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Gufo comune *Asio otus*

Apodiformes

Apodidae

Rondone maggiore *Tachymarptis melba*

Rondone comune *Apus apus*



Fagiano di monte - G.Serafin



Scricciolo - G.Serafin



Cesena - R.Lerco



Cincia mora - R.Lerco



Fanello - C.Izzo

Coraciiformes
Upupidae
Upupa *Upupa epops*

Piciformes
Picidae
Torcicollo *Jynx torquilla*
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*
Picchio nero *Dryocopus martius*
Picchio verde *Picus viridis*

Passeriformes
Alaudidae
Allodola *Alauda arvensis*
Tottavilla *Lullula arborea*

Hirundinidae
Rondine *Hirundo rustica*
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*
Balestruccio *Delichon urbicum*

Motacillidae
Calandro *Anthus campestris*
Pispola *Anthus pratensis*
Prispolone *Anthus trivialis*
Spioncello *Anthus spinoletta*
Ballerina bianca *Motacilla alba*
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*

Cinclidae
Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Troglodytidae
Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Prunellidae
Sordone *Prunella collaris*
Passera scopaiola *Prunella modularis*

Turdidae
Tordela *Turdus viscivorus*
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*
Tordo sassello *Turdus iliacus*
Cesena *Turdus pilaris*
Merlo *Turdus merula*
Merlo dal collare *Turdus torquatus*
Codirossone *Monticola saxatilis*
Pettiroso *Erithacus rubecula*
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*
Stiaccino *Saxicola rubetra*
Saltimpalo *Saxicola torquata*
Culbianco *Oenanthe oenanthe*

Muscicapidae
Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Regulidae
Fiorrancino *Regulus ignicapilla*
Regolo *Regulus regulus*

Sylviidae
Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*
Capinera *Sylvia atricapilla*
Beccafico *Sylvia borin*
Bigiarella *Sylvia curruca*

Aegithalidae
Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Paridae
Cincia bigia *Poecile palustris*
Cincia alpestre *Poecile montanus*
Cincia mora *Periparus ater*
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*
Cinciallegra *Parus major*
Cinciarella *Cyanistes caeruleus*

Sittidae
Picchio muratore *Sitta europaea*

Tichodromidae
Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Certhiidae
Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Laniidae
Averla piccola *Lanius collurio*
Averla maggiore *Lanius excubitor*

Corvidae
Ghiandaia *Garrulus glandarius*
Gazza *Pica pica*
Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*
Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*
Cornacchia grigia *Corvus corone cornix*
Corvo imperiale *Corvus corax*

Sturnidae
Storno *Sturnus vulgaris*

Passeridae
Passera d'Italia *Passer domesticus italiae*
Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Fringillidae
Fringuello *Fringilla coelebs*
Peppola *Fringilla montifringilla*
Crociera *Loxia curvirostra*
Verdone *Carduelis chloris*
Lucherino *Carduelis spinus*
Cardellino *Carduelis carduelis*
Fanello *Carduelis cannabina*
Verzellino *Serinus serinus*
Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*
Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Emberizidae
Zigolo giallo *Emberiza citrinella*
Zigolo muciatto *Emberiza cia*
Strillozzo *Emberiza calandra*
Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Bibliografia

- Baccetti N., Fracasso G. & Serra L., 2004: Lista CISO-COI degli uccelli italiani (13.02.2004). Sito web del CISO-COI: www.ciso-coi.org.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2003-2006: Ornitologia italiana. Voll. 1-2-3. A.Perdisa Editore.
- De Franceschi P., 1981: Il Fagiano di monte in provincia di Verona. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 4: 23-28.
- De Franceschi P., 1991: Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 154.
- De Franceschi P., 1986: I Corvidi della Lessinia e del M. Baldo. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 9: 37-42.
- De Franceschi P.F. & De Franceschi G., 2005: Il Picchio nero e altri picidi nidificanti in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 28: 55-60.
- De Franceschi P.F. & Parricelli P., 2002: Aquila reale, Pellegrino ed altri rapaci diurni in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 25: 103-112.
- Violani C. & Barbagli F., 2006: Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes - Psittaciformes*. *Avocetta*, 30 (n.sp.): 5-265.



La Direzione del Parco, che ha promosso e sostenuto la realizzazione di questa pubblicazione allo scopo di offrire informazioni per studio, ricerca o semplice curiosità, ringrazia tutti gli autori delle osservazioni e delle immagini per l'impegno, la passione e la competenza dimostrate.

A tutti loro va il principale e fondamentale merito di questo lavoro.

dott. Diego Lonardoni





Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia

Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
www.lessiniapark.it - parcocultura@lessinia.verona.it
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677



Verona birdwatching

www.maudoc.com/verona/ - info@maudoc.com

