



# resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2007



LESSINIA = MAGIA



© Copyright 2008 - Parco Naturale Regionale della Lessinia  
Comunità Montana della Lessinia

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura di), 2008: **Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2007**. Parco Naturale Regionale della Lessinia, pp. 32.

*Foto di copertina:* Aquila reale, di Roberto Lerco - Piviere tortolino, di Luciano Vinco.



# resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2007

a cura di

Maurizio Sighele

Paolo Parricelli





## ***Presentazione***

Una corretta ed efficace gestione di un'area protetta impone la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le sue variegate e molteplici componenti ambientali. L'acquisizione e la divulgazione d'informazioni relative alla composizione, distribuzione e consistenza del patrimonio faunistico rappresentano senz'altro elementi di primaria importanza.

Sulla base di tali premesse la Comunità Montana della Lessinia, Ente gestore del Parco Naturale Regionale, ha programmato la pubblicazione annuale di questo resoconto che documenta in forma semplice e chiara le osservazioni ornitologiche ritenute più interessanti.

Nel ringraziare gli autori delle segnalazioni e delle immagini per l'impegno, la passione e la competenza dimostrate, mi preme evidenziare come tale lavoro, oltre a costituire una solida base per chi pratica la ricerca scientifica, rappresenti soprattutto un prezioso sussidio per i ragazzi delle scuole e per tutti coloro che intendono approfondire uno degli aspetti più affascinanti del nostro Parco.

*Stefano Marcolini*

*Presidente della Comunità Montana della Lessinia*





Autunno in Lessinia centro-orientale - P.Parricelli

## **Introduzione**

In questo resoconto sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti all'avifauna osservata nel corso del 2007 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia o nei territori immediatamente adiacenti. Sono state selezionate sulla base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli erratismi, le curiosità o l'interesse locale.

Per buona parte le segnalazioni provengono dalla *mailing list* "Verona birdwatching" (*vr bw*), rete telematica dove gli appassionati di birdwatching e di ornitologia possono scambiarsi le informazioni sull'avifauna in provincia di Verona tramite posta elettronica. Le osservazioni sono state effettuate sia durante il tempo libero, sia durante l'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, sia durante i rilevamenti in corso per un nuovo atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (coordinatori M.Pesente, M.Morbioli e M.Sighele).

Quest'anno il resoconto si arricchisce delle informazioni che derivano dall'attività di inanellamento a scopo scientifico svolta all'interno del parco.

Sono state così raccolte e analizzate alcune migliaia di dati riferiti a 122 specie diverse (più una *ssp.*). Hanno contribuito: Mick Allen, Tullio Ballini, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Maurizio Bertacco, Ferruccio Birtele, Mauro Bizzi, Marina Boaretto, Rosalba Boscaini, Giorgio Boschi, Michele Bottazzo, Giorgio Brazzoli, Pierangelo Canali, Chiara Castagna, Carla Chiappisi, Cesare Dal Bosco, Daniele Dal Bosco, Mauro D'offria, Vittorio Fanelli, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Roberto Lerco, Alessandro Leso, Laura Lodde, Luca Longo, Fausta Lui, Luca Mazzola, Marco Melotti, Marco Moiola, Ugo Monicelli, Marco Morbioli, Andrea Nicoli, Roberto Nordera, Paolo Parricelli, Marilena Perbellini, Marco Pesente, Luca Ravizza, Diego Rubolini, Andrea Saorin, Luigi Sebastiani, Greta Serafin, Marco Siliprandi, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Antonia Stringher, Sandro Trevisani, Dario Valbusa, Fulvio Valbusa, Roberta Vignola, Luciano Vinco. Si ringrazia inoltre Bruna Bulgarelli.

L'elenco sistematico trae spunto dalle più recenti *check-list* degli uccelli italiani (BRICHETTI & FRACASSO, 2003-2007; BACCETTI *et al.*, 2004; VIOLANI & BARBAGLI, 2006).

## ***Le osservazioni più interessanti del 2007***

### **Gallo cedrone**

### ***Tetrao urogallus***

Tetraonide molto raro e localizzato nel parco, che rappresenta il margine meridionale dell'areale di nidificazione (BRICHETTI, 1987). Le segnalazioni sono limitate alla zona dell'Alto Vajo dell'Anguilla e a quella tra Le Gosse-Potteghe e la Foresta di Giazza.

Nel Vajo dell'Anguilla: 1 f. con 4 *pulli* osservata ai Folignani a fine giugno (T.Ballini); sempre ai Folignani, fatte e tracce di un bagno di terra di 1 f. sono state rilevate il 26.04 e il 18.09 (P.Parricelli); altre fatte sono state rinvenute in loc. Vallina di sotto il 18.11 (P.Parricelli).

A Le Gosse il 7.04 1 f. si è involata per attraversare la Val di Revolto e raggiungere Terrazzo (P.Parricelli); sempre a Le Gosse sono stati osservati 1 f. a metà settembre (S.Trevisani), 1 m. il 4.11 (P.Parricelli) e ancora 1 f. l'8.11 (S.Trevisani).



Piùme e fatte di femmina di Gallo cedrone ai Folignani - P.Parricelli

### **Fagiano di monte**

### ***Tetrao tetrix***

Questa specie si conferma facile da contattare in periodo riproduttivo nei settori orientali del parco (DE FRANCESCHI, 1981; SIGHELE & PARRICELLI, 2007).

In alta Val di Revolto alcuni indd. in canto tra il 13.04 e il 14.05 (M.Morbioli, P.Parricelli).

A Campobrun (TN) in periodo riproduttivo sono stati contati 5 mm. in arena (M.Bottazzo *et al.*) e successivamente è stata rinvenuta una covata di 6 pulli il 28.06 (R.Nordera).

In Val Fraselle presenza di 5 mm. e 2 ff. il 10.05, occasione in cui si è osservata anche una copula (M.Bottazzo *et al.*).

Nel Valon del Malera contati fino a 6 mm. e 3 ff. in arena tra aprile e i primi di maggio (P.Parricelli, L.Signori, M.D'offria);

1 m. in canto a Bocca Gaibana il 19.04 e l'1.05 (P.Parricelli).

Al di fuori del periodo riproduttivo, 2 mm. e 1 f. sono stati osservati al Passo Malera l'8.10 (P.Parricelli).


### **Francolino di monte**                      *Bonasa bonasia*

Anche nel 2007 sono poche le segnalazioni di questa specie in Lessinia, tutte circoscritte alla zona della Foresta di Giazza.

1 ind. verso Malga Terrazzo il 19.03 (L.Signori).

2 indd. in canto al Rifugio Revolto il 12.04 (M.Morbioli). Nello stesso sito 1 ind. il 12.07 (R.Nordera).

Al di fuori del periodo riproduttivo, 4 indd. il 10.12 e 1 ind. il 30.12 in Val di Revolto (C.Dal Bosco).



— Pullus di Fagiano di monte a Scalorbi - R.Nordera

Coturnice al Pigarolo- L.Signori



### **Coturnice**     *Alectoris graeca*

Oltre alle consuete osservazioni in Lessinia centro-orientale, la Coturnice nel 2007 è stata segnalata anche sul Corno d'Aquilio e nella Val del Chiampo.

Tra le località Malere e Pigarolo la specie è stata contattata tutto l'anno, con un massimo di 8 indd. il 30.08 e l'8.11, e con l'osservazione di almeno due diverse covate (P.Parricelli, G.Serafin *et al.*).

In alta Val del Chiampo (VI) due covate di 6 e 7 *pulli* (D.Stocchero); 2 indd. il 10.10 (P.Parricelli).

1 ind. sul Corno d'Aquilio il 7.09 (P.Parricelli).

### **Cormorano**     *Phalacrocorax carbo*

In precedenza per il parco era nota solo una segnalazione per questa specie (21.03.03, M.D'offria/*vrbw*), ma l'osservazione di stormi in migrazione sull'arco alpino è piuttosto comune.

43 indd. oltrepassavano San Giorgio con direzione nord-ovest il 12.03 (P.Parricelli).

26 indd. sorvolavano San Francesco in direzione nord-est il 29.03 (P.Parricelli, L.Signori).

### **Airone cenerino**

### *Ardea cinerea*

Questo ardeide è stato osservato nella zona di Giazza a partire dall'8.08 (C.Dal Bosco, D.Dal Bosco, A.Stringher) fino al 31.12 (R.Nordera, P.Parricelli, G.Boschi).

### **Cicogna nera**

### *Ciconia nigra*

Non si conoscono precedenti segnalazioni in Lessinia di questa specie, migratrice scarsa ma regolare in provincia di Verona.

1 ind. è stato osservato inizialmente in volo a San Giorgio l'1.09 (F.Valbusa, M.Bizzi), successivamente a Bocca di Selva il 3.09 (F.Valbusa, M.Bizzi) e a Dossetti il 4.09 (R.Boscaini).

**Falco pecchiaiolo*****Pernis apivorus***

Si ricordano le segnalazioni più significative per consistenza o indizi di nidificazione.

La specie ha verosimilmente nidificato in Val di Revolto, nell'area sottostante a Potteghe, da dove dapprima, a partire dal mese di luglio, è stata osservata 1 coppia in voli con "applauso" e successivamente sono stati contattati 2 adulti e 2 giovani a partire dal 25.07 (P.Parricelli, G.Serafin).

1 coppia in volo a festoni a Sant'Andrea l'1.07 (M.Sighele).

1 coppia in parata a Spiazzoletti il 13.07 (C.Izzo).

186 indd. in 45' di osservazione a San Mauro di Saline il 25.08 (M.Allen).

**Nibbio bruno*****Milvus migrans***

Si conferma la presenza di questa specie durante tutto il periodo riproduttivo, tra la seconda metà di aprile e la prima metà di agosto.

In Lessinia centro-occidentale, nella zona del Corno d'Aquilio: 1 ind. il 23.04 (P.Parricelli); 2 indd. l'1.07 (V.Fanelli); 1 ind. a Fittanze il 22.07 (M.Sighele, A.Nicoli).

In Lessinia centro-orientale: 1 ind. a San Giorgio il 16.06 (C.Izzo, C.Chiappisi) e il 6.08 (P.Parricelli); 1 ind. a Spiazzoletti il 13.07 (M.D'offria); 1 ind. a Podesteria il 22.07 (M.Sighele, A.Nicoli), 1 ind. con preda sul Monte Tomba l'1.08 (L.Signori).

Soggetti in migrazione:

1 ind. il 4.08 sul Corno d'Aquilio (M.Siliprandi, L.Ravizza);

1 ind. il 13.08 a Erbezzo (R.Lerco).

**Biancone*****Circaetus gallicus***

Aquila migratrice che nidifica irregolarmente in Lessinia.

1 ind. in Contrada Valle il 9.04, verosimilmente in migrazione (M.Moiola).

2 indd. sopra il Monte Tomba il 16.05 (L.Signori), 1 ind. osservato anche il giorno successivo (P.Parricelli).

1 ind. a San Giorgio il 17.06 (C.Izzo) e il 15.08 (M.Sighele).

1 ind. a Malere il 5.07 che con preda si è diretto verso Giazza, in Val di Revolto (P.Parricelli *et al.*).

1 coppia a Spiazzoletti il 13.07 (M.D'offria).

1 ind. sul Corno d'Aquilio il 5.08 (M.Siliprandi, L.Ravizza).

1 ind. il 5.08 e 2 indd. il 15.08 sul Monte Sparavieri (L.Signori).

1 ind. al Ponte dell'Anguillara l'11.08 (C.Izzo *et al.*).

1 ind. a Vallina il 17 e il 18.08 (P.Parricelli).

1 ind. a Contrada Tinazzo il 25.08 (M.D'offria).



### **Falco di palude**

### ***Circus aeruginosus***

Specie segnalata sporadicamente in Lessinia durante le migrazioni (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002; SIGHELE & PARRICELLI, 2007).

1 f. sopra Rancani con direzione nord il 13.05 (M.Sighele).

1 ind. sopra Malga Gasparine il 13.09 (P.Parricelli).

### **Albanella reale**

### ***Circus cyaneus***

Specie osservata nei periodi dei passi migratori, prevalentemente in autunno.

1 f. a Bocca di Selva il 3.10 (M.D'offria).

1 ind. ai Tracchi il 12.10 (C.Izzo).

1 f. ai Parpari il 31.10 (M.Sighele) e l'8.11 (L.Sebastiani).

1 ind. sul Corno Mozzo l'1.11 (V.Fanelli).

### **Astore**

### ***Accipiter gentilis***

Rapace elusivo e forse per questo ritenuto poco frequente in Lessinia (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), nel 2007 si rivela invece abbastanza diffuso: osservato sul Corno Mozzo, ai Folignani, sul Malera, sul Pigarolo, ai Tracchi, a Valdiporro, a Roverè V.se, in Val Squaranto, a San Mauro di Saline.

In particolare 1 coppia è stata osservata con regolarità nei pressi del Ponte dell'Anguillara tra aprile e ottobre (C.Izzo *et al.*), dove già l'anno precedente era stata segnalata in comportamento territoriale. L'11.08 la coppia è stata osservata impegnata a scacciare 2 Aquile reali adulte che sorvolavano la foresta in compagnia del proprio giovane, riuscendo ad allontanarle (C.Izzo *et al.*). Il 25.08 è stata poi rilevata la presenza di 1 juv. da poco involato (C.Izzo, M.Siliprandi).

Inoltre, si segnala:

1 coppia nella Valle delle Sfingi, Camposilvano, il 15.04 (D.Rubolini);

2 ind. (1 juv. e 1 ad.) a Spiazoi il 16.10 (C.Izzo).



## Aquila reale

## *Aquila chrysaetos*

Le osservazioni di questo maestoso rapace si sono ripetute con regolarità anche nel 2007, più frequentemente in Lessinia centro-orientale, tra i Folignani e la Foresta di Giazza. La coppia di adulti è stata incontrata insieme specialmente nei primi mesi dell'anno, fino a marzo, talora accompagnata dal giovane nato l'anno precedente. Il volo nuziale a festoni è stato osservato sia a Malga Terrazzo il 17.01 (P.Parricelli) che sul Valon del Malera il 21.01 (L.Signori), mentre il 5.03, quando 1 subad. era presente a Malga Derocon (L.Signori), una coppia di adulti era osservata nei voli nuziali sul Monte Grolla (M.D'offria).

Successivamente, durante il periodo di nidificazione, le segnalazioni si riferiscono per lo più a singoli indd., spesso subadulti (P.Parricelli, C.Izzo, C.Chiappisi, V.Fanelli, M.D'offria, L.Signori), mentre da luglio in poi si sono succedute nuovamente segnalazioni di più indd. osservati contemporaneamente (M.D'offria, P.Parricelli).

Il 19.07 1 juv., probabilmente involato da poco, è stato osservato a Malga Cornicello mentre la zona era sorvolata da 2 adulti (L.Signori).



Aquila reale a San Giorgio - C.Izzo

Al Ponte dell'Anguillara l'11.08 osservato dapprima 1 subad. in volteggio molto alto, seguito poco dopo una coppia di aquile adulte che veniva subito attaccata da due Astori, come sopra ricordato (C.Izzo *et al.*); il trio di aquile è stato qui rivisto anche il 27.10 (L.Signori).

1 subad. è stato trovato morto sul Monte Tomba il 17.04, il decesso dovuto a impatto con cavi aerei (A.Leso, P.Canali, A.Saorin, F.Valbusa).

Anche in Lessinia occidentale, in particolare sul Corno d'Aquilio, la specie è stata più volte contattata tutto l'anno, spesso per osservazioni di singoli indd. (P.Parricelli, V.Fanelli, C.Izzo, C.Castagna). 1 subad. il 23.09 dal Corno d'Aquilio ha completamente attraversato la Val d'Adige (P.Parricelli).

1 ind. in dispersione è stato osservato nella bassa Val Squaranto a Pigozzo, alle porte di Verona, il 23.09 (C.Izzo).

**Aquila minore*****Hieraetus pennatus***

Specie osservata assai di rado in provincia di Verona, durante le migrazioni. Per il parco, in precedenza, è nota una sola osservazione che risale all'aprile 1999 (BON *et al.*, 2003; D'OFFRIA, 2005).

1 ind. morfismo scuro a Bocca di Selva il 3.10 (M.D'offria).

**Smeriglio*****Falco columbarius***

Specie che frequenta la pianura veronese nei mesi invernali, segnalata solo poche volte nel parco (D'OFFRIA, 2005).

1 f. a San Giorgio il 20.01 (C.Izzo).

**Lodolaio*****Falco subbuteo***

Anche per questo falco, che a differenza del precedente visita la provincia solo nel periodo riproduttivo, sono note solo segnalazioni per la zona collinare (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002). Nuova segnalazione per il parco, quindi, interessante anche per il periodo tardivo di passo migratorio:

1 ind. ai Parpari il 3.11 (C.Izzo).

**Falco pellegrino*****Falco peregrinus***

Falcone che nidifica nel parco da una decina di anni (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), oggi abbastanza comune durante tutto l'arco dell'anno.

Le nidificazioni certe o probabili per il 2007:

nel Vajo dell'Anguilla, con osservazione di 2 *pulli* al nido il 14.04 e 3 *pulli* il 21.05 (P.Parricelli, G.Serafin);

presso Squaranto, con una coppia al nido da metà marzo, 3 juvv. involati il 5.06, rimasti in zona almeno fino alla seconda metà di giugno (C.Izzo, C.Isotta *et al.*);

sul Monte Sparavieri, provenienti forse dalla Val di Ronchi, dove sono stati osservati 3 juvv. involati da poco il 22.06 (P.Parricelli);

nella zona Pigarolo-Grolla, con l'osservazione costante di 1-2 adulti e la presenza di 1 juv. il 7.08 (L.Signori, M.D'offria, P.Parricelli, M.Sighele).

Altre segnalazioni (singoli indd., se non diversamente indicato):

a Molina il 12.11 (P.Parricelli);

a Passo Fittanze il 21.02 e il 17.10 (L.Mazzola, P.Parricelli);

a Rocca Pia, Corno d'Aquilio, il 10.01 (P.Parricelli);

nella zona dei Folignani il 2.01, l'11.08, 2 indd. il 29.10 (P.Parricelli, C.Izzo, M.D'offria);

a Contrada Valle il 9.04 (M.D'offria);



nella zona Maregge-Brutti il 19.05, il 28.07 e il 12.10 (C.Izzo, M.D'offria, U.Monicelli);  
sul Malera l'1.09 e il 13.10 (M.D'offria);  
2 indd. a Spiazzoletti il 13.07 (M.D'offria).

### **Cavaliere d'Italia**

### ***Himantopus himantopus***

Non si conosce alcuna segnalazione di questo limicolo in Lessinia, probabilmente perché la specie attraversa raramente le Alpi. In Trentino-Alto Adige, ad esempio, si conoscono solo 6 osservazioni recenti, quasi tutte in fondo valle (PEDRINI *et al.*, 2005; M.Azzolini e M.Altieri, com. pers.) a parte una sul Lago di Soraga, 1200 m slm (G.Volcan, com. pers.). Assai interessante, quindi, la presenza nel parco di 1 ind. a oltre 1600 m di altitudine, probabilmente in dispersione:



Cavaliere d'Italia a Podesteria - D.Valbusa

1 ind. a Podesteria il 5.08 (D.Valbusa).

### **Pavoncella**

### ***Vanellus vanellus***

Alcuni indd. sono stati osservati nei primi mesi dell'anno nei pressi del Monte Tregnago, in sosta per qualche settimana (C.Isotta).

### **Piviere tortolino**

### ***Charadrius morinellus***

Specie di sosta probabilmente regolare in Lessinia, in particolare a fine estate, ma che è stata raramente segnalata (meno di 10 volte), sia perché molto mimetica sia perché si invola difficilmente.

1 ind. a Castelberto l'1.09 durante la "3 giorni del tortolino", iniziativa dell'associazione EBN Italia per il censimento nazionale della specie (R.Lerco *et al.*). Nello stesso sito è stato nuovamente osservato 1 ind., forse lo stesso, il 21.09 (L.Vinco).

### **Beccaccia**

### ***Scolopax rusticola***

Specie elusiva dei boschi, contattata frequentemente nel passo autunnale, in particolare nel Vajo della Marciora, ma raramente in periodo riproduttivo, ritenuta probabile nidificante in Lessinia (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in richiamo ai Folignani il 27.05 (M.D'offria).

**Piro piro culbianco**                      *Tringa ochropus*

Anche per questo limicolo, come per il Cavaliere d'Italia, non si conoscono precedenti segnalazioni nel Parco della Lessinia. Viste le rotte migratorie di questa specie, però, la sua osservazione è più comprensibile.

1 ind. a Malga Pretta di sopra, Corno d'Aquilio, il 4.08 (M.Siliprandi, L.Ravizza).

**Piro piro boschereccio**                      *Tringa glareola*

Specie osservata nei periodi di passo migratorio presso le pozze d'alpeggio.

2 ind. a San Giorgio il 4.08 (C.Izzo *et al.*).

2 ind. a Malga Bosco il 15.08 (P.Parricelli, G.Serafin).

**Tortora dal collare**                      *Streptotelia decaocto*

Specie abbondante e diffusa in tutta la provincia di Verona in pianura e nella zona pedemontana, poco nota in Lessinia.

1 ind. a San Francesco il 17.06 (M.Sighele).

**Assiolo**                                      *Opus scops*

Questo piccolo rapace notturno migratore è segnalato abbastanza raramente in Lessinia, a quote non elevate.

1 ind. in canto a Colletta, Bosco Chiesanuova, nel mese di maggio (L.Vinco).

**Gufò reale**                                      *Bubo bubo*

Strigiforme segnalato sporadicamente in Lessinia, anche se la sua presenza è probabilmente sottostimata.

1 ind. a Le Gosse il 7.11 (S.Trevisani).

**Civetta capogrosso**                      *Aegolius funereus*

Nidificante tipico dei boschi di conifere o misti, in ambiente alpino, spesso occupa cavità in precedenza utilizzate da Picchio nero. In Lessinia le zone in cui è possibile contattare questo Strigide sono quelle della Foresta di Giazza e dell'alto Vajo dell'Anguilla.



Civetta capogrosso a Malga Derocon - G.Serafin

A Malga Derocon alcuni indd. in canto nel mese di marzo (P.Parricelli, G.Serafin), ritrovamento di nido in aprile (M.Perbellini) e osservazione di 1 juv. il 3.06 (V.Fanelli).

1 ind. in canto in Val di Revolto il 17.03 (M.Morbioli).

### **Civetta**

### ***Athene noctua***

In Lessinia la specie è stata segnalata diffusamente nella zona collinare fino ai 700 m (VENDRAMIN & MARCHESI, 2003), ma segnalata anche fino ai 1000 m slm (DE FRANCESCHI, 1991).

Grazie al rinvenimento di 3 diversi juvv., accertata la nidificazione a Bosco Chiesanuova il 25.06, a Sant'Anna d'Alfaedo il 4.08 (VERDEBLU, 2008) e a Valdiporro nella prima metà di agosto (F.Birtele, L.Signori).

### **Gufo comune**

### ***Asio otus***

Strigiforme più frequente in pianura, ma che può nidificare in zone alpine e pre-alpine sia su latifoglie che su conifere (BRICHETTI, 1987).

1 ind. in canto alla Bocchetta della Vallina il 18.04 (P.Parricelli, L.Signori).

1 ind. su maggiociondolo nella Val dell'Orso, Corno d'Aquilio, l'1.11 (P.Parricelli).

### **Succiacapre**

### ***Caprimulgus eropaeus***

Migratore transahariano dalle abitudini notturne e per questo motivo difficilmente contattato. Nidifica nella fascia pedemontana fino a 800-1000 m di quota (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in canto il 10.06 a Squaranto (C.Izzo).

### **Upupa**

### ***Upupa epops***

Migratore transahariano regolare, nidifica fino a 700-800 m di altitudine (DE FRANCESCHI, 1991). Oltre alle segnalazioni nel mese di aprile:

1 ind. a Camposilvano l'1.07 (A.Berardo);

1 ind. a Fagioli, Erbezzo, il 7.07 (C.Isotta).

### **Torcicollo**

### ***Jynx torquilla***

Questo picchio migratore, ben diverso dagli altri rappresentanti di questo ordine, giunge alle nostre latitudini verso aprile per poi ripartire a settembre. Nidifica sulle Alpi anche a quote superiori ai 1500 m (BRICHETTI, 1987), ma in Lessinia è stato rilevato fino ai 900-1000 m (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in canto a Fagioli, Erbezzo, il 7.07 (C.Isotta).

1 ind. in alimentazione a terra a Castelberto il 9.09, verosimilmente in migrazione post-riproduttiva (M.D'offria).



**Picchio nero*****Dryocopus martius***

Specie che nidifica in boschi maturi misti di conifere e latifoglie soprattutto su abete bianco e faggio, tra i 1300 e 1550 m di altitudine (DE FRANCESCHI & DE FRANCESCHI, 2005). Nei mesi invernali indd. in dispersione si possono incontrare anche a quote basse o in pianura.

A parte le segnalazioni dalla zona del Vajo dell'Anguilla e dalla zona di Giazza:

1 ind. alla pineta di Santa Viola il 12.01 (M.D'offria);

1 ind. a Maregge il 25.04 (P.Parricelli);

1 ind. a Valdiporro il 6.06 (M.D'offria);

3 indd. a Valbo il 2.09 (C.Isotta);

1 ind. a Sant'Anna d'Alfaedo il 5.11 (L.Signori);

1 ind. a Sartori, Roverè V.se, il 14.11 (L.Signori).

**Picchio cenerino*****Picus canus***

Si conoscono poche segnalazioni documentate di questo picchio in Lessinia, anche se recentemente è stato ipotizzato che nidifichi nel parco (DE FRANCESCHI & DE FRANCESCHI, 2005). Di interesse, quindi, la segnalazione circostanziata di 1 ind. in canto ai Folignani di Fondo il 9.03, ricontattato anche due giorni dopo (P.Parricelli, L.Signori; PARRICELLI, 2007).

**Tottavilla*****Lullula arborea***

Si conferma la presenza di indd. in canto durante il periodo riproduttivo, soprattutto negli alti pascoli della Lessinia.

Alcuni indd. in canto nella zona dei Folignani tra metà marzo e metà aprile (M.Sighele, R.Lerco, M.Morbioli).

1 ind. nei pressi di Sauro il 6.07 (C.Isotta).

**Balestruccio*****Delichon urbicum***

Irundinide piuttosto comune che nidifica diffusamente anche nel parco in corrispondenza degli abitati, anche a quote elevate come a San Giorgio o al Branchetto. Si segnala l'importante passaggio migratorio di migliaia di indd. che sorvolavano la Val di Revolto in volo verso sud il 12.09 (P.Parricelli).

**Sordone*****Prunella collaris***

Specie comunemente osservata in Lessinia solo nei mesi invernali, da novembre a febbraio, in particolare nella zona del Pigarolo e di Castel Gaibana.

4-20 indd. tra il 9.02 e il 20.02 a Castel Gaibana (L.Signori);

2 indd. a San Giorgio il 10.02 (P.Parricelli);

20 indd. ca. al Pigarolo il 14.02 (P.Parricelli).

Nell'inverno successivo:

- al Pigarolo da 6 indd. il 3.11 a 40 indd. il 28.12 (M.Sighele, P.Parricelli *et al.*);
- 1 ind. a Podesteria il 18.12 (M.D'offria).

### **Codirossone**

#### ***Monticola saxatilis***

Turdide migratore poco numeroso, scarse le segnalazioni nel parco nel 2007.

- 1 ind. a Branchetto il 15.04 (M.Morbioli) e l'11.08 (F.Lui *et al.*).
- 1 ind. a Bocca di Selva il 22.04 (M.Morbioli).

### **Lui verde**

#### ***Phylloscopus sibilatrix***

Migratore trans-sahariano poco contattato durante il periodo riproduttivo. Si ricordano una segnalazione di passo migratorio e due di indd. in canto nella seconda metà di maggio, possibile periodo di nidificazione.

- 1 ind. a Erbezzo il 25.04 (M.Allen).
- 1 ind. tra Castelvero e Collina il 20.05 (M.Pesente).
- 1 ind. ai Follignani il 27.05 (M.D'offria).

### **Picchio muraiolo**

#### ***Tichodroma muraria***

Passeriforme rupestre considerato nidificante sul Carega ed a Castelberto (DE FRANCESCHI, 1991), negli anni più recenti è stato segnalato solo al di fuori del periodo riproduttivo.

- 1 ind. nella zona della Foresta di Giazza il 19.03 (L.Signori).
- 1 ind. a Malga Spazzacamina il 29.10 (P.Parricelli).
- 1 ind. osservato più volte al Pigarolo tra il 3 e l'11.11 (M.Sighele, M.D'offria, M.Bertacco).
- 1 ind. a Malga Bazerna il 4.11 (P.Parricelli).
- 2 indd. tra il Monte Tomba e Podesteria l'8.11 (M.D'offria).



### **Rigogolo**

#### ***Oriolus oriolus***

Specie poco frequente in quota, solitamente osservata in Lessinia nel periodo del passo migratorio.

- 1 ind. a Bolca il 17.06, in canto in bosco ceduo (A.Berardo).



**Averla maggiore**

***Lanius excubitor***

Svernante scarso ma regolare in provincia di Verona e nel Parco della Lessinia.

Nell'inverno 2006-2007:

1 ind., già ricordato nel resoconto 2006, è stato successivamente osservato a

San Giorgio fino al 12.03 (M.D'offria, L.Signori, P.Parricelli);

1 ind. a Passo Fittanze il 12.02 (P.Parricelli);

1 ind. a Fagioli il 21.02 (L.Mazzola);

L'inverno successivo:

1-2 indd. osservati con regolarità in alta Val Squaranto tra Campolevè e i

Parpari a partire dal 16.10 (C.Izzo, P.Parricelli, M.D'offria);

1 ind. sul Corno Mozzo l'1.11 (V.Fanelli).

**Cornacchia nera**

***Corvus corone corone***

Sottospecie della Cornacchia che nidifica sporadicamente in provincia, mentre le osservazioni invernali sono più comuni.

2 indd. a San Giorgio il 26.01 (P.Parricelli).

1 ind. a Passo Fittanze il 17.10 (P.Parricelli).

1 ind. a Campari, Val Squaranto, il 25.11, in un gruppo di 30 Cornacchie grigie (P.Parricelli, G.Serafin).

**Cornacchia grigia**

***Corvus corone cornix***

Cornacchia molto diffusa anche in Lessinia dove talora si osservano grosse concentrazioni.

250 indd. sui pascoli del Monte Tomba il 13.08 (R.Lerco).

**Fringuello alpino**

***Montifringilla nivalis***

Passeriforme osservato in piccoli stormi nei mesi invernali.

26 indd. a Bocca di Selva il 27.01 (R.Lerco).

30 indd. ca. a Castel Gaibana tra fine gennaio e il 9.02 (L.Signori, G.Brazzoli).

**Peppola*****Fringilla montifringilla***

Fringillide comune nei mesi invernali. Si ricorda un'interessante concentrazione serale verso un dormitorio (*roost*) posto all'interno della Foresta dei Folignani: circa 1500-2000 indd. osservati per circa un mese, dai primi di novembre ai primi di dicembre (M.Pesente, M.Morbioli, P.Parricelli).

**Crociere*****Loxia curvirostra***

Specie segnalata a partire dall'1.09. Si ricordano i gruppi più consistenti.

50 indd. sul Corno d'Aquilio l'1.11 (P.Parricelli). Lo stesso giorno 20 indd. a Bocchetta della Vallina (M.Sighele).



Crociere - M.Sighele

**Frosone*****Coccothraustes coccothraustes***

Visitatore solitamente poco numeroso. Si segnala un'interessante concentrazione. 100 indd. a Malga Bagorno il 27.10 (P.Parricelli).

**Zigolo giallo*****Emberiza citrinella***

Nidificante comune e diffuso nel periodo riproduttivo. Si segnala un'osservazione piuttosto tardiva.

1 m. ai Parpari il 2.11 (R.Lerco).



Codirosso comune che imbecca un giovane Cuculo  
a Bosco Chiesanuova - *M.Melotti*

## Attività di inanellamento

### Malga Derocon

inanellatore: Marilena Perbellini

La stazione di inanellamento si trova all'interno dell'Area floro-faunistica Malga Derocon, nella Foresta dei Folignani, ad una altitudine di 1300 m, in ambiente dominato dalla presenza di abete rosso (*Picea abies*) e faggio (*Fagus sylvatica*), radure prative e arbusti, in particolare nocciolo (*Corylus avellana*).

Durante il 2007, tra aprile e novembre, si sono eseguite due sessioni di inanellamento per mese. I primi mesi sono serviti a ricercare tramite vari spostamenti la migliore posizione per le reti di cattura e fissare quindi dei supporti in modo da rendere più agevoli le operazioni di montaggio e smontaggio dell'impianto.

La situazione logistica è un po' particolare perché, trattandosi di un recinto faunistico per cervi e camosci, le reti devono essere posizionate almeno a due metri da terra.

Nel 2007 sono state catturate 27 specie diverse, per un totale di 245 indd.

Uno dei dati più interessanti: il 19.04 è stato catturato 1 ad. di Civetta capogrosso che era già stato inanellato al valico di Bocca di Caset, Tiarno di Sopra (TN), il 5.09.2005; al momento della prima cattura era stato considerato come giovane dell'anno.

Il sito di Malga Derocon sarà inserito nel Progetto Alpi, coordinato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Hanno partecipato: Sofia Bonato, Mario Caffi, Stefania Capelli, Massimo Cavallini, Paolino Chignola, Mario Marcolini, Monica Pavan, Paolo Zanini.

#### lista delle specie inanellate a Malga Derocon nel 2007

1. Cuculo <i>Cuculus canorus</i>	15. Capinera <i>Sylvia atricapilla</i>
2. Civetta capogrosso <i>Aegolius funereus</i>	16. Bigiarella <i>Sylvia curruca</i>
3. Scricciolo <i>Troglodytes troglodytes</i>	17. Codibugnolo <i>Aegithalos caudatus</i>
4. Passera scopaiola <i>Prunella modularis</i>	18. Cincia alpestre <i>Poecile montanus</i>
5. Tordela <i>Turdus viscivorus</i>	19. Cincia mora <i>Periparus ater</i>
6. Tordo bottaccio <i>Turdus philomelos</i>	20. Cincia dal ciuffo <i>Lophophanes cristatus</i>
7. Merlo <i>Turdus merula</i>	21. Cinciallegra <i>Parus major</i>
8. Pettiroso <i>Erithacus rubecula</i>	22. Cinciarella <i>Cyanistes caeruleus</i>
9. Codiroso comune <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	23. Rampichino alpestre <i>Certhia familiaris</i>
10. Balia nera <i>Ficedula hypoleuca</i>	24. Nocciolaia <i>Nucifraga caryocatactes</i>
11. Fiorrancino <i>Regulus ignicapilla</i>	25. Fringuello <i>Fringilla coelebs</i>
12. Regolo <i>Regulus regulus</i>	26. Peppola <i>Fringilla montifringilla</i>
13. Luì piccolo <i>Phylloscopus collybita</i>	27. Ciuffolotto <i>Pyrrhula pyrrhula</i>
14. Luì grosso <i>Phylloscopus trochilus</i>	

## Foresta di Giazza

inanelatore: Marco Morbioli

Nel 2007, su impulso di Veneto Agricoltura, è stata attivata una stazione di cattura e inanellamento di avifauna selvatica nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza per lo studio della biologia riproduttiva dei piccoli passeriformi forestali. Le reti (*mist-net*) utilizzate per catturare gli uccelli sono particolarmente efficaci in ambienti ad arbusteto, mentre in foresta pura hanno resa quasi nulla.

Un sito idoneo all'utilizzo di tale mezzo di cattura è stato individuato nella mugheta situata nelle vicinanze del rifugio Boschetto, nella Val Revolto di Giazza. La vegetazione è prevalentemente a pino mugo (*Pinus mugo*) con rari esemplari di ontano bianco (*Alnus incana*), esemplari di *Salix* gen. e maggiociondolo (*Laburnum alpinum*).

Le catture hanno evidenziato che il sito viene frequentato dai piccoli passeriformi, provenienti dalla circostante foresta mista di conifere e latifoglie, prevalentemente a scopo trofico, con un'evidente *turn-over* delle specie nei diversi periodi dell'anno.

La stazione, nei prossimi anni, aderirà al Progetto PR.I.S.CO. (PRogetto Inanellamento Sforzo COstante), coordinato in Italia dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Le 17 specie catturate in fase riproduttiva, in ordine di abbondanza, sono le seguenti: pettirosso, fiorrancino, regolo, capinera, cincia mora, luì piccolo, codibugnolo, codiroso, cinciarella, ciuffolotto, rampichino alpestre, fringuello, cincia dal ciuffo, scricciolo, passera scopaiola, tordo bottaccio, ballerina gialla.

Un'ulteriore stazione di cattura sarà attivata nei dintorni della Malga Fraselle di sotto, nell'omonima valle.



Regolo inanellato a Malga Derocon - P.Parricelli

## Specie segnalate in Lessinia nel 2007

Galliformes  
Tetraonidae

Gallo cedrone *Tetrao urogallus*  
Fagiano di monte *Tetrao tetrix*  
Francolino di monte *Bonasa bonasia*

Phasianidae

Coturnice *Alectoris graeca*  
Pernice rossa *Alectoris rufa*  
Sterna *Perdix perdix*  
Quaglia comune *Coturnix coturnix*  
Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Pelecaniformes

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Ciconiiformes

Ardeidae

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*  
Nibbio bruno *Milvus migrans*  
Biancone *Circaetus gallicus*  
Falco di palude *Circus aeruginosus*  
Albanella reale *Circus cyaneus*  
Sparviere *Accipiter nisus*  
Astore *Accipiter gentilis*  
Poiana *Buteo buteo*  
Aquila reale *Aquila chrysaetos*  
Aquila minore *Hieraaetus pennatus*

Falconidae

Gheppio *Falco tinnunculus*  
Smeriglio *Falco columbarius*  
Lodolaio *Falco subbuteo*  
Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Charadriiformes

Recurvirostridae

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Charadriidae

Pavoncella *Vanellus vanellus*  
Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Scolopacidae

Beccaccia *Scolopax rusticola*  
Piro piro culbianco *Tringa ochropus*  
Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Columbiformes

Columbidae

Colombaccio *Columba palumbus*  
Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*



Smeriglio - C.Izzo



Fierrancino - R.Lerco



Tordo sassello - R.Lerco



Culbianco - C.Chiappisi



Gracchio alpino - C.Izzo

*Cuculiformes*  
*Cuculidae*  
Cuculo *Cuculus canorus*

*Strigiformes*  
*Strigidae*  
Assiolo *Otus scops*  
Gufo reale *Bubo bubo*  
Allocco *Strix aluco*  
Civetta *Athene noctua*  
Civetta capogrosso *Aegolius funereus*  
Gufo comune *Asio otus*

*Caprimulgiformes*  
*Caprimulgidae*  
Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

*Apodiformes*  
*Apodidae*  
Rondone maggiore *Tachymarptis melba*  
Rondone comune *Apus apus*

*Coraciiformes*  
*Upupidae*  
Upupa *Upupa epops*

*Piciformes*  
*Picidae*  
Torcicollo *Jynx torquilla*  
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*  
Picchio nero *Dryocopus martius*  
Picchio verde *Picus viridis*  
Picchio cenerino *Picus canus*

*Passeriformes*  
*Alaudidae*  
Tottavilla *Lullula arborea*  
Allodola *Alauda arvensis*

*Hirundinidae*  
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*  
Rondine *Hirundo rustica*  
Balestruccio *Delichon urbicum*

*Motacillidae*  
Ballerina bianca *Motacilla alba*  
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*  
Prispolone *Anthus trivialis*  
Pispola *Anthus pratensis*  
Spioncello *Anthus spinoletta*

*Regulidae*  
Regolo *Regulus regulus*  
Fiorrancino *Regulus ignicapilla*

*Cinclidae*  
Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

*Troglodytidae*  
Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

*Prunellidae*  
Sordone *Prunella collaris*  
Passera scopaiola *Prunella modularis*

*Turdidae*  
Codirossone *Monticola saxatilis*  
Merlo dal collare *Turdus torquatus*  
Merlo *Turdus merula*  
Cesena *Turdus pilaris*  
Tordo sassello *Turdus iliacus*  
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*  
Tordela *Turdus viscivorus*

*Sylviidae*  
Lui grosso *Phylloscopus trochilus*  
Lui piccolo *Phylloscopus collybita*  
Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*  
Capinera *Sylvia atricapilla*  
Bigiarella *Sylvia curruca*

*Muscicapidae*  
Pigliamosche *Muscicapa striata*  
Balia nera *Ficedula hypoleuca*  
Pettirosso *Erithacus rubecula*  
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*  
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*  
Stiaccino *Saxicola rubetra*  
Saltimpalo *Saxicola torquatus*  
Culbianco *Oenanthe oenanthe*

*Aegithalidae*  
Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

*Paridae*  
Cincia bigia *Parus palustris*  
Cincia alpestre *Parus montanus*  
Cincia mora *Parus ater*  
Cincia dal ciuffo *Parus cristatus*  
Cinciallegra *Parus major*  
Cinciarella *Parus caeruleus*

*Sittidae*  
Picchio muratore *Sitta europaea*

*Tichodromidae*  
Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

*Certhiidae*  
Rampichino alpestre *Certhia familiaris*  
Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

*Oriolidae*  
Rigogolo *Oriolus oriolus*

*Laniidae*  
Averla piccola *Lanius collurio*  
Averla maggiore *Lanius excubitor*

*Corvidae*  
Ghiandaia *Garrulus glandarius*  
Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*  
Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*  
Cornacchia nera *Corvus corone corone*  
Cornacchia grigia *Corvus corone cornix*  
Corvo imperiale *Corvus corax*

*Sturnidae*

Storno *Sturnus vulgaris*

*Passeridae*

Passera d'Italia *Passer domesticus italiae*

Passera mattugia *Passer montanus*

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

*Fringillidae*

Fringuello *Fringilla coelebs*

Peppola *Fringilla montifringilla*

Crociere *Loxia curvirostra*

Verdone *Carduelis chloris*

Lucherino *Carduelis spinus*

Cardellino *Carduelis carduelis*

Fanello *Carduelis cannabina*

Verzellino *Serinus serinus*

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*


*Emberizidae*

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Zigolo nero *Emberiza cirius*

Ortolano *Emberiza hortulana*

Strillozzo *Emberiza calandra*



Rondone maggiore - R.Lerco



Cinciarella - C.Izzo

Falco pecchiaiolo - C.Izzo




Rampichino alpestre - *M. Sighele*



Fanello - *C. Izzo*

## Bibliografia

- Baccetti N., Fracasso G. & Serra L., 2004: Lista CISO-COI degli uccelli italiani (13.02.2004). Sito web del CISO-COI: [www.ciso-coi.org](http://www.ciso-coi.org).
- Bon M., Sighele M. & Verza E. (red.), 2003: Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, 54: 123-160.
- Brichetti P., 1987: Atlante degli uccelli delle Alpi Italiane. *Editoriale Ramperto*: pp. 212.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2003-2007: Ornitologia italiana. Voll. 1-2-3-4. *A.Perdisa Editore*.
- De Franceschi P., 1991: Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 154.
- De Franceschi P.F. & De Franceschi G., 2005: Il Picchio nero e altri picidi nidificanti in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 28: 55-60.
- De Franceschi P.F. & Parricelli P., 2002: Aquila reale, Pellegrino ed altri rapaci diurni in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 25: 103-112.
- D'offria M., 2005: *Bird watching* in Alta Val Squaranto. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 28: 61-66.
- Parricelli P., 2007: Picchio cenerino (*Picus canus*) nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 30: 196-198.
- Pedrini P., Caldonazzi M. & Zanghellini S. (red.), 2005: Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento. *Studi Tridentini di Scienze Naturali, Acta Biologica*, 80 suppl. 2: pp. 692.
- Sighele M. & Parricelli P. (red.), 2007: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia*: pp. 24.
- Vendramin E. & Marchesi L., 2003: Densità e dispersione territoriale della Civetta (*Athene noctua*) in Lessinia (VR). *Avocetta*, 27 (2): 185.
- VerdeBlu, 2008: Relazione sull'attività svolta - Anno 2007. Verona.
- Violani C. & Barbagli F., 2006: Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes - Psittaciformes*. *Avocetta*, 30 (n.sp.): 5-265.



*La ricchezza di biodiversità della Lessinia è uno spettacolo naturale straordinario. Questa opera è uno strumento di conoscenza molto utile a tutti coloro che amano la Natura, ed è per questo che Swarovski Optik, leader mondiale nella produzione di binocoli e cannocchiali per osservare la Natura, è particolarmente lieta di contribuire alla sua pubblicazione, al pari di svariate altre iniziative di conservazione e tutela della fauna selvatica che l'azienda sostiene in tutto il mondo. Swarovski Optik produce in Austria secondo rigide norme antiinquinamento e con certificazione ambientale ISO 14000.*

*Francesco Corrà*

*amministratore delegato Swarovski Optik Italia*

*[www.swarovskioptik.com](http://www.swarovskioptik.com)*





**Parco Naturale Regionale della Lessinia**  
**Comunità Montana della Lessinia**

Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)  
[www.lessiniapark.it](http://www.lessiniapark.it) - [guardiaparco@lessiniapark.it](mailto:guardiaparco@lessiniapark.it)  
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677



**Verona birdwatching**

[www.veronabirdwatching.org](http://www.veronabirdwatching.org) - [info@veronabirdwatching.org](mailto:info@veronabirdwatching.org)

