



resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2008



© Copyright 2009 - Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura di), 2009: **Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2008**. Parco Naturale Regionale della Lessinia, pp. 32.

Foto di copertina: Gracchio corallino, di Roberto Lerco - Sordone, di Laura Lodde.



resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2008

a cura di

Maurizio Sighele

Paolo Parricelli





Codiroso spazzacamino - R. Lerco

Presentazione

La terza edizione del resoconto ornitologico annovera 128 specie di uccelli censite nel territorio del Parco. Tale ricchezza di diversità biologica conferma e riconosce il rilievo della nostra area protetta regionale, confermandola “serbatoio” privilegiato di risorse naturali che rappresentano un reale volano per lo sviluppo di attività sostenibili e socialmente incentivanti.

Il monitoraggio, ovvero l’osservazione e l’ascolto delle specie sul campo, operato con conoscenze e segnalazioni sempre più approfondite, liberamente e passionatamente donate da tutti coloro che hanno preso parte a vario titolo alla redazione di questo resoconto, costituisce uno strumento fondamentale per progettare e sostenere le future politiche di conservazione dell’ambiente naturale.

A tutti gli autori delle osservazioni e delle immagini, sinceri partecipi alla storia naturale del nostro Parco, il ringraziamento del suo Ente gestore che offre questa pubblicazione a tutti coloro che potranno, consultandola, essere maggiormente consapevoli.

Claudio Melotti

Presidente della Comunità Montana della Lessinia
Parco Naturale Regionale





Introduzione

In questo resoconto sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti all'avifauna osservata nel corso del 2008 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia e nei territori immediatamente adiacenti. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli erratismi, le curiosità o l'interesse locale.

Sono stati raccolti e analizzati alcune migliaia di dati riferiti a 128 specie diverse di uccelli. Sono così 141 le specie segnalate in questi tre anni di resoconti. Le osservazioni sono state effettuate sia durante il tempo libero, sia durante l'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio.

La maggior parte delle segnalazioni proviene dalla mailing list "Verona birdwatching" (*vr bw*), rete telematica dove gli appassionati di birdwatching e di ornitologia possono scambiarsi le informazioni sull'avifauna in provincia di Verona tramite posta elettronica.

Tutte le immagini di questo resoconto sono state scattate nel 2008 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Hanno contribuito alla stesura di questo resoconto: Mick Allen, Maurizio Azzolini, Leo Beghellini, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Maurizio Bertacco, Marina Boaretto, Roberto Bonetti, Rosalba Boscaini, Giorgio Boschi, Paolo Boschi, Michele Bottazzo, Giorgio Brazzoli, Maurizio Busato, Pierangelo Canali, Chiara Castagna, Guido Cavaliere, Ernesto Cavallini, Carla Chiappisi, Daniele Comin, Bruno Corradi, Valentina Corradi, Fabrizio Croci, Cesare Dal Bosco, Daniele Dal Bosco, Pierino Dal Dosso, Michele Dall'O, Giangaetano Dalle Vedove, Silvio Davison, Mauro D'offria, Vittorio Fanelli, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Roberto Lercio, Alessandro Leso, Laura Lodde, Diego Lonardoni, Luca Longo, Fausta Lui, Mauro Magagna, Carlo Marcolini, Virginia Mancone, Ugo Monicelli, Marco Morbioli, Andrea Mosele, Roberto Nordera, Federico Novelli, Gianluca Parla, Paolo Parricelli, Marilena Perbellini, Marco Pesente, Antonio Petronio, Rossano Quirini, Giuseppe Rodini, Diego Rubolini, Andrea Saorin, Ugo Sauro, Leopoldo Scandola, Luigi Sebastiani, Greta Serafin, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Antonia Stringher, Fulvio Valbusa, Roberta Vignola, Andrea Zanini. Un ringraziamento particolare per i preziosi consigli a Marco Pesente e Cecilia Ruzzenente.

L'elenco sistematico si basa sulla check list di FRACASSO *et al.* (2009).

Le osservazioni più interessanti del 2008

Alzavola

Anas crecca

Specie acquatica osservata raramente nel parco durante le migrazioni.

2 indd. in una pozza verso Castelberto il 3.11 (C. Izzo).

Germano reale

Anas platyrhynchos

Come la specie precedente, è osservata solitamente durante il passo migratorio, ma è più comune.

2 indd. nei pressi di Selva di Progno il 5.07 (M. Sighele, R. Vignola).

Francolino di monte

Bonasa bonasia

Questo elusivo tetraonide si conferma localizzato nella parte orientale del parco.

1 ind. a Revolto il 30.05 (P. Parricelli);

1 ind. in Val Fraselle il 30.04 e il 2.05 (L. Signori, M. Bottazzo *et al.*);

7 juvv. e 1 f. avvistati a Campostrin il 6.06, quando è stato rinvenuto anche un nido con resti di uova schiuse da poco (L. Signori).

Fagiano di monte

Tetrao tetrix

Tra i galliformi è la specie più numerosa e più facilmente contattabile, specialmente in Lessinia orientale, al confine tra le province di Verona, Vicenza e Trento, cioè nelle aree della Foresta di Giazza e della Riserva di Campobrun. I conteggi dei maschi nelle arene di canto sono stati effettuati tra fine aprile e metà maggio: in Val Fraselle e nel Valon del Malera si evidenzia un leggero decremento dei maschi cantori rispetto agli anni precedenti.

3-5 mm. e 1 f. sul Valon del Malera tra il 25.04 e il 10.05 (L. Signori, P. Parricelli);

Fagiani di monte in arena di canto, fotografati attraverso il cannocchiale - L. Signori



1 m. a Bocca Gaibana il 2.05 (P. Parricelli);
3-4 mm. e 2 ff. in alta Val Fraselle tra il 30.04 e il 14.05 (M. Bottazzo *et al.*);
8-10 mm. e 4-5 ff. a Campobrun (TN) tra il 30.04 e il 14.05 (M. Bottazzo *et al.*);
1 m. sul Monte Lobbia il 10.05 (P. Parricelli);
6 mm. e 3 ff. ai Passi Lora e Zevola, il 14.05 (M. Bottazzo *et al.*).

Altri avvistamenti al di fuori dal periodo di canto:

1 f. sul Valon del Malera il 6.07 (L. Signori);
2 mm. in loc. Trappola il 30.09 (P. Parricelli);
1 m. a Laghetti, Val Fraselle, il 20.11 (P. Parricelli).

Due covate sono state osservate nel Vicentino, con 4 pulli sul Monte Zevola e 3 pulli in loc. Gramolon (D. Stocchero).

Gallo cedrone

Tetrao urogallus

Il più raro ed elusivo tetraonide nidificante del parco, molto localizzato.

1 f. il 25.04 e l'11.05 ai Folignani e successivi rinvenimenti di fatte e penne (L. Scandola, L. Signori, P. Parricelli);
a Castelberto (TN) 2 mm. e 1 f. l'1.05, 1 f. il 12.06, 1 m. e 1 f. con 3 juvv. il 3.07 (L. Signori);
fatte di 1 m. in loc. Molesse, Val di Revolto, il 14.05 (M. Bottazzo);
1 m. in loc. Le Gosse il 24.05 (G. Cavaliere, C. Marcolini);
1 m. in loc. Potteghe il 28.09 (P. Parricelli).

Coturnice

Alectoris graeca

Anche per questa specie le osservazioni del 2008 provengono esclusivamente dalla Lessinia centro-orientale:



in Val di Revolto osservazioni ripetute per tutto il 2008 nelle località Grolla, Pigarolo, Zete con un massimo di 10 indd., presenza di indd. in canto tra il 9.04 e il 24.05 e covata di 6 pulli il 6.08 (C. Dal Bosco, D. Dal Bosco, A. Stringher, L. Signori, M. D'offria, P. Parricelli, G. Serafin *et al.*);

nel Vicentino 3 diverse osservazioni di covate, con 4 pulli sul Monte Zevola, 5 pulli a Cima Mesole e 6 pulli in loc. Gramolon (D. Stocchero).

Airone cenerino

Ardea cinerea

Si ripetono le osservazioni in Lessinia di questo ardeide molto diffuso.

1 ind. nei pressi di Selva di Progno il 5.07 (M. Sighele, R. Vignola);

1 ind. nella Valle delle Sfingi, osservato più volte durante i mesi estivi (B. Corradi);

1 ind. nei dintorni di Giazza tra luglio e ottobre (C. Dal Bosco, D. Dal Bosco, R. Nordera, G. Boschi, A. Stringher).

Nibbio bruno

Milvus migrans

Questo rapace migratore è segnalato sempre più regolarmente nel parco anche in periodo riproduttivo; le osservazioni sono iniziate a partire dalla fine di aprile.

1 ind. a San Bortolo delle Montagne il 27.04 (C. Chiappisi, C. Izzo);

1 ind. a Malga Lessinia il 17.05 (P. Parricelli);



- 1 ind. a San Giorgio il 24.05 e il 10.06 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen);
- 1 ind. a Branchetto il 28.06 (R. Lerco);
- 1 ind. a Rosaro il 28.06 (R. Lerco);
- 1 ind. sul Monte Tomba il 2.07 (L. Signori);
- 1 ind. a Erbezzo il 6.07 (C. Isotta);
- 1 ind. a Passo Fittanze l'8.07 (C. Isotta).

Biancone

Circaetus gallicus

Questa "aquila dei serpenti", così chiamata per le abitudini alimentari, è specie migratrice, poco numerosa in Lessinia dove nidifica quasi regolarmente.

- 1 ind. a Spiazzoi il 23.04, osservato due giorni più tardi a Malga Bazerna, riconosciuto per la mancanza di una remigante dell'ala destra (P. Parricelli, L. Signori);
- 1 ind. a San Giorgio osservato più volte tra il 3.05 e il 16.07 (R. Boscaini, C. Izzo, C. Chiappisi, E. Cavallini, P. Parricelli);
- 1 ind. nei pressi di Selva di Progno il 19.06 (F. Novelli);
- 1 ind. a Malera di Sotto il 15.07 (U. Sauro, D. Lonardoni);
- 1 ind. ai Tracchi il 22.07 (M. D'offria);
- 1 ind. a Malga Derocon il 15.08 (R. Lerco);
- 2 indd. in migrazione a Passo Fittanze l'8.09 (P. Parricelli).



Albanella reale

Circus cyaneus

Specie osservata solitamente durante i due periodi migratori.

- 1 ind. in loc. Sengia Rossa, Val di Revolto, il 23.04 (P. Parricelli).

Astore

Accipiter gentilis

Per questa specie elusiva e molto localizzata si conferma la nidificazione nei pressi del Ponte dell'Anguillara, con la presenza nella prima decade di agosto di 2 juv. involati (C. Izzo, U. Monicelli). Inoltre:

- 1 ind. sopra la contrada Guaina il 7.02 (C. Izzo);
- 1 ind. a Strozzi, Erbezzo, il 20.03 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Sartori, Roverè V.se, il 22.06 (M. D'offria);
- 1 ind. sopra Giazza il 5.07 (M. Sighele);
- 1 ind. a Erbezzo il 31.08 (C. Izzo);
- 1 ind. a Bocca di Selva il 21.09 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Bocchetta della Vallina il 12.10 (V. Fanelli).

Poiana

Buteo buteo

Rapace comune, si ricorda una segnalazione di 1 ind. con parziale leucismo del piumaggio osservato nei pressi di Podestaria il 10.11 (G. Dalle Vedove).

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Si confermano regolari le osservazioni di questo rapace in tutto il parco a quote medio-elevate, dalla Val d'Adige a ovest alla Val Fraselle e alla Val del Chiampo a est. È stata accertata la nidificazione di una coppia nei pressi di Giazza, grazie alla localizzazione di un nido attivo e l'osservazione successiva dell'involo di un giovane (R. Nordera, G. Parlato, L. Signori, P. Parricelli *et al.*). Da ovest verso est:

1 ind. a Rocca Pia il 5 e il 16.02 (P. Parricelli, V. Fanelli);

tra Vallene e il Corno Mozzo 1 ind. il 30.03, il 5.04 e il 24.04, 1 ad. e 1 juv. il 5.10 (V. Fanelli, C. Izzo);

1 ind. a Castelberto verso la Val d'Adige il 9.04 e il 12.10 (P. Parricelli, G. Serafin, V. Fanelli);

2 indd. subito a nord di Erbezzo il 31.08 (C. Izzo);

1 ind. posato su abete a Dosso del Pezzo il 7.05 (P. Parricelli);

1 juv. nei pressi di Podestaria il 9.11 (V. Fanelli);

a Bocca di Selva 1 ind. il 5.02 e 2 indd. il 29.12 (P. Parricelli, M. D'offria);

1 cp. ai Tracchi il 22.07 (M. D'offria);

a San Giorgio 3 indd. il 24.03, 1 ad. il 10.06 e il 5.07, 1 ad. e 1 juv. il 9.08 (L. Signori, C. Izzo, U. Monicelli);

a Malga Bosco, Val Squaranto, 1 ind. il 29.02 e 2 indd. il 19.04 (P. Parricelli, L. Signori);

2-3 indd. al Pigarolo tra il 10 e il 19.02, quindi ancora 3 indd. il 17.09 (P. Parricelli, C. Dal Bosco, R. Nordera);

diverse osservazioni anche nel Vicentino presso Passo Lora (D. Stocchero).

Giovane di Aquila reale poco prima dell'involo, ripreso da grande distanza grazie al cannocchiale - L. Signori



Falco cuculo***Falco vespertinus***

Falco di presenza quasi regolare nel parco durante il passo migratorio primaverile, talora anche in numeri consistenti (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002).

1 ind. ai Parpari il 26.05 (P. Parricelli).

Lodolaio***Falco subbuteo***

Dopo la prima segnalazione del 2007, altre due segnalazioni di questo falco, sempre durante il passo migratorio post-riproduttivo.

1 ind. a Castelberto il 6.09 (M. D'offria);

1 ind. a Velo V.se l'8.09 (C. Izzo).

Falco pellegrino***Falco peregrinus***

Falcone che si conferma abbastanza comune durante tutto l'arco dell'anno, sia a quote basse che elevate. Oltre ai siti di nidificazione già noti, accertata la riproduzione anche a Molina con la presenza di 2 juv. l'1.06 (A. Berardo). Inoltre:

1 ind. a Squaranto il 7.02 (C. Izzo);

1 ind. a Rocca Pia tra il 15 e il 18.02 (P. Parricelli, V. Fanelli);

1 cp. al Pigarolo tra il 19.02 e il 3.03, 1 ind. il 24.05 (P. Parricelli, M. D'offria);

2 indd. nel Vajo della Marciora il 30.03 e 1 ind. il 12.07 (C. Izzo, C. Isotta);

1 ind. a Vallene il 6.04 e il 3.11 (C. Izzo);

1 ind. a San Giorgio il 24.05 e il 9.08 (C. Izzo *et al.*);

1 ind. a Campilonghi, Vajo dell'Anguilla, il 29.05 (P. Parricelli, G. Serafin);

1 ind. a Cima Lobbia il 22.08 (E. Cavallini);

2 indd. nei pressi di Bocca di Selva l'8.09 (C. Izzo), a caccia di fringillidi.



Porciglione***Rallus aquaticus***

Di questo rallide, comune delle zone acquatiche a canneto, non è nota alcuna segnalazione nel Parco della Lessinia.

1 ind. trovato morto a Corbiolo l'8.10 (A. Zanini).

Pavonella***Vanellus vanellus***

Specie tipica degli ambienti erbosi, allagati o meno.

17-20 indd. tra il 15.01 e il 9.02 nei pressi del Monte Tregnago (C. Isotta).

Beccaccino***Gallinago gallinago***

Come nel caso di altri limicoli, la specie è segnalata nelle pozze d'alpeggio durante il passo migratorio.

1 ind. in loc. Campegno, San Giorgio, il 3.04 (P. Parricelli);

1 ind. a San Giorgio il 31.08 (C. Izzo).

Piro piro culbianco***Tringa ochropus***

Seconda segnalazione per il Parco della Lessinia dopo quella dello scorso anno.

1 ind. a Malga Derocon il 15.08 (R. Lerco).

Piro piro boschereccio***Tringa glareola***

Anche questo limicolo è segnalato durante le migrazioni, in sosta nei pressi delle pozze d'alpeggio.

1 ind. a Malga Modo, Erbezzo, l'1.05 (L. Signori).

Assiolo***Otus scops***

Piccolo rapace notturno migratore, localmente presente in Lessinia solo durante i mesi estivi. Si segnala l'accertamento di una nidificazione con involo di 3 juv. nel mese di giugno 2008 in Val Sguerza, Velo Veronese, 1200 m slm; 1 cp. si era riprodotta nello stesso sito anche nel 2007 (V. Corradi).

Gufo reale***Bubo bubo***

Maestoso e raro rapace notturno del quale si conoscono ogni anno solo pochissime evidenze in tutta la provincia di Verona.

1 ind. trovato morto sul Monte Tomba per impatto con cavi aerei il 12.06 (L. Signori).

Piro piro boschereccio a Malga Modo - L. Signori



Civetta***Athene noctua***

Si conferma la presenza di questa specie in Lessinia anche ai limiti di altitudine riscontrati, cioè fino ai 1000 m slm (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. in canto nel centro abitato di Bosco Chiesanuova dal 6.05 per tutto il periodo estivo (P. Parricelli);

1 ind. a Zerlotti, Roverè V.se, il 30.06, (C. Isotta).

Gufo comune***Asio otus***

Nidifica in zone boschive solitamente fino a 1300 m slm, talora fino a 1700 m, mentre la presenza sull'arco alpino è stata rilevata fino ai 2000 m (CAULA *et al.*, 2009).

1 ind. a Cenise, Vajo dell'Orso, il 25.01 (P. Parricelli, C. Castagna);

1 ind. a Bocca di Selva il 22.05 (P. Parricelli *et al.*);

1 ind. in loc. La Ba il 23.08 (L. Signori).

Civetta capogrosso***Aegolius funereus***

Uccello notturno tipico dei boschi maturi di conifere o misti, dove nidifica. Si ricorda una segnalazione al di fuori dell'ambiente boschivo, non distante dall'abitato.

1 ind. nei pressi di Fagioli, Erbezzo, il 4.07 (C. Isotta).

Succiacapre***Caprimulgus europaeus***

Sporadiche le segnalazioni di questo migratore dalle abitudini notturne.

1 ind. a Zerlotti, Roverè V.se, il 30.06, a circa 1000 m slm (C. Isotta).

Upupa***Upupa epops***

Migratore osservato regolarmente nel parco, nidifica in provincia e sulle Alpi fino a 800-1000 m di altitudine (DE FRANCESCHI, 1991; CAULA *et al.*, 2009). Per questo motivo, risulta molto interessante la nidificazione accertata a Malga Cornicello, 1663 m slm, dove il 20.06 è stato rinvenuto un nido attivo (L. Signori).

Torcicollo***Jynx torquilla***

È l'unico picchio migratore a lungo raggio presente con regolarità in Lessinia, dove qualche coppia nidifica fino ai 1000 m (DE FRANCESCHI, 1991), mentre per l'arco alpino sono riportate riproduzioni anche fino a 2000 m slm (CAULA *et al.*, 2009). Si ricordano le osservazioni in periodo riproduttivo:



Upupa a Malga Cornicello - L. Signori

1 ind. in loc. Malere di Sotto, 1560 m slm, contattato a partire dal 25.04 e successivamente per tutto il periodo estivo (P. Parricelli, L. Signori);

1 ind. a Castelletto, San Giorgio, 1700 m slm, il 13.06 (P. Parricelli).

Picchio verde

Picus viridis

Specie diffusa in tutto il parco in boschi di latifoglie o frutteti. Si ricorda un'interessante concentrazione invernale.

5 indd. a Guaina il 7.02 in richiamo su alcuni meli, in compagnia di 2 Picchi rossi maggiori (C. Izzo).

Picchio nero

Dryocopus martius

Specie ben rappresentata nel parco, specialmente nel Vajo dell'Anguilla e nella zona di Giazza (Val Fraselle e Revolto), dove è più facile incontrarla. Al di fuori di queste zone, da ovest a est:

1 ind. a Malga Campo, Val d'Adige il 25.02 (P. Parricelli);

1 ind. a Marezzane il 20.01 (V. Fanelli);

1 ind. a San Giovanni in Loffa il 9.11 (V. Fanelli);

1 ind. recuperato debilitato a Sant'Anna d'Alfaedo il 27.04 (F. Croci);

1 ind. sopra Vallene il 10.06 (C. Izzo);

1 ind. al Ponte di Veja il 3.07 (D. Rubolini);



- 1 ind. verso Erbezzo il 9.08 (C. Izzo, U. Monicelli);
- 1 ind. a Castelberto il 12.10 (V. Fanelli);
- 1 ind. a Valdiporro il 21.11 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Squaranto il 12.01 (P. Parricelli);
- 1 ind. a San Rocco di Piegara in un frutteto il 20.11 (C. Izzo);
- 1 ind. a Spiazoi il 3.05 (C. Izzo);
- 1 ind. a Sprea il 27.04 (C. Izzo, C. Chiappisi).

Topino

Riparia riparia


Irundinide tipico dei corsi d'acqua, nei pressi dei quali nidifica in scarpate sabbiose. Inusuale la segnalazione, probabilmente la prima per il parco, di 1 ind. il 12.07 a San Giorgio (C. Izzo), data precoce per il periodo del passo migratorio.

Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus

Passeriforme tipico delle acque correnti collinari e montane. Nel parco è osservato facilmente solo in Val Fraselle e a Giazza, dove in agosto sono stati osservati anche alcuni juvv. (M. Sighele *et al.*), mentre è più difficile incontrarlo altrove:

- 1 cp. nidificante a Castelvero il 16.05 (M. Magagna);
- 1 ind. a Molina, Valle dei Progni, il 22.06 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Campodalbero, Val del Chiampo, il 30.10 (P. Parricelli).



Merlo acquaiolo a Giazza - G. Serafin

Sordone***Prunella collaris***

Specie comunemente osservata in Lessinia solo nei mesi invernali, da novembre a febbraio, in particolare nella zona del Pigarolo e di Castel Gaibana, a San Giorgio o a Bocca di Selva.

5-6 indd. a Castel Gaibana tra il 25.12.2007 e fine gennaio (L. Signori, G. Brazzoli);

3 indd. a San Giorgio tra il 18 e il 30.01 (M. D'offria);

1 ind. a Bocca di Selva il 19.01 (C. Izzo).

L'inverno successivo:

4-5 indd. a San Giorgio il 6.12 (C. Izzo);

1-3 indd. a Bocca di Selva tra il 7.12 e il 22.02.2009 (P. Parricelli, M. & G. Sighele, L. Lodde, R. Lerco, M. Busato *et al.*);

6-9 indd. a San Giorgio tra il 7 e il 21.12 (P. Parricelli, M. & G. Sighele, L. Lodde, R. Lerco) e in seguito fino al 28.02.2009 (G. & M. Sighele, C. Izzo, M. Allen).

Codirossone***Monticola saxatilis***

Turdide migratore poco numeroso, nidificante dell'alta Lessinia. Rispetto al 2007 si è registrato un aumento delle segnalazioni, in particolare al Pigarolo, in alta Val Squaranto e ai Tracchi.

2-3 indd. tra il Pigarolo e Spiazzi il 3.05 e 1 juv. a Dosso Alto il 12.07 (R. Lerco, F. Lui, C. Izzo);

2-3 cpp. tra Tracchi e San Giorgio tra il 6.05 e il 12.09, con nidificazione accertata sia a San Giorgio che a Branchetto (M. & G. Sighele, C. Izzo, U. Monicelli, C. Isotta, L. Signori, P. Parricelli);

1 m. in loc. Gaibana il 22.06 e 1 cp. a Malga San Nazaro il 25.06 (P. Parricelli, L. Signori).

Merlo dal collare***Turdus torquatus***

Altro tordo migratore nidificante in Lessinia. È più facile contattarlo nel settore orientale del parco, dove i primi cantori si osservano ai primi di maggio (M. D'offria), mentre il primo arrivo è stato registrato a Malga Rambalda il 6.04 (V. Fanelli).

Occhiocotto***Sylvia melanocephala***

Silvide elusivo tipico della macchia mediterranea ma anche delle oasi xerotermitiche del lombardo-veneto, che rappresentano il limite settentrionale dell'areale distributivo, al di sotto degli 800 m s.l.m. (MESCHINI, 1993). In provincia di Verona è diffuso nella fascia culturale dell'olivo (PESENTE *et al.*, 1989). Nel 2008 sono stati contattati alcuni indd. in canto a Roncà il 23.03 (C. Izzo, C. Chiappisi, U. Monicelli, M. D'offria).

Codirossone a Branchetto - C. Izzo



Picchio muraiolo***Tichodroma muraria***

Elegante passeriforme rupestre segnalato nel parco solo al di fuori del periodo riproduttivo.

1 ind. a San Giorgio il 3.02 (L. Signori);

1 ind. a Bocca di Selva il 20.02 (L. Beghellini, E. Cavallini);

1 ind. al Pigarolo il 23.10 (P. Parricelli).

Averla maggiore***Lanius excubitor***

Svernante scarso ma regolare in provincia di Verona e nel Parco della Lessinia.

1 ind., già ricordato nel resoconto 2007, è stato successivamente osservato tra San Giorgio e i Parpari fino al 18.01 (M. D'offria; SIGHELE & PARRICELLI, 2008);

1 ind. a Rosaro il 28.01 (C. Isotta);

1 ind. al Passo di Rocca Pia il 16.02 (V. Fanelli);

1 ind. svernante tra San Giorgio e Spiazzi a partire dal 20.10 fino almeno al 10.01.2009 (P. Parricelli *et al.*), forse lo stesso ind. dei due inverni precedenti (SIGHELE & PARRICELLI, 2007 e 2008);

1 ind. tra Passo Fittanze e Malga Lessinia l'8.11 (C. Isotta);

1 ind. a Malga Campedel, Erbezzo, il 25.11 (D. Benciolini, A. Saorin).

Gracchio corallino***Pyrrhocorax pyrrhocorax***

Specie diffusa sulle Alpi solo sull'arco occidentale. L'ultima segnalazione a est della Lombardia risale al novembre 1952, quando 1 ind. fu abbattuto ad Avesa (DE FRANCESCHI, 1996).

Di grande rilievo, quindi, la segnalazione di 1 ind. frammisto a Gracchi alpini a San Giorgio tra il 23 e il 26.11 (R. Lerco,

M. & G. Sighele, C. Chiappisi, P. Parricelli, G. Serafin).

Cornacchia nera***Corvus corone***

Specie poco numerosa, più frequente in periodo invernale.

1 ind. nella zona di Podestaria il 3.05 (C. Izzo);

1 ind. a Spiazzi il 24.05 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen);

1 ind. sopra Vallene il 5.10 (V. Fanelli);

1 ind. a Velo V.se il 21.11 (P. Parricelli).

Corvo imperiale***Corvus corax***

Corvide abbastanza diffuso nel parco, anche se non molto numeroso. Si segnala la concentrazione più importante rilevata.

16 indd. a Sale, Erbezzo, il 24.03 (P. Parricelli).



Fringuello alpino sul Monte Tomba - R. Lerco

Fringuello alpino

Montifringilla nivalis

Passeriforme osservato in piccoli stormi nei mesi invernali.

30-52 indd. a Castel Gaibana tra dicembre 2007 e il 9.02 (L. Signori, G. Brazzoli; SIGHELE & PARRICELLI, 2008);

1-30 indd. a Bocca di Selva tra il 18.01 e il 06.02 (M. D'offria, C. Izzo *et al.*);
fino a 50 indd. sul Monte Tomba tra l'8.01 e il 13.02 (M. Morbioli, L. Lodde, M. Sighele, L. Sebastiani).

L'inverno successivo:

11 indd. a Branchetto il 4.12 (P. Parricelli);

15-24 indd. a San Giorgio il 6-7.12 (P. Parricelli, C. Izzo);

fino a 16 ind. a Bocca di Selva tra il 7 e il 26.12 (P. Parricelli, M. D'offria) e in seguito il 28.01.2009 (R. Quirini);

1 ind. sul Monte Tomba il 27.12 (R. Lerco) e in seguito fino a 25 indd. fino al 25.01.2009 (P. Parricelli *et al.*).

Crociere

Loxia curvirostra

Questo fringillide è un comune visitatore del parco, soprattutto nei mesi invernali. Si ricorda il gruppo più numeroso segnalato.

60 indd. sul Corno d'Aquilio il 5.10 (P. Parricelli).

Zigolo delle nevi

Plectrophenax nivalis

Zigolo artico poco numeroso in Italia, nel Parco della Lessinia si conferma migratore e svernante quasi regolare, osservato in particolare a Bocca di Selva durante gli inverni più nevosi. Come già successo in passato, la presenza di questo passeriforme ha richiamato diversi appassionati da tutte le zone limitrofe per l'opportunità di osservare facilmente questo raro visitatore artico.

fino a 12 ind. a Bocca di Selva tra il 28.01 e il 13.03 (P. Parricelli, C. Izzo, M. Sighele, L. Signori, R. Boscain *et al.*);

fino a 7 ind. a Bocca di Selva dal 07.12 fino a tutto gennaio 2009 (M. D'offria, P. Parricelli, M. Sighele, G. Serafin *et al.*).

Zigolo giallo

Emberiza citrinella

Migratore molto comune, nidificante nel parco. Si segnala un'osservazione abbastanza precoce per l'alta Lessinia.

1 ind. a Bocca di Selva il 3.03 (P. Parricelli).

Ortolano

Emberiza hortulana

Specie sempre meno frequente nella zona collinare veronese, mentre nelle Alpi occidentali sono segnalate nidificazioni anche oltre i 2300 m (BRICHETTI, 1987).

1-3 ind. in canto a Velo V.se tra il 22.06 e il 6.07 (A. Petronio, M. Pesente, E. Novelli *et al.*).





Zigoli delle nevi a Bocca di Selva - R. Boscaini

Attività di inanellamento

Malga Derocon

inanellatore: Marilena Perbellini

La stazione di inanellamento si trova all'interno dell'Area floro-faunistica Malga Derocon, nella Foresta dei Folignani, ad una altitudine di 1300 m slm, in ambiente dominato dalla presenza di abete rosso (*Picea abies*) e faggio (*Fagus sylvatica*), radure prative e arbusti, in particolare nocciolo (*Corylus avellana*).

Durante il 2008 è stata eseguita una sessione di inanellamento al mese tra aprile e agosto. Complessivamente sono state inanellate 29 specie: civetta capogrosso, gufo comune, picchio rosso maggiore, regolo, fiorrancino, scricciolo, passera scopaiola, merlo, tordo bottaccio, tordela, lui piccolo, lui grosso, balia nera, pettirosso, codiroso comune, codiroso spazzacamino, capinera, cincia mora, cincia dal ciuffo, cincia alpestre, cinciarella, cinciallegra, picchio muratore, rampichino alpestre, ghiandaia, nocciolaia, fringuello, peppola, ciuffolotto.

Nei mesi di settembre e ottobre la stazione di inanellamento ha partecipato al Progetto Alpi, progetto di ricerca nazionale mirato allo studio delle modalità di attraversamento delle Alpi delle specie migratrici nel periodo autunnale. A questo progetto sono state dedicate 12 giornate di inanellamento in cui sono state inanellate 25 specie diverse per un totale di 209 indd. È emerso che l'area riveste particolare interesse per la sosta del pettirosso, seppur molto breve in quanto le ricatture sono esigue. Altra specie catturata in buon numero nel periodo migratorio autunnale è stato il regolo.

Hanno partecipato: Massimo Cavallini, Paolino Chignola, Mario Marcolini, Paolo Zanini.

Foresta di Giazza

inanellatore: Marco Morbioli

Nella stagione riproduttiva del 2008 si è tentato di attivare per il secondo anno una stazione di cattura e inanellamento a sforzo costante (PR.I.S.CO.) in loc. Rifugio Boschetto, nella foresta di Giazza.

Dopo i risultati piuttosto incoraggianti ottenuti nel 2007, e nonostante siano state posizionate più reti dell'anno precedente, nel 2008 le catture si sono rivelate piuttosto deludenti. In tre uscite effettuate nel mese di maggio, una per decade, sono stati catturati solo 27 uccelli appartenenti a 8 diverse specie: 7 capinere, 6 lui piccoli, 5 cincie more, 3 pettirossi, 2 fiorrancini, 2 scriccioli, 1 codiroso e 1 fringuello.

Il PR.I.S.CO. è un progetto di ricerca che ha come scopo principale lo studio dell'andamento a lungo termine delle popolazioni dei piccoli passeriformi. Nel breve periodo in cui la stazione di Rifugio Boschetto è stata attiva si è potuto con-



statare che almeno due specie hanno dimostrato fedeltà al sito, utilizzato prevalentemente a scopo trofico: capinera e cincia mora.

Un esemplare di cincia mora ha registrato una longevità di 456 giorni: catturato per la prima volta al Boschetto il 2.03.2007 vi è stato ricatturato il 31.05.2008. Una capinera, invece, è stata catturata in data 1.08.2007 e ricatturata il 31.05.2008, con una longevità di 304 giorni.

La stazione del Rifugio Boschetto, considerati gli scarsi risultati, è stata oggi abbandonata.



Regolo - *R. Lenco*

Specie segnalate in Lessinia nel 2008

Anseriformes

Anatidae

Alzavola *Anas crecca*

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Galliformes

Tetraonidae

Francolino di monte *Bonasa bonasia*

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*

Gallo cedrone *Tetrao urogallus*

Phasianidae

Coturnice *Alectoris graeca*

Starna *Perdix perdix*

Quaglia comune *Coturnix coturnix*

Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Ciconiiformes

Ardeidae

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Biancone *Circaetus gallicus*

Albanella reale *Circus cyaneus*

Astore *Accipiter gentilis*

Sparviere *Accipiter nisus*

Poiana *Buteo buteo*

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Falconidae

Gheppio *Falco tinnunculus*

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Smeriglio *Falco columbarius*

Lodolaio *Falco subbuteo*

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Gruiformes

Rallidae

Porciglione *Rallus aquaticus*

Charadriiformes

Charadriidae

Pavoncella *Vanellus vanellus*



Gufo comune - L. Signori

Scolopacidae

Beccaccino *Gallinago gallinago*
Beccaccia *Scolopax rusticola*
Piro piro culbianco *Tringa ochropus*
Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Columbiformes

Columbidae

Colombaccio *Columba palumbus*
Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo *Cuculus canorus*

Strigiformes

Strigidae

Assiolo *Otus scops*
Gufo reale *Bubo bubo*
Civetta *Athene noctua*
Allocco *Strix aluco*
Gufo comune *Asio otus*
Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Apodiformes

Apodidae

Rondone comune *Apus apus*
Rondone maggiore *Apus melba*

Coraciiformes

Upupidae

Upupa *Upupa epops*

Piciformes

Picidae

Toriccollo *Jynx torquilla*
Picchio verde *Picus viridis*
Picchio nero *Dryocopus martius*
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

Passeriformes

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*
Allodola *Alauda arvensis*

Hirundinidae

Topino *Riparia riparia*
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Rondine *Hirundo rustica*

Balestruccio *Delichon urbicum*

Motacillidae

Calandro *Anthus campestris*
Prispolone *Anthus trivialis*
Pispola *Anthus pratensis*
Spioncello *Anthus spinoletta*
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*
Ballerina bianca *Motacilla alba*

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Troglodytidae

Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Prunellidae

Passera scopaiola *Prunella modularis*
Sordone *Prunella collaris*

Turdidae

Pettiroso *Erithacus rubecula*
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*
Stiaccino *Saxicola rubetra*
Saltimpalo *Saxicola torquatus*





Gracchio alpino - R. Lerco

Culbianco *Oenanthe oenanthe*
Codirossone *Monticola saxatilis*
Merlo dal collare *Turdus torquatus*
Merlo *Turdus merula*
Cesena *Turdus pilaris*
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*
Tordo sassello *Turdus iliacus*
Tordela *Turdus viscivorus*

Sylviidae

Capinera *Sylvia atricapilla*
Beccafico *Sylvia borin*
Bigiarella *Sylvia curruca*
Occhiocotto *Sylvia melanocephala*
Lui bianco *Phylloscopus bonelli*
Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*
Lui piccolo *Phylloscopus collybita*
Lui grosso *Phylloscopus trochilus*
Regolo *Regulus regulus*
Fiorrancino *Regulus ignicapilla*

Muscicapidae

Pigliamosche *Muscicapa striata*
Balìa nera *Ficedula hypoleuca*

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Paridae

Cinciarella *Cyanistes caeruleus*
Cinciallegra *Parus major*
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*
Cincia mora *Periparus ater*
Cincia alpestre *Poecile montanus*
Cincia bigia *Poecile palustris*

Sittidae

Picchio muratore *Sitta europaea*

Tichodromidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Certhiidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*
Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Oriolidae

Rigogolo *Oriolus oriolus*

Laniidae

Averla piccola *Lanius collurio*
Averla maggiore *Lanius excubitor*



Averla piccola - C. Izzo

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris*

Passeridae

Passera d'Italia *Passer domesticus italiae*

Passera mattugia *Passer montanus*

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Fringillidae

Fringuello *Fringilla coelebs*

Peppola *Fringilla montifringilla*

Verzellino *Serinus serinus*

Verdone *Carduelis chloris*

Cardellino *Carduelis carduelis*

Lucherino *Carduelis spinus*

Fanello *Carduelis cannabina*

Crociere *Loxia curvirostra*

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Corvidae

Ghiandaia *Garrulus glandarius*

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*

Gracchio corallino *Pyrrhocorax pyrrhocorax*

Cornacchia nera *Corvus corone*

Cornacchia grigia *Corvus cornix*

Corvo imperiale *Corvus corax*

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Zigolo nero *Emberiza cirrus*

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

Ortolano *Emberiza hortulana*

Strillozzo *Emberiza calandra*



Merlo dal collare - M. D'offria

Bibliografia

- Brichetti P., 1987: Atlante degli uccelli delle Alpi Italiane. *Editoriale Ramperto*: pp. 212.
- Caula B. Beraudo P.L., Pettavino M., 2009: Gli uccelli delle Alpi. *Blu Ed.*: pp. 320.
- De Franceschi P., 1991: Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 154.
- De Franceschi P., 1996: Avifauna veronese. Aggiornamenti e analisi dei fattori ecologici che influiscono sulla dinamica di alcune popolazioni. *Atti Mem. Accad. Agric. Sci. Lett. Verona*, 170: 79-99.
- De Franceschi P.F. & Parricelli P., 2002: Aquila reale, Pellegrino ed altri rapaci diurni in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 25: 103-112.
- Fracasso G., Baccetti N. & Serra L., 2009: La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33 (1).
- Meschini E., 1993: Occhiocotto *Sylvia melanocephala*. In Meschini E. & Frugis S. (Eds.). Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 20: 218.
- Pesente M., Pollo R. & Sandrini A., 1989: Distribuzione dell'Occhiocotto, *Sylvia melanocephala*, nelle "oasi xerothermiche" prealpine del Veronese. *Riv. ital. Orn.* 59: 80-88.
- Sighele M. & Parricelli P. (red.), 2007: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia*: pp. 24.
- Sighele M. & Parricelli P. (red.), 2008: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2007. *Parco Naturale Regionale della Lessinia*: pp. 32.





Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia

Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
www.lessiniapark.it - guardiaparco@lessiniapark.it
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677



Verona birdwatching

www.veronabirdwatching.org
info@veronabirdwatching.org



LESSINIA = MAGIA

