

Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO
ANNO 2015

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2015 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la prima segnalazione di averla isabellina, le segnalazioni di specie assai rare come cigno minore, gallina prataiola, piro piro del Terek, piovanello violetto, piovanello pettorale, gabbiano glauco, falco della Regina, lui forestiero, o sporadiche come edredone, berta minore, sula, airone schistaceo, gipeto, poiana calzata, poiana codabianca, stercoreario mezzano, labbo codalunga, mugnaiaccio, pigliamosche pettiroso; lo svernamento di lui di Hume e zigolo golarossa; la nidificazione di occhione, falco cuculo e probabilmente zigolo capinero.

Summary. *Ornithological report for the year 2015 in the Veneto region (NE Italy).*

Some interesting data concerning wintering, breeding, migration and vagrancy in Veneto are given in systematic order. The most interesting data include first regional sighting of Isabelline Shrike, very rare species like Bewick's Swan, Little Bustard, Terek Sandpiper, Purple Sandpiper, Pectoral Sandpiper, Glaucous Gull, Eleonora's Falcon, Yellow-browed Warbler, irregular species like Common Eider, Yelkouan Shearwater, Gannet, Western Reef Heron, Lammergeier, Rough-legged Buzzard, Long-legged Buzzard, Pomarine Skua, Long-tailed Skua, Great Black-backed Gull, Red-breasted Flycatcher; wintering of Hume's Leaf-warbler, Pine Bunting; new breeding data of Stone-curlew, Red-footed Falcon and probably of Black-headed Bunting.

Keywords: birds, Aves, faunistic records, Veneto, Italy

Reference: Associazione Faunisti Veneti, 2017. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2015. *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia*, 67: 77-112.

INTRODUZIONE

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2015 relative a 162 specie di uccelli selvatici e 15 specie alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

Dove non è diversamente descritto, per ogni specie citata vengono elencate, in ordine cronologico, tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; a questo riguardo, in calce a ciascun dato viene riportata la fonte originale, eventualmente con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia BW; [3] Deltapobw; [4] EBN Italia; [5] ornitho.it. Con "censimenti IW" si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.

La sequenza e la tassonomia seguono l'ultima pubblicazione di una check-list degli uccelli italiani (BRICHETTI & FRACASSO, 2015); per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a BACCETTI et al. (2014).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes**Anatidae****Oca selvatica *Anser anser***

Si elencano una concentrazione consistente, una segnalazione in sito inusuale e casi di nidificazione al di fuori dei siti di presenza noti.

6.644 indd. in provincia di Venezia, in particolare 2.280 indd. in Valle Zignago (VE), in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

26 indd. a Pladier (BL) il 16 febbraio (M. Cassol, A. Guardiano).

1 cp. ha nidificato in Valle Ca' Zuliani (RO) con pulli osservati nei primi giorni di giugno (P. Ronconi, E. Verza, S. Volponi).

1 cp. ha nidificato al Lago del Corlo (BL), con giovani non volanti tra il 26 e il 29 luglio (M. Zenatello, R. Guerriero).

Sono le prime nidificazioni accertate per le province di Rovigo e Belluno.

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano concentrazioni consistenti.

6.450 indd. in Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

500-3.600 indd. tra Valle Zignago e Valle Vecchia di Caorle (VE) tra la prima decade di dicembre e febbraio 2016 (A. Bossi, A. Ferrantini, E. Stival et al. [5]).

Oca del Canada *Branta canadensis*

Si elencano le segnalazioni in località inusuali al di fuori della provincia di Treviso.

18 indd. a Rubano (PD) il 2 gennaio (G. Piras [5]).

4-11 indd. a Villa Contarini, Piazzola s/B (PD), tra il 6 e il 20 gennaio, 1 ind. il 5 marzo (L. Schiavon, G. Piras, A. Paiusco [5]).

1 ind. in Valle Pieriempiè (VE) il 9 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1-2 indd. alle Risorgive di Dueville (VI) tra il 14 e il 18 marzo (A. Alberi, A. Martella [4]).

1 ind. nei pressi di Monselice (PD) il 27 marzo (A. Prestileo [5]).

1 ind. a Valstagna (VI) il 30 maggio (P. Melandri [5]).

1 ind. a Bassano del Grappa (VI) il 25 luglio e poi il 3 dicembre (U. Esslinger, M. Mozzoni [5]).

2 indd. al Lago del Corlo (BL) tra il 26 luglio e il 6 settembre (M. Zenatello, D. Ronconi, E. Cavallini [5]).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. a Saletto di Breda di Piave (TV) tra gennaio e febbraio, quindi ancora il 21 dicembre (L. Boscain et al. [4]); individuo verosimilmente aufugo qui già segnalato dal 2008 (cfr. SIGHELE et al. 2009, 2010, 2011, 2014).

1 ind. in volo a Valle Perera (VE) il 31 ottobre (E. Stival).

Cigno nero *Cygnus atratus*

Non sono elencati individui dal comportamento chiaramente confidente.

1-3 indd. in Laguna Nord di Venezia per tutto l'anno, specialmente in Palude di Cona, dove uno è stato segnalato dal 2013 (A. Schneider, E. Stival et al. [2] – cfr. SIGHELE et al., 2014, 2015).

2 indd. in Valle Contarina e 2 indd. in Valle Zappa (VE) il 9 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

4 indd. in Valle Zignago e 14 indd. in Valle Perera (VE) il 12 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 ind. nel golfo di Peschiera (VR) l'8 febbraio (E. Toffali, P. Tarasco [1]).

1 ind. in volo sopra Volte Grandi, Mira (VE), il 10 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi [5]).

2 indd. in Valle Perera (VE) il 31 dicembre (Y. Rime).

Cigno reale *Cygnus olor*

Si riporta la concentrazione più consistente.

508 indd. nel Delta del Po (RO) tra il 12 e il 14 gennaio (censimenti Sagittaria).

Cigno minore *Cygnus columbianus*

1 ind. in Valle Morosina (PD) il 9 gennaio (A. Schneider [2] [4]).

L'ultima segnalazione in Veneto di questa specie risale al 2011, quando è stata osservata nello stesso sito (SIGHELE et al., 2012).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

Non sono elencati individui dal comportamento chiaramente confidente.

2-5 indd. alle sorgenti del Tione dei Monti, Pastrengo (VR), osservati tutto il corso dell'anno, qui segnalati dal 2012 (C. Zanini, M. Sighele, S. Tascio et al. [1] – cfr. SIGHELE et al., 2013, 2014, 2015).

2-10 indd. a Borghetto, Valeggio s/M (VR), osservati tutto il corso dell'anno; almeno 1 cp. ha nuovamente nidificato (M. Cordioli, E. Cavallini, F. Lezzi, R. Rodriguez et al. [1] – cfr. SIGHELE et al., 2014, 2015).

4 indd. in Valle Zignago e 2 indd. in Valle Perera (VE) il 12 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 ind. nei pressi di Ca' Tron (VE) il 13 aprile (G. Sgorlon [5]).

5-8 indd. nei pressi di Castelnuovo d/G (VR) tra il 22 aprile e il 28 agosto; 1 cp. ha nidificato, con pulli presenti in aprile (C. Zanini [1]).

6 indd. alla garzaia di Pederobba (TV) tra il 9 e il 12 giugno (G. Silveri [5]).

2 indd. a Peschiera d/G (VR) il 13 settembre (R. Rodriguez, D. Bernasconi [5]).

2 indd. in Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 novembre (L. Benatelli [5]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano concentrazioni consistenti, segnalazioni in acque interne e un caso di riproduzione in ambiente inusuale.

23.999 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 5.050 indd. in Valle Figheri (VE), in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1-6 indd. nel golfo di Peschiera (VR) tra l'11 e il 19 gennaio (G. Sighele et al. [1] [5]).

19.916 indd. nel Delta del Po (RO) tra il 12 e il 14 gennaio (censimenti Sagittaria).

1 ind. alla Busa di Giaretta (PD) il 31 gennaio (F. Moretto [5]).

1 ind. a Quinto di Treviso l'1 febbraio (F. Salvini [5]).

- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) l'1 febbraio (G. Tormen).
 7 indd. a Ca' Tron (TV) il 13 aprile (G. Sgorlon, G. Cellini [2] [4]).
 1 ind. in risaia a Calcinaro (VR) il 22 aprile (E. Cavallini [1]).
 3 indd. in risaia a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), tra il 23 e il 26 aprile (C. Zanini, M. Lezzi, M. Sighele, G. Sighele et al. [1]).
 8 pulli nati in loco recuperati in un'area condominiale del centro abitato di Favaro Veneto (VE) il 26 maggio (L. Panzarin).
 1.500 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 5 dicembre (D. Trombin).
 4 indd. a Pacengo (VR) il 30 dicembre (A. Mosele [5]).

Casarca *Tadorna ferruginea*

Non sono elencati individui dal comportamento chiaramente confidente.

- 1 ind. a Valli di Brenta (VE) tra il 7 gennaio e il 9 marzo (L. Sattin, E. Stival, M. Cargasacchi, A. Schneider et al. [2] [4]).
 1 ind. in Valle Ripiego (RO) il 13 gennaio (L. Bedin, D. Sartori et al.).
 6 indd. in Valle Zignago il 12 gennaio e 2 indd. a Brussa di Caorle (VE) il 24 gennaio (censimenti IW, E. Stival, M. Cargasacchi, D. de Marchi [2] – cfr. BASSO & BON, 2015).
 2 indd. a Nervesa della Battaglia (TV) il 21 marzo (V. Polo [5]).
 1 ind. sul Piave a Spresiano (TV) l'1 maggio (gruppo Verona Birdwatching [1]).
 1 ind. a San Michele Vecchio (VE) il 13 giugno (M. Zanetti – cfr. ZANETTI, 2016).
 1 ind. al Lago del Restello (TV) il 10 agosto (F. Mezzavilla [5]).
 1 ind. a Carturo di Piazzola s/B (PD) il 27 ottobre (A. Paiusco [5]).
 1 ind. in Valle Segà (RO) il 5 dicembre (E. Verza [5]).

Canapiglia *Anas strepera*

Si elencano concentrazioni consistenti e informazioni relative alla nidificazione.

- 319 indd. in Laguna Nord di Venezia in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).
 500 indd. in Valle Bagliona (RO) il 14 gennaio (L. Bedin).
 532 indd. nel Delta del Po (RO) il 23 e il 25 febbraio (censimenti Sagittaria).
 La specie si conferma nidificante nel Delta del Po (RO) nei tre settori vallivi di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle, con una popolazione di almeno 10 cpp. (censimenti Sagittaria).

Fischione *Anas penelope*

Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione in sito inusuale.

- 11.757 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 7.000 indd. in Valle Cavallino (VE), tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).
 38.269 indd. nel Delta del Po (RO) tra il 12 e il 14 gennaio, con 22.500 indd. in Valle Ca' Pasta, 34.540 indd. nel Delta del Po (RO) il 10 febbraio (censimenti Sagittaria).
 1 cp. in pozza d'alpeggio ai Parpari, Lessinia (VR), 1.400 m slm, il 20 novembre (M. D'offria [1]).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si riporta la concentrazione più consistente.

- 57.813 indd. in Laguna di Venezia tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

Codone *Anas acuta*

Si riporta la concentrazione più consistente.

7.328 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 6.000 indd. in Valle Cavallino (VE), tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

Marzaiola *Anas querquedula*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale e concentrazioni consistenti.

2 indd. in Valle Pierimpiè (VE) e 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 9 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

280 indd. in Palude di Cona (VE) il 12 aprile (A. Schneider [2] [4]).

500 indd. in Valle Ca' Pasta (RO) il 22 aprile (E. Verza).

Alzavola *Anas crecca*

Si elencano concentrazioni consistenti e un caso di riproduzione.

173.273 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 59.630 in Valle Serraglia (VE), 51.150 indd. in Valle Morosina (PD) e 40.227 in Valle Dragojesolo (VE), tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

20.401 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 13 gennaio, 13.450 indd. il 23 febbraio (L. Zanella).

1 cp. ha nidificato alla Tenuta Civrana (VE), con presenza di pulli alla fine di giugno (A. Tonelli [2]).

Fistione turco *Netta rufina*

Si elencano concentrazioni consistenti, informazioni relative alla nidificazione e segnalazioni in località inusuali al di fuori delle province di Verona e Venezia.

96 indd. sulla sponda veronese del Lago di Garda (VR) l'11 gennaio (censimenti IW [1]); successivamente presenze costanti di 50-60 indd. tra Garda e Peschiera d/G e 30-50 indd. nei pressi di Malcesine. La nidificazione è stata nuovamente accertata con 1 cp. a Peschiera d/G, 1 cp. a Lido Campanello, 3 cpp. a Cisano e 1 cp. a Malcesine, con la presenza di pulli tra giugno e settembre (M. Cordioli, F. Bricolo, F. Roscelli et al. [1]).

Presenza costante a Valle Vecchia di Caorle (VE) con concentrazioni più consistenti di 20-30 indd. tra gennaio e marzo (F. Salvini, A. Nardo [2]); almeno 1 cp. ha nidificato, con presenza di pulli il 15 giugno (A. Bossi [5]).

2 indd. a Valle Morosina (PD) l'8 e il 9 gennaio (L. Sattin, A. Schneider [5]).

1 m. alla Busa di Giaretta (PD) il 10 marzo e 4 mm. il 9 maggio (F. Moretto [5]).

1 cp. ha nidificato nelle valli di Rosolina (RO), accertata nel mese di giugno (E. Verza); in seguito 6 indd. il 5 dicembre (E. Verza).

1 cp. ha nidificato in Cassa di colmata "D/E" (VE), con presenza di pulli il 3 luglio (F. Scarton).

1 ind. a Busche (BL) tra il 18 settembre e il 22 novembre (N. Barp, G. Tormen, S. De Col).

Moriglione *Aythya ferina*

Si riporta la concentrazione più consistente.

1.200 indd. al Laghetto del Frassino (VR) nel mese di gennaio (M. Sighele et al.).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano concentrazioni consistenti e segnalazioni in periodo invernale o riproduttivo.

1 m. a Peschiera d/G (VR) tra l'1 e il 15 gennaio (R. Lerco, M. Sighele, E. Cavallini et al. [1] [5]).

1-4 indd. al Laghetto del Frassino (VR) tra l'1 e l'11 gennaio (M. Sighele, R. Vignola et al. [1] [5]).

3-4 indd. in Cassa di colmata "A" (VE) tra il 9 e il 30 gennaio (O. Trebbi).

22 indd. in Valle Zappa (VE) e 1 ind. in Valle Morosina (PD) il 9 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

25 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 12 gennaio, 29 indd. il 3 febbraio (A. Luchetta et al.).

4 indd. in golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 13 gennaio (F. Piccolo, M. Cargasacchi).

1 cp. in Cassa di colmata "A" (VE) il 26 maggio (F. Scarton).

1 juv. volante a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 10 agosto (G. Sgorlon).

12 indd. alle cave di Camacici (VR) il 16 agosto, 17 indd. il 10 ottobre (M. Sighele, G. Sighele, P. Bertini, C. Chiappisi, M. Allen et al. [1]).

15-20 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 22 settembre e il 31 ottobre (A. de Faveri, A. Bossi, R. Castellani et al. [5]).

1 indd. a Peschiera d/G (VR) tra il 2 e il 28 dicembre (E. Cavallini et al. [1] [5]).

3-10 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l'8 dicembre e gennaio 2016 (A. Ferrantini, A. Pastorini, F. Piccolo et al. [2] [5]).

1 ind. al Lago di Santa Maria (TV) il 26 dicembre (C. Sent [5]).

Moretta *Aythya fuligula*

Si elencano una concentrazione consistente e informazioni relative alla nidificazione.

1.600 indd. al Laghetto del Frassino (VR) nel mese di gennaio (M. Sighele et al. [1]).

19 cpp. hanno nidificato al Parco del Fiume Sile (TV) con la presenza di pulli a partire dal 18 giugno (F. Salvini, F. Mezzavilla).

1 cp. ha nidificato al Lago di Busche (BL), con presenza di 5 pulli il 3 agosto (N. Barp, F. Scarton).

Moretta grigia *Aythya marila*

1-2 indd. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 3 gennaio e il 7 marzo, 4 indd. il 12 marzo (M. Sighele, A. Motta, C. Gianella et al. [1] [5]).

2-3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 4 gennaio e il 21 marzo, ma 7-10 indd. tra il 4 e il 12 marzo (R. Castellani, E. Stival, M. Cargasacchi, P. Vacilotto et al. [2] [4] [5]).

3 indd. in Valle Morosina (PD) l'8 e il 9 gennaio (L. Sattin, A. Schneider [2] [5]).

4 indd. a Bibione (VE) il 12 marzo (D. Bacchin [5]).

1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 21 novembre (A. Pasqua [4] [5]).

1 ind. al Biotopo Bonello (RO) tra il 29 novembre e il 16 dicembre (A. Pastorini, M. Tassinari, M. Crivellari, M. Passarella, F. Piccolo [2] [5]).

Edredone *Somateria mollissima*

1 m. alla foce del Brenta (VE) tra il 3 e il 18 gennaio (A. Schneider, L. Siddi et al. [2] [4] [5]).

Orco marino *Melanitta fusca*

3 ind. alla foce del Brenta (VE) tra l'1 e il 9 gennaio (A. Bossi, M. Cargasacchi et al. [2] [3] [4] [5]).

4-14 ind. tra Pellestrina e San Nicolò al Lido (VE) tra il 2 e il 12 gennaio (L. Sattin, M.G. Mitri [5]).

1 ind. al faro di Bibione (VE) il 12 gennaio (A. Schneider).

2 ind. nel golfo di Peschiera (VR) il 18 gennaio (C. Izzo, C. Chiappisi [1]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

1 ind. alla foce del Brenta (VE) tra il 3 e il 7 gennaio, poi 1 ind. il 28 febbraio e 1 ind. il 3 aprile (L. Siddi, A. Schneider, M. Busato).

33 ind. a Cortellazzo (VE) il 7 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

8-20 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 31 gennaio e il 2 febbraio (P. Venturi, N. Adestri, A. Bossi [5]).

1 ind. alla foce dell'Adige (VE/RO) il 31 luglio (A. Schneider).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

1 ind. in Valle Ca' Zane (VE) l'8 gennaio (M. Bon, S. D'Alterio).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

1 m. nei laghetti dell'Area naturalistica di Piazzola s/B (PD) il 21 gennaio (G. Piras [5]).

1 m. alla Busa di Giaretta (PD) tra il 7 e il 26 febbraio (F. Moretto et al. [5]).

Pesciaiola *Mergellus albellus*

1 ind. a Porto Bergamini, Peschiera d/G (VR), il 22 dicembre (M. Azzolini [1]).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano una concentrazione consistente e un nuovo sito riproduttivo.

2-12 ind. nel medio Garda tra Torri d/B e Navene (VR) durante tutto l'anno (R. Lerco, M. Sighele, G. Sighele, M. Allen, L. Mazzola et al. [1] [5]). Una covata di 11 pulli da poco usciti dal nido tra Torri d/B e Brenzone l'1 e il 9 giugno (P. Gialdi, L. Mazzola [1]), una covata di 5 pulli a Navene il 6 luglio (F. Angeli [5]).

15 ind. in volo in Valle Millecampi (PD) il 18 marzo (R. Manzi [5]).

Le nidificazioni sulla sponda orientale del Garda sono le prime accertate per la provincia di Verona.

Smergo minore *Mergus serrator*

Si elencano segnalazioni in periodo poco usuale.

1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 7 maggio e il 26 giugno (C. Sent, F. Scarton [2] [5]).

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 4 gennaio e il 7 febbraio (M. Sighele, G. Sighele et al. [1]).

Si tratta dell'ottava segnalazione per il Veneto (SIGHELE et al., 2011, 2013, 2014, 2015; SIGHELE, 2012).

Galliformes
Phasianidae**Pernice rossa *Alectoris rufa***

Si riporta una concentrazione consistente.

19 indd. a Brussa di Caorle (VE) il 31 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi).

Gaviiformes
Gaviidae**Strolaga minore *Gavia stellata***

1 ind. in Laguna Nord di Venezia in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1-3 indd. tra Pellestrina e San Nicolò del Lido (VE) tra il 24 dicembre 2014 e il 10 gennaio (A. Luchetta, A. Ferrantini, S. Castelli, M.G. Mitri [5] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 9 gennaio (M. Passarella).

1-2 indd. tra Malamocco e San Nicolò del Lido (VE) tra il 29 novembre e il 12 gennaio 2016 (S. Castelli, M.G. Mitri [2] [5]).

1 ind. alla foce del Brenta (VE) tra il 14 dicembre e l'8 gennaio 2016 (M. Passarella, A. Schneider).

1 ind. a Porto Baseleghe (VE) il 31 dicembre (Y. Rime, M. Amstutz, G. Hauser).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

18 indd. sulla costa orientale del Lago di Garda (VR) l'11 gennaio (censimenti IW [1]).

20-25 indd. nel medio Lago di Garda a nord di Torri d/B (VR) il 27 dicembre (S. Grossule, C. Mantovani, M. Crema, N. Grattini [1] [5]).

Procellariiformes
Procellariidae**Berta minore *Puffinus yelkouan***

8 indd. alla foce dell'Adige (VE/RO) il 14 settembre (A. Schneider).

Podicipediformes
Podicipedidae**Svasso collaroso *Podiceps grisegena***

3 indd. in Laguna Sud di Venezia in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 ind. nel Canale Saccagnana (VE) l'8 e il 13 febbraio (M. Sighele, G. Sighele, A. Pastorini [2]).

1 ind. a Malcesine (VR) il 10 aprile (S. Schliemann).

1 ind. alla foce del Po di Gnocca il 19 novembre, 1 ind. nel Biotopo Bonello il 22 novembre e 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 29 novembre, qui poi segnalato anche nel gennaio

2016 (D. Trombin, G. Gaudenzi, R. Aletti, L. Giussani et al. [4]).

1 ind. a San Nicolò al Lido (VE) il 30 novembre (M.G. Mitri [2] [5]).

2 indd. a Castelletto di Brenzone (VR) il 23 dicembre (E. Crepet [5]).

1 ind. a Fornaci, Peschiera d/G (VR), il 23 dicembre (G. Sighele, C. Izzo [1]).

2 indd. a nord di Torri d/B (VR) il 27 dicembre (M. Crema, C. Mantovani, N. Grattini [5]).

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

Si riporta la concentrazione più consistente.

1.000 indd. ca. davanti a Maraschina, Peschiera d/G (VR), tra il 28 febbraio e il 7 marzo (M. Allen, M. Sighele, G. Sighele [1]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 30 gennaio (H. Frind [5]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 novembre e 3 indd. il 13 dicembre, ancora 1 ind. nel gennaio 2016 (D. Trombin, M. Passarella et al. [4]).

1 ind. in Laguna Vallona (RO) il 28 dicembre (G. Perdisa, G. Leoni [5]).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopus roseus*

Si elencano concentrazioni consistenti.

6.806 indd. in Laguna di Venezia, in particolare 2.672 indd. in Valle Dogà (VE) e 1.400 in Valle Pierimpiè (VE), tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

3.557 indd. nel Delta del Po (RO) tra il 12 e il 14 gennaio (censimenti Sagittaria).

3.883 indd. nel Delta del Po (RO) il 23 e 25 febbraio (censimenti Sagittaria).

Ciconiiformes

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

1 ind. in volo ad Albignasego (PD) il 5 gennaio (D. Bacchin [4] [5]).

1 ind. in volo a Cimadolmo (TV) il 13 marzo (F. Zanatta).

1 ind. in sosta a Casale sul Sile (TV) il 19 marzo (A. Catalano).

1 ind. in volo a Povegliano (TV) il 21 marzo (F. Zanatta).

1 ind. in sosta a Canton (TV) il 22 marzo (L. Panzarin [5]).

1 ind. in volo a Cimadolmo (TV) il 4 maggio (F. Zanatta).

1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) l'8 maggio (A. Tonelli [5]).

2 indd. in volo a Pederobba (TV) il 9 maggio (G. Silveri [2] [4]).

1 ind. a Spinea (VE) il 27 maggio (L. Sattin [5]).

1 ind. in sosta a Limana (BL) il 9 giugno (R. Deon).

1 ind. in sosta a Tezze s/B (VI) il 19 luglio (F. Moretto).

1 ind. in volo sopra la Cassa di colmata "A" (VE) il 5 agosto (F. Scarton [5]).

1 ind. a Pederobba (TV) l'11 agosto (G. Silveri).

Durante il monitoraggio della migrazione post-riproduttiva: a Colle San Giorgio (TV) 3 indd. il 22 agosto, 8 indd. il 23 agosto e 1 ind. il 28 agosto (F. Salvini, R. Storer, M. Nalin [4] [5]); sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) 5 indd. il 24 agosto, 1 ind. il 26 agosto, 2 indd. il 29 agosto (A. Gargioni, D. Lampugnani, S. Bellintani).

1 ind. in volo a Treviso il 23 agosto (R. Storer [5]).

1 ind. in volo a Caorle (VE) il 28 agosto (A. Boldrini [4] [5]).

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e una segnalazione nella provincia di Vicenza, dove la specie è assai poco segnalata.

20-22 indd. a Isola della Scala (VR) tra il 15 e il 20 febbraio (M. Sighele, G. Sighele, E. Grippo et al. [1]).

1 ind. all'Oasi Stagni di Casale (VI) il 7 maggio (F. Farinello et al.).

44 indd. alle foci del Po di Gnocca (RO) il 12 settembre (N. Adestrini [5]).

36 indd. a Bagnolo di Po (RO) il 24 dicembre (S. Prando).

23 indd. a Isola della Scala (VR) il 24 dicembre (A. Mosele [5]).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

1-3 indd. in Vallesina, Ca' Noghera (VE), tra il 18 gennaio e il 16 giugno (E. Stival, O. Trebbi, A. Sartori et al. [2] [5]); uno di questi individui, osservato il 14 marzo, il 3 e l'11 aprile, marcato con anello colorato francese "0JTL" (O. Trebbi, M. Cargasacchi), era stato inanellato da pullo in Camargue, Francia, nel maggio 2014 (archivio ISPRA).

1-2 indd. alla Tenuta Civrana (VE) il 20 e il 23 marzo, poi ancora 1 ind. l'1 maggio (A. Tonelli [2] [5]).

1 ind. a Bonelli di Porto Tolle (RO) il 14 dicembre (M. Tassinari [5]).

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano concentrazioni consistenti e un'interessante presenza in periodo riproduttivo.

82 indd. in Laguna Nord di Venezia, in particolare 78 indd. in Valle Dogà (VE), l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

48 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 13 gennaio (L. Zanella).

51-77 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) tra il 6 e il 24 febbraio (E. Stival, M. Cargasacchi, L. Bedin, N. Donà et al.).

3 adulti in garzaia della Tenuta Civrana (VE) tra il 4 e il 12 maggio, ma nessuna ulteriore evidenza di nidificazione (A. Tonelli).

55 indd. in Valle Avertò (VE) il 14 luglio (A. Luchetta).

40 indd. in Valle Chiusa (RO) il 27 agosto (E. Cavallini [5]).

46 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 5 dicembre (D. Trombin).

Ardeidae

Tarabuso *Botaurus stellaris*

Si elencano segnalazioni in sito o periodo inusuali.

1 ind. a Busche (BL) l'1 maggio (gruppo Verona Birdwatching [1]).

1 ind. a Levego, Belluno, il 12 maggio (G. Tormen, S. De Col).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Si elencano concentrazioni consistenti durante il periodo invernale e una segnalazione in sito inusuale.

230 indd. in Valle Dogà e 63 indd. in Valle Figheri (VE) tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

92 indd. in golena Carpano, Po di Maistra (RO), il 13 gennaio (F. Piccolo).

86 indd. nel tratto Romea - foce del fiume Adige (RO) il 14 gennaio (L. Bedin).

1 ind. a Levego, Belluno, il 12 maggio (G. Tormen, S. De Col).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Si elencano un nuovo sito riproduttivo e una segnalazione in località inusuale.

La specie ha nidificato in provincia di Vicenza all'Oasi Stagni di Casale (VI), con pulli al nido ai primi di giugno (F. Carraro); in quest'oasi la specie si riproduce almeno dal 2012 (G. Fracasso et al.).

5-15 indd. a Prati di Bosco Chiesanuova (VR), 700 m s.l.m., il 2 e il 3 dicembre (M. Benedetti, P. Parricelli et al. [1]).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

Si elencano una segnalazione di individuo marcato e un nuovo caso di nidificazione.

1 ind. a Trevenzuolo (VR) il 2 gennaio, marcato con anello ungherese "J95" (G. Sighele et al. [1]); era stato inanellato in Ungheria nel maggio 2014 (archivio ISPRA).

Almeno 1 cp. ha nidificato alla Tenuta Civrana (VE), con adulti in cova a maggio e pulli dalla seconda metà di giugno (A. Tonelli).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. in Valle Cannelle (RO) il 2 maggio (M. Marcone [5]).

1 ind. nel basso Garda tra Peschiera d/G (VR) e Desenzano d/G (BS) tra il 2 agosto e il 25 ottobre, nel Veronese tra l'11 e il 30 agosto, poi ancora il 20 settembre (G. Dalle Vedove, A. Gargioni, M. Sighele, G. Sighele et al. [1]).

Dovrebbero rappresentare la tredicesima e la quattordicesima segnalazione per il Veneto, esclusi gli individui ibridi.

Suliformes

Sulidae

Sula Morus bassanus

5 indd. a Porto Baseleghe (VE) il 28 giugno (F. Salvini [5]).

1 ind. a Porto Santa Margherita (VE) il 7 agosto (P. Vacilotto [4]).

Phalacrocoracidae

Marangone minore *Microcarbo pygmeus*

Si elencano la concentrazione più consistente e segnalazioni in località inusuali; sembra evidente l'espansione progressiva degli ultimi anni dalla costa verso l'interno lungo i corsi dei fiumi, soprattutto Sile, Brenta e Bacchiglione.

7.828 indd. contati ai dormitori in gennaio in provincia di Venezia, in particolare 6.000 in Valle Dragojesolo (censimenti IW).

2 indd. a Pederobba (TV) il 2 febbraio, 1 ind. il 18 luglio, 2 indd. l'11 ottobre (G. Silveri [4]).

1 ind. sul Brenta tra Limena e Piazzola s/B (PD) il 22 marzo e il 20 aprile, 9-23 indd. tra il 29 giugno e il 4 luglio, 5 indd. il 13 settembre (A. Schneider [2]).

2 indd. nell'Oasi di Volta Grimana (RO) il 22 marzo (M. Passarella), località al margine occidentale del Delta del Po.

6-7 indd. portano materiale al nido ai laghetti di Marteggia (VE) il 23 marzo (L. Panzarin).

1 ind. in volo al Lago di Santa Croce (BL) il 27 maggio (F. Mezzavilla [5]).

1 ind. sul Bacchiglione a Selvazzano Dentro (PD) il 16 giugno (M. Busato [5]).

1 ind. in volo a Loreggia (PD) il 20 giugno (D. de Marchi [5]).

12 indd. alla Busa di Giarretta (PD) il 24 giugno, 1 ind. il 31 luglio, il 6 settembre e il 27 novembre (F. Moretto).

3 indd. a Tezze s/B (VI) il 19 luglio e 5 indd. il 29 agosto (F. Moretto [5]).

1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) l'11 settembre (G. Oliosio [1]).

1 ind. all'Oasi Stagni di Casale (VI) il 20 settembre e 10 indd. il 19 dicembre (M. Dal Zotto, I. Martini [5]).

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Si elencano informazioni relative a nuovi siti riproduttivi.

189 cpp. hanno nidificato nelle garzaie del Bacucco e dell'Oasi Valpisani (RO), con pulli al nido da aprile (censimenti Sagittaria).

1 cp. ha nidificato all'Oasi Stagni di Casale (VI) con la costruzione del nido a partire dalla prima metà di febbraio (F. Farinello et al.).

Quella dell'Oasi Stagni di Casale è la prima nidificazione nota per la provincia di Vicenza.

Accipitriformes

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Si elencano segnalazioni al di fuori dei periodi migratori.

1 ind. in Val Nova (VE) il 12 gennaio (M. Bernardi, A. Nardo).

1 ind. in Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 gennaio (M. Darpin [5]).

1 ind. nella Cassa di espansione di San Germano d/B (VI) il 3 giugno (G. Fracasso [5]).

Accipitridae

Gipeto *Gypaetus barbatus*

1 ind. dotato di GPS satellitare è stato rilevato nell'alto Agordino, nel Longaronese e sul Monte Dolada (BL) il 6 e il 7 aprile (F. Genero – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

1 ind. del secondo calendario a Bocca di Selva in Lessinia (VR) il 20 ottobre (C. Izzo [1] – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

Rappresentano la settima e l'ottava segnalazione veneta del secolo (BON et al., 2007; SIGHELE et al., 2010, 2011, 2013).

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si elencano una segnalazione di riproduzione in pianura e i conteggi durante la migrazione post-riproduttiva.

1 pullo raccolto alle Grave del Piave a Maserada (TV) il 24 luglio (A. Barbon, L. Panzarin). Durante la migrazione post-riproduttiva sui Colli Asolani (BL/TV) sono stati contati 5.821 indd. con picco di 1.000 indd. il 20 agosto (F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri, G. Martignago, D. Foltran et al. [4]). Sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) sono transitati 9.181 indd. tra il 20 e il 31 agosto con punta di 2.618 indd. il 26 agosto (GARGIONI, 2015).

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. in volo sopra la garzaia di Pederobba (TV) il 24 febbraio (G. Silveri – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

1 ind. in loc. Belvedere, Cime dei Bachet (BL) l'1 luglio (F. Friz – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

3 indd. sul Monte Campomolon (VI) l'1 luglio (G.M. Zago – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

1 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 21 ottobre (C. Pilat, W. Zanatta – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

1 ind. nel Bellunese il 25 ottobre dapprima sul Monte Palmar, poi sul Monte Pizzocco, infine sul Monte Talvena (S. Bertoldin, R. Moz, G. Levis, M. Bellotto, S. Casal – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

1 ind. in volo sul Monte Pasubio (VI) il 22 novembre (E. Carta – cfr. SIGHELE & TORMEN, 2015).

Aquila anatraia maggiore *Clanga clanga*

1 ind. in Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 ind. al Bosco delle Lame (VE) il 14 marzo (F. Scarton).

1-3 indd. tra Valle Zignago, Valle Perera e Brussa (VE) tra l'11 novembre e marzo 2016 (E. Stival, M. Cargasacchi, M. Darpin et al. [2] [5]). In Valle Zignago questi individui sono stati osservati alimentarsi di nutrie (L. Panzarin).

Astore *Accipiter gentilis*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

1 ind. a Ca' Savio (VE) l'11 marzo (C. Rigato – cfr. ZANETTI, 2016).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 18 marzo (A. Bossi [2]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

- 1 m. all'Oasi degli Alberoni (VE) il 28 marzo (S. Castelli [5]).
1 ind. a Vivaro, Dueville (VI), il 19 aprile (I. Martini).
1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 20 aprile e 1 ind. il 29 aprile (G. Sgorlon [2] [4] [5]).
1 m. a Chiarano (TV) il 2 maggio (A. Lippi [5]).
1 ind. a Spresiano (TV) il 3 maggio (F. Zanatta).
1 ind. sul Sile nei pressi di Badoere (TV) il 12 settembre (F. Salvini [5]).
1 ind. del 1° anno sul Monte Tomba, Lessinia (VR), il 18 settembre (P. Melotti [1]).

Albanella minore *Circus pygargus*

Si riporta una segnalazione di individuo marcato.

- 1 ind. del 1° anno a Castelnuovo d/G (VR) il 2 settembre, marcato con combinazione di anelli colorati tedeschi (E. Burato); era stato inanellato da pullo due mesi prima nei pressi di Bochow, Germania, l'8 luglio (archivio Hiddensee Bird Ringing Centre).

Nibbio reale *Milvus milvus*

- 1 ind. a Verona il 21 gennaio (C. Izzo [1]).
1 ind. a Cittadella (PD) il 21 febbraio (D. de Marchi [5]).
1 ind. sul Sile verso Badoere (TV) il 2 marzo (F. Salvini [5]).
1 ind. a Meolo (VE) il 3 marzo (A. Pastorini).
1 ind. all'Isola di Papadopoli (TV) l'1 aprile (F. Zanatta).
1 ind. in Val Visdende, Sappada (BL), il 20 aprile (A. Bossi [5]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 2 settembre (A. Tonelli [2] [5]).
1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 settembre (L. Nigro [5]).
1 ind. a Tessera, Venezia, il 18 ottobre (A. Pastorini).
1 ind. sul Monte Baldo (VR) il 22 ottobre (P. Faifer [4]).
1 ind. a Porto Tolle (RO) il 30 ottobre (F. Fanesi [5]).
1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 6 novembre (A. Tonelli [2] [5]).
1 ind. sul Po di Gnocca (RO) il 19 novembre (D. Trombin).
1 ind. a Lido Campanello (VR) il 22 novembre (A. Mosele [5]).
1 ind. al Lido di Venezia il 28 novembre (S. Castelli, M.G. Mitri, F. Antinori [2] [5]).
1 ind. a Quinto di Treviso il 30 novembre (F. Zanatta).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

- 1 ind. nei pressi di Malga Lessinia (VR) tra il 9 novembre e aprile 2016 (L. Signori, P. Canali, L. Benciolini et al. [1]).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

- 1 ind. a Lio Piccolo (VE) il 31 maggio (A. Bertotto [4]).

Poiana *Buteo buteo*

Si riporta un caso di riproduzione in sito inusuale di pianura.

- 2 juvv. non ancora involati presso il nido posto in un fienile di una casa colonica abbandonata a Loncon di Annone Veneto (VE) l'11 giugno (L. Panzarin).

Otidiformes**Otididae****Gallina prataiola *Tetrax tetrax***

1 ind. a Millepertiche, Musile di Piave (VE), il 4 marzo (M. Antoni, L. Marin – cfr. ZANETTI, 2016).

Si tratta della sesta segnalazione nota per il Veneto negli ultimi venticinque anni (SGORLON & SIGHELE, 2016; SIGHELE et al., 2011, 2013, 2014).

Gruiformes**Rallidae****Re di quaglie *Crex crex***

Si elencano segnalazioni in località poco usuali.

1 ind. a Velo V.se (VR) il 15 giugno (L. Signori, F. Bragantini [1]).

1 ind. a Malga Valpiana, Lessinia (VR), il 2 luglio (M. D'offria [1]).

2-3 indd. a Pagani, Lessinia (VR), il 6 e l'11 luglio (M. Allen et al. [1]).

Folaga *Fulica atra*

Si riporta la concentrazione più consistente.

29.266 indd. in Laguna di Venezia tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

Gruidae**Gru *Grus grus***

Si elencano individui in sosta durante il periodo invernale o gruppi molto numerosi.

1 ind. alla Palude delle Zumelle (VE) il 12 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

433 indd. in tre stormi sopra Valle Vecchia di Caorle (VE) il 4 marzo (P. Vacilotto et al. [4]).

400 indd. in due stormi in volo sopra Mestre (VE) il 26 novembre e 330 indd. il 31 dicembre (C. Sent, P. Ugo, M. Cargasacchi [2]).

345 ind. a Porto Baseleghe (VE) il 31 dicembre (M. Amstutz et al. [5]).

Charadriiformes**Burhinidae****Occhione *Burhinus oedicnemus***

6-7 indd. nel medio corso del Piave (TV) durante l'inverno 2014-2015 (A. Barbon, L. Boscain et al. – cfr. SIGHELE et al., 2015).

Almeno 20 cpp. hanno nidificato tra Nervesa della Battaglia e Maserada s/P (TV) con pulli presenti in giugno e luglio (A. Barbon, F. Zanatta, D. Giunchi et al.); 1 ind. marcato con

anello il 29 giugno è stato ricatturato a Misurata, Libia, il 5 novembre (A. Barbon, com. pers.).

1 ind. alla Palude del Dossetto (VE) il 26 agosto (M. Sighele, G. Sighele, R. Vignola).

Fino a 18 indd. nel medio corso del Piave (TV) durante l'inverno 2015-2016 (A. Barbon, L. Panzarin, E. Stival, M. Cargasacchi et al.).

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si elencano le concentrazioni più consistenti, un caso di riproduzione in località distante dalla costa e segnalazioni in località inusuali.

70 indd. in Laguna Sud di Venezia il 7 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 cp. ha nidificato in ambiente fluviale presso Corbola (RO) in un'isola sabbiosa del Po (E. Verza).

170-200 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 26 agosto e il 17 ottobre (M. Nalin, E. Stival, E. Verza et al.).

1 ind. a Maraschina, Peschiera d/G (VR), l'11 aprile (M. Allen, G. Sighele [1]).

1-4 indd. tra Maraschina e Fornaci, Peschiera d/G (VR), tra il 31 agosto e il 25 ottobre (V. Bollin, S. Tascio, M. Allen, E. Toffali et al. [1]).

Recurvirostridae

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione di individuo marcato.

1.914 indd. in Laguna di Venezia in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

3.291 indd. nel Delta del Po (RO) tra il 12 e il 14 gennaio (censimenti Sagittaria).

1 ind. a Valli di Brenta (VE) l'11 luglio, marcato con anelli colorati francesi (A. Schneider [2]); era stato inanellato come pullo in Bretagna, Francia, nel giugno 2011, e segnalato successivamente anche in Romania.

Charadriidae

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

3 indd. in sosta sul Monte Pore (BL), 2.000 m slm, il 10 marzo (L. Faè, M. Cassol).

1 ind. in Lessinia tra Branchetto e il Monte Tomba (VR), 1.500-1.750 m slm, tra il 2 e il 4 luglio (M. D'offria, E. Toffali, P. Tarasco et al. [1]).

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Si elencano una segnalazione in periodo primaverile e una concentrazione interessante.

1 ind. sulle cime del Monte Baldo (VR) il 25 aprile (A. Pasqua [4]).

1 ind. a Castelberto in Lessinia (VR) il 6 settembre, quindi 20-28 indd. tra Malga Costeggioli e Malga Lago Boaro tra il 10 e il 20 settembre (C. Izzo, M. D'offria, P. Parricelli et al. [1]).

Scolopacidae

Crocolone *Gallinago media*

1 ind. alla Sorgente del Tione dei Monti (VR) il 20 aprile (G. Dalle Vedove [1]).

1 ind. a Calcinaro (VR) il 25 aprile (M. Allen [1]).

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), il 5 maggio (A. Mosele [5]).

Pittima reale *Limosa limosa*

Si riporta una segnalazione in periodo invernale.

1 ind. in Valle Dragojesolo (VE) l'8 gennaio (M. Basso).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale.

1 ind. a Lio Piccolo (VE) l'8 gennaio (E. Stival).

1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 17 dicembre (C. Sent [2]).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

2 indd. all'Isola di Papadopoli (TV) il 6 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [5]).

3-7 indd. alla Tenuta Civrana (VE) l'8 e il 10 aprile (A. Tonelli [2] [4]).

1-2 indd. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), il 19 e il 20 aprile (G. Sighele, M. Allen, R. Lercio [1]).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

Si riporta la concentrazione più consistente.

1.233 indd. in Laguna di Venezia tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Si elencano una segnalazione in sito inusuale e la concentrazione più consistente.

1 ind. alla Palude del Brusà (VR) il 28 marzo (F. Sestili [1]).

18 indd. in Valle Bagliona (RO) il 17 settembre (L. Nigro).

Piro piro del Terek *Xenus cinereus*

1 ind. in Laguna Sud di Venezia il 18 febbraio (M. Basso).

Si tratta della decima segnalazione degli ultimi 25 anni, la terza per la provincia di Venezia (BON et al., 2006, 2007; SIGHELE et al., 2010, 2015; SPINA & VOLPONI, 2008).

Voltapietre *Arenaria interpres*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

42 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 gennaio, 30 indd. il 14 maggio (S. Peraro, F. Piccolo, P. Ronconi, M. Crivellari).

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Si riporta la concentrazione più consistente.

57 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 19 settembre (E. Stival).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Si elencano le concentrazioni più consistenti.

82 indd. in Laguna Sud di Venezia in gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

68 indd. alla foce dell'Adige (RO) il 18 gennaio (A. Schneider).

Piovanello violetto *Calidris maritima*

1 ind. al Lido di Venezia il 7 gennaio e 1 ind. a Lio Piccolo (VE) il 21 febbraio (censimenti IW, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [4] – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 ind. al Lido di Venezia tra il 29 ottobre e il 22 novembre, nuovamente osservato a gennaio 2016 (M.G. Mitri et al. [5]).

Sono le prime segnalazioni venete del secolo, con solo altre 2-3 negli ultimi 100 anni, e le prime riferibili a uno svernamento.

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Si riporta la concentrazione più consistente.

37.587 indd. in Laguna di Venezia tra il 6 e l'8 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

Piovanello pettorale *Calidris melanotos*

2 indd. nelle risaie del Bacucco (RO) l'11 settembre (M. Passarella [4]).

Si tratta della quarta segnalazione veneta, la prima per la provincia di Rovigo (SIGHELE et al., 2012, 2013, 2015).

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 7 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

1 ind. in Valle Chiusa (RO) il 5 maggio (M. Passarella).

2-18 indd. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 16 e il 25 maggio (A. Schneider et al.).

1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 31 luglio (A. Schneider).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

2 indd. a Valle Averso (VE) tra il 28 agosto e il 20 settembre (M. Bernardi, A. Luchetta et al. [2] [4] [5]).

Dovrebbe trattarsi della dodicesima segnalazione veneta degli ultimi 50 anni.

Glareolidae

Pernice di mare *Glareola pratincola*

La specie è stata segnalata nel Delta del Po (RO) tra il 25 aprile e il 15 agosto e ha nidificato nelle valli di Porto Tolle con almeno 10 cpp. (censimenti Sagittaria, E. Stival, A. Pastorini, D. de Marchi et al.).

1 ind. a Porto Baseleghe (VE) l'8 maggio (L. Panzarin).

1 ind. in volo a Gabbia, Isola d/S (VR), il 9 maggio (M. Allen [1]).

1 ind. a Valle Millecampi (PD) il 17 agosto (C. Fassina, G. Piras [5]).

Laridae

Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*

4-10 indd. in Sacca di Scardovari (RO) tra l'1 e il 17 gennaio (M. Busato, L. Crivellari, G. Dalle Vedove et al. [5]).

1 ind. in Valle Spolverina (RO) il 18 febbraio (F. Piccolo).

1 ind. in Valle Passarella (VE) tra l'1 e il 3 marzo (M. Cargasacchi, A. Pastorini, A. Bossi [5]).

3-5 indd. nelle valli Venier, Sagreda e Pozzatini (RO) tra il 30 marzo e il 3 aprile (E. Stival, A. Schneider).

1-6 indd. a Lio Piccolo (VE) tra il 3 e il 9 aprile (S. Davison, E. Stival, S. Zampedri, M. Cargasacchi, S. Barzizza, A. Ferrantini [2] [5]).

1 ind. a Bacucco (RO) il 25 aprile (P. Venturi [5]).

5 indd. in volo a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 16 maggio (A. Schneider).

5 indd. in Valle Scanarello (RO) il 29 maggio, dei quali 3 in cova (F. Piccolo, I. Sturaro).

2 indd. a Giarette (RO) il 31 maggio (D. de Marchi [5]).

1 ind. in Valle Bagliona (RO) nel mese di giugno (M. Piacentini).

1 ind. al Cason Moceniga (RO) il 5 settembre, 1 ind. in Valle Pozzatini il 19 settembre, 3-12 indd. in Valle Spolverina tra il 20 settembre e il 23 ottobre, 4-19 indd. nelle valli Venier e Sagreda tra il 10 e il 17 ottobre (A. Schneider, A. Bassi, E. Stival, M. Cargasacchi, A. Pastorini et al. [2] [5]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 25 ottobre, 1 ind. il 14 dicembre, 2 indd. il 22 dicembre, 1 ind. il 28 dicembre (M. Tassinari, G. Perdisa, R. Maistri et al. [5]).

1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 19 dicembre (A. Schneider [2]).

Quella di Valle Scanarello dovrebbe rappresentare la prima nidificazione accertata di questa specie in Veneto.

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Si elencano segnalazioni di concentrazioni interessanti in aree interne del Trevigiano e informazioni sulla nidificazione nel Delta del Po.

150-200 indd. tra Cimadolmo e Spresiano (TV) tra il 9 aprile e il 9 maggio (F. Mezzavilla, F. Scarton, gruppo Verona Birdwatching et al.).

50-130 indd. tra Quinto e Treviso tra l'11 aprile e il 20 maggio (M. Sighele, F. Salvini, A. Schneider, A. Pastorini [5]).

Poco meno di 100 cpp. hanno nidificato in Valle Bagliona (RO) con adulti in cova in maggio (censimenti Sagittaria).

Gavina *Larus canus*

Si elencano la concentrazione più consistente, una segnalazione di un individuo della ssp. *heinei* e una in sito inusuale.

1.000 indd. ca. in Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 gennaio (E. Stival).

1 ind. in forma scura della ssp. *heinei* a Lazise (VR) l'11 gennaio (C. Izzo, M. D'offria et al. [1]).

1 ind. a Busche (BL) il 25 gennaio (G. Tormen, S. De Col).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 12 gennaio (S. Peraro, F. Piccolo, P. Ronconi).

Gabbiano glauco *Larus hyperboreus*

1 ind. del 1° inverno alla foce del Brenta (VE) il 21 febbraio e il 29 marzo (A. Schneider).

Si tratta della terza segnalazione veneta; le precedenti sempre in provincia di Venezia nel febbraio 1923 e nel maggio 1992 (MOLTONI, 1931; SCARTON, 1995).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Si elencano le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.

1-3 indd. a Chioggia (VE) tra l'8 dicembre 2014 e il 22 febbraio (L. Sattin, R. Lerco, A. Schneider et al. [2] [5] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1-2 indd. a Verona tra il 10 e il 17 gennaio (M. Sighele, G. Sighele, R. Lerco et al. [1]).

1-2 indd. a Chioggia (VE) tra il 4 novembre e febbraio 2016 (A. Schneider, A. Tonelli, E. Stival et al. [2] [5]).

4 indd. al porto di Pila (RO) il 5 dicembre (D. Trombin).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Si elencano le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e quelle in località inusuali al di fuori dalle province di Venezia, Rovigo e Verona.

1-12 indd. a Chioggia (VE) tra il 5 novembre 2014 e il 3 aprile (L. Sattin, A. Sartori, A. Schneider et al. [2] [5] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. a Quinto di Treviso tra l'1 e il 3 gennaio (A. Pastorini, V. Polo et al. [5]).

1-3 indd. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 4 gennaio e il 7 marzo (M. Sighele, G. Sighele et al. [1]).

1-5 indd. a Verona tra il 10 e il 19 gennaio (M. Sighele, G. Sighele et al. [1]).

1-4 indd. a Garda (VR) tra l'11 gennaio e l'1 febbraio (R. Lerco, G. Sighele, A. Mosele et al. [1] [5]).

2 indd. a Porto Baseleghe (VE) il 3 febbraio (B. Gulbert, L. Costantin, A. Pochelon [5]).

4 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 29 novembre (L. Giussani [5]).

1-4 indd. a Chioggia (VE) tra il 17 ottobre e febbraio 2016 (A. Schneider, L. Sattin et al. [5]).

2 indd. al porto di Pila (RO) il 5 dicembre (D. Trombin).

2 indd. a Garda (VR) il 26 e il 27 dicembre (A. Mosele, C. Mantovani, M. Crema [5]).

Zafferano *Larus fuscus*

Si elencano le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati, quelle in località inusuali al di fuori dalle province di Venezia, Rovigo e Verona o in periodo inusuale.

2 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 14 febbraio (A. Farioli).

2-3 indd. a Verona il 16 e il 17 gennaio (M. Sighele, G. Sighele, R. Lerco et al. [1]).

1 ind. a Quinto di Treviso il 15 febbraio (F. Salvini [5]).

1 ind. in Palude di Cona (VE) il 6 aprile (E. Stival, F. Piccolo, M. Cargasacchi [2]).

1 ind. a Fusina (VE) il 6 aprile (E. Stival, M. Cargasacchi [2] [4]).

1 ind. a Boccasette (RO) il 28 settembre (M. Marcone [4]).

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

Si elencano informazioni relative alla riproduzione e segnalazioni in siti inusuali.

Circa 200 cpp. hanno nidificato all'interno dei complessi vallivi di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle (RO) con adulti ai nidi da maggio (censimenti Sagittaria).

1 cp. ha nidificato in Valle Avertò (VE), con 2 juvv. presenti il 17 luglio (A. Luchetta [2]).

1 ind. alla Palude di Cona (VE) il 2 giugno (F. Ticozzi [2]).

1 ind. alla Tenuta Civrana (VE) il 24 giugno (A. Tonelli [5]).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

1 ind. alle Cave di Noale (VE) il 21 giugno (F. Trave [2]).

3 indd. alle Cave di Casale (TV) il 26 luglio (R. Storer [5]).

2 indd. nel golfo di Peschiera (VR) il 27 agosto (C. Zanini [1]).

17 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 25 settembre (M. Passarella).

Beccapesci *Thalasseus sandvicensis*

Si riporta un nuovo sito riproduttivo.

10 cpp. nidificanti in Laguna Falconera (VE) il 16 maggio (E. Stival).

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

Si riporta una segnalazione in periodo poco usuale.

1 ind. a Casale sul Sile (TV) il 12 luglio (F. Scarton).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 20 aprile (M. Ballan [2]).

1 ind. in Palude di Cona (VE) il 2 maggio (A. Pastorini).

1 ind. a Tessera (VE) il 4 agosto (E. Stival [2]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 agosto (R. Castellani [5]).

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 21 agosto (M. Passarella).

Stercorariidae**Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus***

2 indd. a Ca' Savio (VE) il 16 maggio (M. Cargasacchi, E. Stival [2] [5]).

2 indd. nel golfo di Peschiera (VR) il 24 agosto, 1 ind. l'1 e il 5 settembre (M. Sighele, G. Sighele et al. [1] [5]).

2 indd. alla foce del Po di Tolle (RO) il 25 settembre (M. Passarella).

Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 aprile (R. Castellani, P. Zonta [5]).

1 ind. in Laguna Nord di Venezia il 2 giugno (A. Sartori, R. Tinarelli, E. Tinarelli [5]).

1 ind. a Barricata (RO) il 5 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi [5]).

2 indd. alle foci dell'Adige (VE/RO) il 14 settembre (A. Schneider).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi [5]).

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

1 ind. al Lido di Venezia il 6 settembre (A. Sartori, M. Mencarelli et al. [2] [4] [5]).

Columbiformes

Columbidae

Colombella *Columba oenas*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e una segnalazione in località e periodo inusuali.

100 indd. all'Oasi del Busatello (VR) il 13 gennaio (F. Novelli).

70-100 indd. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), il 14 e il 15 febbraio (P. Bertini, C. Izzo, M. Sighele, G. Sighele [1]).

84 indd. a Marcon (VE) l'8 gennaio (E. Stival [5]).

4 indd. a Novezzina, Monte Baldo (VR), 1.400 m slm, il 25 aprile (M. Sighele, G. Sighele [1]).

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

1 ind. a Meduna di Livenza (TV) tra il 3 e il 16 luglio (A. Lippi [2]).

Strigiformes

Strigidae

Civetta nana *Glaucidium passerinum*

2 indd. nella Riserva Pian di Landro-Baldassarre (BL) il 27 gennaio (C. Danesi [5]).

1 ind. in Val Visdende (BL) il 15 agosto (M. Passarella [4]).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1-2 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari tra le foci del Po di Gnocca e Cassella (RO) tra il 24 dicembre 2014 e il 28 febbraio quando sono stati segnalati 3 indd., ancora 1 ind. il

24 marzo a Boccasette (L. Crivellari, L. Bedin, P. Melandri, L. Nigro, F. Ticozzi, L. Zanella et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. in Valle Olivari (VE) il 7 febbraio (A. Ferrantini [5]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 febbraio (R. Maistri [5]).

1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 30 aprile (F. Scarton).

1 ind. a Malga Lessinia (VR) l'8 settembre (A. & C. Mosele [5]).

1 ind. recuperato per probabile impatto a Chioggia (VE) l'1 ottobre (L. Panzarin).

1 ind. recuperato per probabile impatto a Dogaletto di Mira (VE) il 31 ottobre (L. Panzarin).

1 ind. a Santa Giulia (RO) tra il 4 e il 7 dicembre (M. Crivellari, A. Tarozzi [4]).

1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), tra il 12 dicembre e marzo 2016 (A. Schneider [2]).

1 ind. al Parco di San Giuliano, Venezia, il 31 dicembre (M. Cargasacchi [2] [5]).

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Si riporta un caso di nidificazione in sito inusuale.

1 cp. ha nidificato in terrazza di un ospedale abbandonato nell'isola Le Grazie (VE) tra giugno e luglio (M. Bernardi).

Apodiformes

Apodidae

Rondone maggiore *Tachymarptis melba*

Si elencano un interessante flusso migratorio e le segnalazioni più tardive.

1.230 indd. sul Colle Maser (TV) tra il 15 e il 28 agosto, con 400 indd. il 20 agosto, in concomitanza di abbondante sciamatura di formiche (F. Mezzavilla, G. Martignago, F. Salvini, G. Silveri [4]).

10 indd. a Badia Polesine (RO) il 2 ottobre (G. Susanna [5]).

1 ind. a Villa Bartolomea (VR) il 7 ottobre (G. Rigo [1]).

Rondone pallido *Apus pallidus*

10-12 cpp. hanno nuovamente nidificato a Venezia, segnalazioni tra il 25 luglio e il 4 settembre (E. Stival, M. Cargasacchi, A. Bossi [5]).

2 indd. a Pozzonovo (PD) il 28 agosto (A. Tonelli [5]).

2 indd. sui Colli Euganei (PD) il 2 settembre (A. Tonelli [2] [5]).

1 ind. a Castelberto in Lessinia (VR) il 6 settembre (G. Sighele et al. [1]).

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

1 ind. a San Donà d/P (VE) l'11 aprile (A. Lippi, G. Sgorlon [5]).

1-2 cpp. a Sprocara, Villa Bartolomea (VR), tra il 4 e il 30 maggio, senza certezza di nuova nidificazione (G. Rigo, M. Sighele, G. Dalle Vedove et al. [1] [4]).

1 ind. a Montebelluna (TV) il 4 maggio (G. Silveri [4]).

1 ind. a Isola di Papadopoli (TV) l'8 e il 9 maggio (A. Bossi, F. Consonni [5]).

1 ind. a Tormine (VR) il 13 maggio (S. Tascio [1]).

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 24 maggio e il 20 giugno (A. Schneider, M. Azzolini).

1 ind. a Bonelli (RO) il 3 giugno (P. Melandri [5]).

1 ind. al Po di Gnocca (RO) il 7 giugno (A. Pastorini [2]).

1 ind. a Scanarello (RO) il 15 giugno (L. Zanella).

1 cp. in Bonifica di Loncon (VE) il 22 giugno (L. Panzarin [5]).

1 ind. a Bacucco (RO) il 28 giugno (V. Bellettato).

1 ind. a Roncade (TV) il 4 luglio (A. Pastorini).

1 ind. nei pressi dell'idrovora Termine, Caorle (VE), l'8 luglio (L. Panzarin [5]).

1 ind. ad Ariano nel Polesine (RO) il 9 luglio (M. Crivellari [5]).

1 ind. a Negrisia (TV) il 13 settembre (G. Sgorlon [5]).

1 ind. a Terrassa Padovana (PD) il 12 ottobre (D. Bacchin [5]).

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

20 indd. a Cadola, Ponte nelle Alpi (BL), il 12 maggio (G. Tormen).

200 indd. ca. in attività trofica a Iral, Zoldo Alto (BL), il 27 maggio (L. Colussi).

Piciformes

Picidae

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

Si conferma la presenza in Valbelluna nei comuni di Belluno, Santa Giustina e Feltre (BL) con osservazioni tra gennaio e maggio, quindi ancora in novembre e dicembre (O. Palatini, G. Tormen, N. Barp, S. De Col et al.). È stato segnalato anche lungo il corso del Torrente Cison tra Fonzaso e Seren d/G (BL) il 20 dicembre (P. Grotto [5]).

Picchio tridattilo *Picoides tridactylus*

1 ind. nel Bosco del Saresin, Cortina d/A (BL), il 12 giugno (F. Scarton).

1 ind. non distante dal Passo Tre Croci (BL) il 12 giugno (A. Farioli).

1 ind. al Pian de la Leda (BL) il 24 ottobre (M. Cassol).

Picchio nero *Dryocopus martius*

Si elencano segnalazioni in ambienti inusuali.

1 ind. in canto ad Avesa, alla periferia di Verona, il 27 gennaio, il 27 marzo, il 18 aprile e in seguito almeno 1 ind. il 4 ottobre (G. Sighele, M. Sighele et al. [1]).

1 ind. lungo il Livenza presso Lorenzaga (TV) il 10 ottobre (P. Cigana).

Picchio cenerino *Picus canus*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

1 ind. a Fossalta di Portogruaro (VE) il 15 marzo (A. Nardo [5]).

1 cp. in Valfredda, Monte Baldo (VR), in periodo riproduttivo (P. Cugildi et al.).

Falconiformes**Falconidae****Grillaio *Falco naumanni***

1 m. a Castelnuovo d/G (VR) il 20 marzo (C. Zanini [1]).

3 indd. alla Tenuta Civrana (VE) il 22 maggio (A. Tonelli [2] [4]).

3 indd. nel medio Piave (TV) nella seconda metà di maggio (G. Silveri [2] [4]).

1 ind. in Bonifica di Loncon (VE) il 16 giugno (G. Sgorlon [2]).

1-6 indd. a Dosso Alto, Lessinia (VR), tra il 25 luglio e il 15 agosto (C. Izzo, M. Allen, P. Parricelli, R. Fiorentini, R. Lerco et al. [1]).

3-8 indd. a Cancellò, Verona, tra il 25 luglio e il 16 agosto (C. Izzo, M. Allen, V. Fanelli, E. Cavallini, C. Zanini, R. Lerco et al. [1]).

1 ind. a Roverè V.se (VR) il 26 luglio, in seguito 5 indd. tra l'11 e il 15 settembre (R. Lerco, L. Milione).

1 m. a Porto Baseleghe (VE) il 27 luglio (R. Castellani [5]).

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 5 agosto, 1 ind. il 14 agosto (A. Tonelli [5]).

2 indd. a Centro, Tregnago (VR), il 21 agosto (R. Lerco [1]).

1 ind. a Santa Giulia (RO) il 27 settembre (M. Marcone [5]).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Si elencano conteggi interessanti e un caso di riproduzione.

4.000 indd. ca. in migrazione alle Grave di Ciano (TV) tra il 13 e il 25 maggio (G. Silveri).

Oltre 150 indd. nel Delta del Po di Rovigo il 14 maggio (F. Piccolo, G. Basso [2] [4]).

100-150 indd. tra Cavarzere (VE) e Correzzola (PD) tra il 14 e il 22 maggio (A. Tonelli [2] [4]).

1 cp. ha nidificato alla Bonifica del Loncon (VE), con la presenza di 1 juv. da poco involato il 10 agosto (G. Sgorlon [2]).

Falco della regina *Falco eleonora*

1 ind. a Brian, Caorle (VE), il 27 agosto (A. Boldrini [4] [5]).

La specie è stata segnalata in Veneto ogni anno dal 2009 (SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Si riporta una segnalazione relativa alla ssp. *calidus* (pellegrino siberiano).

1 ind. tra Isola d/S ed Erbè (VR) il 2 gennaio (G. Sighele, C. Izzo, P. Bertini [1]).

Psittaciformes**Psittacidae****Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus***

Si riporta una segnalazione in località inusuale.

2 ind. a Lovadina di Spresiano (TV) tra il 19 dicembre e il 24 gennaio 2016 (M. Cargasacchi [2] [5]).

Passeriformes**Laniidae****Averla isabellina *Lanius isabellinus***

1 ind. nei pressi di Ca' Cappellino (RO) l'11 e il 12 aprile (M. Crivellari et al. [3] [4] [5]).

Si tratta della prima segnalazione per il Veneto, la più settentrionale tra le 12 osservazioni italiane (BRICHETTI & FRACASSO, 2011 [5]).

Averla cenerina *Lanius minor*

1 ind. a Villaviera (VE) il 22 maggio e 1 ind. a Brussa di Caorle il 24 maggio (M. Ballan, C. Cagnan [2]).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 26 aprile (S. Faganello [5]).

1 ind. lungo la Sacca di Scardovari (RO) il 9 maggio (R. Maistri, P. Biscontin [5]).

1 ind. a Valli di Brenta (VE) l'11 agosto (C. Chiari [5]).

Corvidae**Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes***

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

7 ind. a Colle San Giorgio (TV) il 21 agosto (F. Salvini, A. Luchetta, G. Silveri [5]).

1 ind. a Costagrande, Verona, il 30 agosto (M. Allen, M. Sighele, G. Sighele et al. [1]).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

Si riporta la concentrazione più consistente.

26 ind. alla Busa di Giaretta (PD) il 20 ottobre (F. Moretto [5]).

Cornacchia nera *Corvus corone*

Si elencano segnalazioni in località inusuali durante il periodo riproduttivo.

1 ind. a Mestre (VE) il 17 maggio (A. Luchetta [2]).

1 ind. a Veggio s/M (VR) il 2 giugno (C. Sbravati [5]).

1 ind. a sud di Malamocco (VE) il 20 giugno (M. Darpin [5]).

Cornacchia grigia *Corvus cornix*

Si riporta una concentrazione consistente.

1.000 indd. ca. in un dormitorio con parecchie decine di taccole presso i laghetti di Martellago (VE) tra novembre e dicembre (M. Bon).

Paridae

Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*

Si riporta una nidificazione in ambiente urbano di pianura.

1 cp. ha svernato e successivamente nidificato a Monticello Conte Otto (VI), 40 m slm, nel mese di maggio; la nidiata è stata quasi completamente predata da una gazza (E. Leuzinger).

Panuridae

Basettino *Panurus biarmicus*

Si riporta una segnalazione al di fuori di Valle Vecchia di Caorle (VE), unico attuale sito regionale di nidificazione.

4 indd. in Palude di Cona (VE) il 3 maggio (L. Panzarin [5]).

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*

Si riporta una segnalazione al di fuori della Lessinia (VR), unica area regionale di presenza consistente e regolare sia in periodo riproduttivo che invernale.

1 ind. a Punta Garbin (RO) il 29 novembre (R. Aletti, L. Giussani [5]).

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Le uniche segnalazioni regionali provengono dalle risaie di Isola d/S (VR) tra aprile e maggio (M. Sighele, G. Sighele, M. Allen et al. [1]).

Hirundinidae

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 6 aprile (P. Vacilotto [4]).

10 indd. a Castelfranco Veneto (TV) il 22 aprile (P. Rossato [5]).

1 ind. al Parco San Giuliano, Venezia, l'1 luglio (A. Bossi [5]).

1 ind. ad Albarella (RO) il 30 luglio (G. Susanna [5]).

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Si riporta una segnalazione relativa alla ssp. *caudatus*.

2 indd. al Parco di San Giuliano, Venezia, il 20 dicembre (P. Ugo).

Phylloscopidae

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

Si elencano segnalazioni relative alla ssp. *tristis* (lui siberiano).

1 ind. a Quinto di Treviso tra il 18 dicembre 2014 e l'11 aprile (L. Boscain, F. Zanatta, F. Salvini, M. Sighele et al. – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. a Carità di Villorba (TV) tra il 21 dicembre 2014 e il 19 gennaio (L. Boscain – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. a Oderzo (TV) tra il 31 gennaio e il 6 marzo (G. Sgorlon [2] [4]).

1 ind. a Treviso tra il 12 e il 20 febbraio (F. Zanatta, S. Davison [4]).

1 ind. nei pressi di Lido Campanello (VR) l'11 ottobre (M. Sighele, G. Sighele [1]).

1 ind. a Carmignano d/B (PD) l'8 novembre (D. de Marchi).

1 ind. a Quinto di Treviso il 28 novembre (L. Giussani, L. Nigro [5]).

1 ind. a Bonelli di Porto Tolle (RO) il 29 novembre (R. Aletti, L. Giussani, L. Nigro).

1 ind. catturato durante seduta di inanellamento a Saletto (PD) il 29 novembre (A. Frigo).

1 ind. a Ca' Emo (RO) il 3 dicembre (D. Trombin).

1 ind. a Pacengo (VR) il 30 dicembre (A. Mosele [5]).

Lui forestiero *Phylloscopus inornatus*

1 ind. nell'oasi di Ca' Mello (RO) il 17 ottobre (D. Trombin [4]).

Si tratta dell'ottava segnalazione per il Veneto (BRICHETTI & FRACASSO, 2010; SIGHELE et al., 2012, 2014, 2015).

Lui di Hume *Phylloscopus humei*

1 ind. a Quinto di Treviso tra il 29 novembre 2014 e il 6 aprile (F. Zanatta, F. Salvini, P. Vacilotto, E. Stival, M. Cargasacchi et al. [2] [4] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. a Quinto di Treviso, nello stesso sito dell'inverno precedente, tra il 22 novembre e il 21 dicembre (F. Zanatta, F. Salvini, F. Piccolo et al. [2] [4] [5]).

Sono quattro le segnalazioni di questa specie in Veneto, con almeno 3 casi di svernamento (SIGHELE et al., 2010, 2011, 2012, 2015).

Acrocephalidae

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

Si riporta una segnalazione in ambiente urbano.

1 ind. in canto a Verona il 19 maggio (M. Dall'O).

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

Si elencano segnalazioni al di fuori dei periodi migratori.

1 ind. alla foce del Po di Gnocca (RO) tra il 2 e il 31 gennaio (M. Passarella, M. Cargasacchi, A. Tonelli [2] [3] [4] [5]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'1 febbraio, dove era stato segnalato anche tra l'1 novembre e il 13 dicembre 2014 (P. Zonta [5] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. in canto in Valle Averno (VE) il 2 giugno (N. Adestriani [5]).

1-2 indd. alla foce del Po di Gnocca (RO) tra il 7 dicembre e gennaio 2016 (A. Tarozzi et

al. [5]).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra l'11 dicembre e gennaio 2016 (A. Bossi, F. Piccolo et al. [5]).

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Si elencano segnalazioni in periodo riproduttivo.

2 indd. in canto in Valle Averno (VE) il 13 giugno (N. Adestrini [5]).

1 ind. in canto a Ca' Pasqua (VE) il 19 giugno (M. Cargasacchi, F. Piccolo [5]).

Locustellidae

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

1 ind. in canto nei pressi di Busche (BL) e 1 ind. in canto al Vincheto di Cellarda (BL) il 2 maggio (M. Sighele, R. Lerco, G. Sighele, M. Allen et al. [1]).

1 ind. catturato durante seduta di inanellamento a Cadola, Ponte nelle Alpi (BL), il 23 agosto (G. Tormen, S. De Col).

1 ind. in difficoltà raccolto e poi liberato a Padova il 27 settembre (G. Piras [4] [5]).

Leiothrichidae

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

Si elencano le segnalazioni al di fuori dei Colli Euganei (PD), nota area di presenza consistente e regolare.

Si conferma la presenza della specie nel Veronese, con segnalazione di 7-8 indd. a Rancani, Tregnago (VR), il 18 ottobre (M. Bertacco [1]).

Sylviidae

Sterpazzolina comune *Sylvia cantillans*

1 ind. a Favaro Veneto (VE) il 28 marzo (V. Polo [2]).

1 ind. a Treviso il 29 marzo (R. Storer [5]).

1 ind. a Fossalta di Portogruaro (VE) il 6 aprile (A. Nardo [5]).

1 ind. catturato durante seduta di inanellamento a Cadola, Ponte nelle Alpi (BL), il 19 aprile (G. Tormen, S. De Col).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 20 aprile (E. Stival).

Tichodromidae

Picchio muratore *Sitta europaea*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 novembre (L. Benatelli – cfr. ZANETTI, 2016).

Certhidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Si elencano segnalazioni in pianura.

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) tra il 10 e il 24 gennaio (S. Faganello et al. [2] [5]).

1 ind. catturato durante seduta di inanellamento in Valle Ghebo Storto (PD) il 25 ottobre (L. Sattin [5]).

1 ind. all'Oasi Cave di Gaggio Nord (VE) il 30 ottobre (M. Chillon).

1-2 indd. all'Oasi San Daniele (TV) tra il 10 novembre e gennaio 2016 (M. Costa, S. Tasca et al. [5]).

1 ind. nella golena del Piave presso Lovadina (TV) dal 12 novembre e per tutto l'inverno successivo (F. Biadene, S. Zaninoto).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 17 e il 21 novembre (L. Benatelli [5]).

1 ind. a Santa Maria di Piave (VE) il 13 dicembre (A. Pastorini [5]).

1 ind. a Valle Grassabò (VE) il 15 dicembre (A. Pastorini).

1 ind. a Favaro Veneto (VE) tra il 20 dicembre e gennaio 2016 (E. Stival [2]).

1 ind. ad Avesa, Verona, tra il 26 dicembre e febbraio 2016 (M. Zara, M. Sighele, G. Sighele [1]).

Turdidae

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

Si riporta una segnalazione in località inusuale.

1 ind. ad Avesa, Verona, il 25 ottobre (G. Sighele [1]).

Muscicapidae

Pettirosso *Erithacus rubecula*

Si riprova una riproduzione in pianura in centro urbano.

1-2 cpp. hanno nidificato in centro città a Verona, con 1 ind. l'1 giugno e, in altro sito, 1 ind. con imbeccata il 15 giugno (M. Allen [1]).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

2 indd. a Eraclea Mare (VE) il 25 agosto (A. Boldrini [4] [5]).

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*

1 ind. a Baricetta, Adria (RO), il 13 aprile (N. Donà [5]).

1 ind. a Punta Sabbioni (VE) il 22 maggio (L. Panzarin).

Dovrebbero rappresentare la quattordicesima e la quindicesima segnalazione veneta dopo il 1950 (GIOL, 1958, 1960; MEZZAVILLA et al., 1999; BON et al., 2008; BRICHETTI & FRACASSO, 2008; SIGHELE et al., 2011, 2013, 2015).

Passero solitario *Monticola solitarius*

Le uniche segnalazioni regionali provengono dalla Val d'Adige nei pressi di Ceraino (VR), dove la specie è segnalata pressoché tutto l'anno (R. Lerco, C. Zanini, V. Fanelli, E. Grippo, E. Cavallini [1]).

Cinclidae**Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus***

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

La specie è stata segnalata in corsi d'acqua di pianura in diverse località della provincia di Verona: sull'Adige a Pescantina in gennaio, sul Mincio a sud di Peschiera d/G sia in gennaio che in dicembre, sul Torrente Fibbio a Montorio, Verona, in dicembre (M. Cristofoletti, V. Fanelli, S. Tascio, M. Lezzi, F. Lezzi et al. [1]).

Passeridae**Fringuello alpino *Montifringilla nivalis***

Si elenca una concentrazione consistente.

Fino a 80 indd. a Bocca di Selva, Lessinia (VR), nella prima decade di febbraio (P. Parricelli, G. Speranza, M. Sighele et al. [1]).

Motacillidae**Calandro maggiore *Anthus richardi***

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 17 ottobre (D. Trombin [4]).

Specie di comparsa irregolare in regione, dovrebbe trattarsi della quinta segnalazione di questo secolo e della prima segnalazione nota per la provincia di Rovigo (SIGHELE et al., 2009, 2011, 2014).

Calandro *Anthus campestris*

Si riportano segnalazioni in periodo inusuale per la località.

1 ind. nei pressi del Giardino Botanico di Caleri (RO) il 24 maggio e l'8 giugno (M. Passarella, M. Dal Zotto [5]).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola d/S (VR), il 25 aprile (M. Allen [1]).

3 indd. a Lovadina di Spresiano (TV) il 30 aprile (F. Zanatta).

Fringillidae**Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula***

Si elencano segnalazioni attribuibili in base alle vocalizzazioni alla ssp. *pyrrhula* (ciuffolotto maggiore).

2-3 indd. in Lessinia (VR) nei pressi di Fosse il 14 novembre e a Camposilvano il 30 novembre (M. Sighele, G. Sighele, C. Chiappisi, C. Zanini, L. Milione et al. [1]).

Organetto (minore) *Acanthis flammea cabaret*

Si elencano segnalazioni in località inusuali al di fuori della provincia di Belluno.

2-3 indd. sul Monte Ortigara (VI) il 6 e il 28 giugno, quindi 2 indd. il 19 settembre (M. Zanon, P. Bertini [1] [5]).

7 indd. a Bocca di Selva, Lessinia (VR), il 22 novembre (M. Bertacco [1]).

1 ind. a Morgano (TV) il 23 dicembre (F. Salvini [5]).

Venturone alpino *Carduelis citrinella*

1 ind. al Col Indes (BL) il 20 ottobre (A. Bossi [2] [4]).

1 indd. in Valfredda, Monte Baldo (VR), l'11 ottobre (P. Cugildi [1]).

Emberizidae

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

1 ind. a Maserada s/P (TV) il 7 e l'8 febbraio (F. Zanatta, M. Passarella).

2-3 indd. a Maserada s/P (TV) tra il 15 dicembre a gennaio 2016 (F. Zanatta et al.).

Ortolano *Emberiza hortulana*

Si elencano segnalazioni in siti collinari o montani.

1 ind. in canto a Rancani (VR) il 9 aprile (G. Sighele [1]).

4 indd. nei pressi di Santa Giustina (BL) l'1 maggio (M. Cassol).

1 ind. in canto sul Monte Corno (VI) l'8 maggio (L. Sebastiani).

2 indd. in Valfredda, Monte Baldo (VR), il 7 settembre (P. Cugildi [1]).

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

1 m. in canto a Branchetto in Lessinia (VR), 1.500 m slm, tra il 26 giugno e il 24 luglio, con presenza di 2 mm. il 12 luglio e fugaci osservazioni di 1 f. nella prima decade di luglio, quindi è molto probabile che 1 cp. abbia nidificato in loco (A. Bandieri, C. Bandieri, G. Dalle Vedove, M. Sighele, G. Sighele, R. Lerco et al. [1] [4]).

Calcaridae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Fino a 13 indd. nei pressi della Sacca di Scardovari (RO) tra il 13 dicembre 2014 e il 14 febbraio (A. Bossi, M. Cargasacchi, M. Busato, B. Perroud, L. Crivellari, A. Farioli et al. [2] [3] [4] [5] – cfr. SIGHELE et al., 2015).

1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 10 e l'11 gennaio (E. Stival, O. Trebbi et al. [2] [4]).

Fino a 25 indd. a Bocca di Selva, Castelberto e Dosso Alto in Lessinia (VR) tra il 22 gennaio e il 17 marzo (R. Lerco, P. Parricelli, C. Isotta, M. Cordioli, I. Falco, L. Signori et al. [1]).

Specie introdotte o sfuggite dalla cattività**Dendrocigna fulva *Dendrocygna bicolor***

1 ind. a Silea (TV) il 5 marzo (L. Busatto [5]).

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. in Valle Zignago (VE) il 12 gennaio (censimenti IW – cfr. BASSO & BON, 2015).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 m. a Treviso a gennaio, giugno e tra settembre e gennaio 2016 con presenza anche di 1 f. il 2 ottobre, specie qui segnalata anche in anni precedenti (A. Pastorini et al. – cfr. SIGHELE et al. 2014, 2015).

1 f. sul Mincio a sud di Peschiera d/G (VR) il 2 gennaio (C. Recchi [1]).

1 m. sul Dese a Maguolo di Venezia il 2 aprile (A. Ferrantini [5]).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 f. a Montorio di Verona tra il 24 gennaio e l'1 febbraio (R. Lerco, F. Lezzi, A. Pigozzo et al. [1]).

1 m. a Cortellazzo (VE) il 9 marzo (L. Muller – cfr. ZANETTI, 2016).

1 ind. a Treviso il 14 marzo (R. Storer [5]).

1 m. a Malo (VI) il 16 maggio (E. Carta [5]).

1 f. nei pressi di Velo d'Astico (VI) il 21 luglio e 1 cp. il 16 agosto (I. Martini [5]).

1 ind. a Treviso il 17 novembre (A. Pastorini).

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*

1 f. in Valle Ca' Pasta (RO) il 7 dicembre (E. Verza [5]).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

1-3 indd. tra Ponte nelle Alpi e Santa Giustina (BL) tra il 7 febbraio e il 2 maggio (G. Tormen, M. Cassol, N. Barp, S. De Menech, S. De Col [5]).

1 ind. a Cappella Maggiore, Vittorio Veneto (TV), il 27 marzo (*vide* G. Silveri).

2 indd. nell'oasi di Ca' Mello (RO) il 26 aprile (N. Donà [5]).

1 ind. all'aeroporto a Villafranca V.se (VR) il 6 e il 7 maggio (E. Ferrando, M. Sighele, C. Zanini et al. [1]).

28 indd. in migrazione guidata in volo sopra Mestre (VE) il 30 agosto (M. Cargasacchi [5]).

5 indd. a Spagnoli di Castelnuovo d/G (VR) il 17 novembre (C. Zanini, G. Dalle Vedove [2]).

1 ind. ad Albarè (VR) il 19 novembre (C. Zanini [1]).

Segnalato regolarmente dall'inizio del progetto di reintroduzione (2003).

Fagiano argentato *Lophura nycthemera*

1 ind. a Pedemonte (VR) il 3 settembre (L. Domenis, V. Speri [1]).

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis*

1 ind. a Sant'Anna di Chioggia (VE) il 3 e 4 gennaio, marcata con anello in plastica colorato (A. Schneider et al.).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. a Padova il 13 giugno (A. Schneider).

1 ind. a Villorba (TV) il 27 giugno (P. Vacilotto).

Ara gialloblu *Ara ararauna*

1 ind. presso le sorgenti del Sile (TV) il 13 aprile (F. Scarton).

Pappagallo di Alessandro *Psittacula eupatria*

1 ind. a Padova il 25 aprile (C. Cuccurullo [5]).

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*

1 ind. a Marghera (VE) il 10 aprile (M. Baldin).

Inseparabile facciarosa *Agapornis roseicollis*

1 ind. a Rosà (VI) il 25 ottobre (F. Moretto [5]).

Vedova coda a spilli *Vidua macroura*

1 m. a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 26 settembre (D. de Marchi).

***Ploceus* sp.**

1 f. di *Ploceus*, un tessitore baya, *Ploceus philippinus*, o un tessitore dorato asiatico, *Ploceus hypoxanthus*, catturata durante sessione di inanellamento in Valle Ghebo Storto (PD) il 5 ottobre (L. Sattin).

APPENDICE

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

Si elencano le segnalazioni al di fuori dei Colli Euganei (PD), nota area di presenza consistente e regolare.

3-10 indd. sui Colli Berici nel comune di Arcugnano (VI) almeno tra il novembre 2011 e il marzo 2013 (G. Fracasso, E. Cerato).

Capinera *Sylvia atricapilla*

Si riporta una segnalazione di individuo marcato.

1 ind. trovato deceduto a Santa Maria di Negrar (VR) nel settembre 2013, marcato con anello norvegese (F. Dal Santo).

Merlo *Turdus merula*

Si riporta una segnalazione di individuo marcato.

1 ind. trovato deceduto a Sedico (BL) il 10 ottobre 2014, marcato con anello ceco (G. Tormen); era stato inanellato il 14 luglio 2013 in Repubblica Ceca.

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 ind. all'Oasi di Volta Grimana (RO) il 7 aprile 2012 (L. Gramolelli).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli ornitologi e i birdwatcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito di questo lavoro. Un ringraziamento a Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Michele Cassol, Emanuele Stival per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014. La lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). *Avocetta*, 38: 1-21.
- BASSO M., BON M., 2015. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (gennaio 2015). *Provincia di Venezia, Servizio Caccia e Pesca*.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2006. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2005. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 57: 199-220.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 58: 269-292.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2008. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 59: 129-151.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2008. Ornitologia Italiana. Vol. 5 Turdidae-Cisticolidae. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna, 430 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2010. Ornitologia Italiana. Vol. 6 Sylviidae-Paradoxornithidae. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna, 494 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2011. Ornitologia Italiana. Vol. 7 Paridae-Corvidae. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna, 494 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. ital. Orn.*, 85: 31-50.
- GARGIONI A., 2015. La migrazione post riproduttiva 2015 dei rapaci diurni nel Parco del Mincio (colline moreniche del Lago di Garda: MN, BS, VR). *Infomigrans*, 36: 8.
- GIOL A., 1958. Cattura di un Pigliamosche pettirosso - *Muscicapa parva* Bech. - in provincia di Treviso. *Riv. ital. Orn.*, 28: 231.
- GIOL A., 1960. Ancora sul Pigliamosche pettirosso. *Riv. ital. Orn.*, 30: 93-94.
- MEZZAVILLA F., STIVAL E., NARDO A., ROCCAFORTE P., 1999. Rapporto Ornitologico Veneto orientale - anni 1991-98. *CORVO*: 64 pp.
- MOLTONI E., 1931: Su alcuni uccelli rari italiani recentemente pervenuti alla Raccolta Ornitologica del Museo di Milano. *Natura*, 22: 109-113.
- SCARTON F., 1995: Segnalazione di Gabbiano glauco, *Larus hyperboreus*, in Laguna di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, 64 (2): 181-182.
- SGORLON G., SIGHELE M., 2016. Rinvenimento di una Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*) in provincia di Venezia e revisione delle segnalazioni della specie in Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 86: 65-68.
- SIGHELE M., 2012. Ali del Frassino. *Verona Birdwatching*, 160 pp.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 60: 143-168.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2010. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2009. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 61: 83-115.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2011. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 62: 181-218.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2012. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 63: 135-171.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2013. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2012. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 64: 81-114.

- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2014. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2013. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 65: 181-213.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2015. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2014. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 66: 79-110.
- SIGHELE M., TORMEN G., 2015. Osservazioni di avvoltoi in Veneto nel 2015. *Infogipeto*, 32: 29.
- SPINA F., VOLPONI S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. Vol. 1. *ISPRA*, Roma, 798 pp.
- ZANETTI M., 2016. Flora e Fauna della pianura veneta orientale n. 18. Osservazioni di campagna 2015. *Associazione Naturalistica Sandonatese*.

Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list e dei siti web consultati sono:

Verona BW: www.veronabirdwatching.org

Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw

Deltapobw: www.facebook.com/groups/DeltaPoBW

EBN Italia: www.ebnitalia.it

Ornitho: www.ornitho.it