

Maurizio Sighele, Emanuele Stival, Roberto Corvino, Niccolò Fagotto, Vittorio Fanelli, Gloria Feltrin, Fabio Moretto, Giacomo Sgorlon, Leonardo Visentin, Tomaso Bisol, Alessandro Sartori, Emiliano Verza

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO ANNO 2022

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2022 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la prima segnalazione nazionale di gabbiano di Bonaparte, la prima segnalazione regionale di questo secolo di allodola golagialla, le osservazioni di specie assai rare o irregolari come oca lombardella minore, falaropo beccosottile, pernice di mare orientale, nibbio bianco, capovaccaio, storno roseo, prispolone indiano, zigolo capinero, zigolo minore.

Summary. *Ornithological report for the year 2022 in the Veneto region (NE Italy).*

We report in systematic order significant observations concerning vagrant or rare migrants, as well as wintering or breeding species, recorded in Veneto during 2022. The most interesting data include the first Italian record of Bonaparte's Gull, the first regional occurrence in this century of Horned Lark as well as sightings of very rare or irregular species such as Lesser White-fronted Goose, Red-necked Phalarope, Black-winged Pratincole, Black-winged Kite, Egyptian Vulture, Rosy Starling, Olive-backed Pipit, Black-headed Bunting and Little Bunting.

Reference: Sighele M., Stival E., Corvino R., Fagotto N., Fanelli V., Feltrin G., Moretto F., Sgorlon G., Visentin L., Bisol T., Sartori A., Verza E., 2023. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2022. *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia*, 74: 31-53.

INTRODUZIONE

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative effettuate in Veneto durante il 2022 relative agli uccelli selvatici, compresi alcuni ibridi, e ad alcune specie introdotte e/o fuggite da cattività. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali. Dove non è diversamente descritto, per ogni specie citata vengono elencate in ordine cronologico tutte le segnalazioni raccolte.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, parte delle quali sono già state rese pubbliche in portali, data base online, mailing list o social; in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Birding Veneto; [2] Venezia Birdwatching; [3] Verona Birdwatching; [4] Delta Po BW; [5] ornitho.it; [6] EBN-Italia/Ubird; [7] iNaturalist; [8] ebird. Con "IWC" si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.

La sequenza e la tassonomia seguono la checklist di HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL (2022), che è stata adottata dal CISO-COI per la lista italiana (BACCETTI et al., 2021); per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a BACCETTI et al. (2014). Per la fenologia regionale si veda anche STIVAL & SIGHELE (2019).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes

Anatidae

Cigno nero *Cygnus atratus*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

- 1 ind. in Valle Ca' Pisani (RO) il 10 maggio (A. Sartori [5]).
- 1 ind. a sud di Villa Bartolomea (VR) il 3 giugno (P. Bertini [5]).
- 2 ind. a Recoaro Terme (VI) tra il 4 e il 26 settembre (G. Nassi [5]).
- 1 ind. a Polesine Camerini (RO) il 25 ottobre (E. Cecconello [7]).
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) dal 30 ottobre 2021 al 30 gennaio (M. Zenatello, P. Grotto, G. Feltrin et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1 ind. alla foce dell'Adige (RO/VE) tra il 13 e il 28 dicembre (L. Boscain, M. Sighele et al. [5] [7]).

Quella del Lago di Busche è la prima segnalazione per la provincia di Belluno.

Cigno reale *Cygnus olor*

Si riporta un conteggio consistente.

- 416 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 15 novembre (F. Piccolo).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente in concomitanza di osservazioni invernali di altre specie di oche.

- 1-4 ind. tra Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), e Brussa, Caorle (VE), tra il 21 ottobre 2021 e il 26

marzo (P. Geromel, E. Stival, A. Sutto, F. Salvini, P. Vacilotto, M. Cappelletto et al. [1] [5]).

- 2 ind. alla Busa de Giarretta (PD) l'1 gennaio (D. Spegginorin, P. Spegginorin [5]).
- 1 ind. a Sottomarina, Chioggia (VE), il 16 gennaio (M. Marcone [5]).
- 1-3 ind. tra Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), e Brussa, Caorle (VE), tra l'11 novembre e il 4 marzo 2023 (N. Ciarla, F. Piccolo, P. Vacilotto et al. [5]).

Oca collarosso *Branta ruficollis*

- 1-6 ind. tra Brussa e Villaviera, Caorle (VE), tra il 6 novembre 2021 e il 16 febbraio (P. Vacilotto, A. Mazzocco, F. Salvini, F. Piccolo, N. Ciarla et al. [1] [5] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1-4 ind. tra Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), e Brussa, Caorle (VE), tra il 12 novembre e il 28 febbraio 2023 (E. Carta, N. Ciarla, F. Salvini, F. Piccolo, P. Vacilotto et al. [5]).

Oca del Canada *Branta canadensis*

Si elencano segnalazioni da località non note in precedenza o in concomitanza di osservazioni invernali di altre specie di oche.

- 1 ind. a Dolo (VE) il 25 gennaio (E. Stival [5]).
- 1 ind. nei pressi di Rosolina (RO) il 21 ottobre (P. Vacilotto [5]).
- 1 ind. a Dolo (VE) il 18 dicembre (E. Stival [5]).

Oca selvatica *Anser anser*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni di individui marcati di un certo interesse.

- 12.755 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio, dei quali 2.600 ind. in Valle Dragojesolo, 2.000 ind. in Valle Fosse, 1.200 ind. in Valle Serraglia, 1.100 ind. in Valle Cavallino (BASSO, 2022 – M. Bon [5]).
- 500-3.000 ind. tra Sindacale, Concordia Sagittaria (VE) e Valle Zignago, Valle Perera, Villaviera, Caorle (VE), tra il 29 ottobre e il 12 marzo 2023, di cui 3.000 ind. il 24 novembre (M. Marcuzzo, A. Sutto, E. Stival, E. Carta, N. Ciarla et al. [5]).
- 2.000 ind. a Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE) il 30 novembre (G. Cuccurullo [5]).
- 1 ind. a Musile di Piave (VE) l'1 dicembre (A. Sartori), marcato con collare ceco "P/71" inserito da pullo a Redicky, Repubblica Ceca, il 17 giugno 2020.
- 1 ind. in Valle Grassabò, Jesolo (VE), più volte nel mese di dicembre (S. Furlanetto, C. Loschi, A. Sartori), marcato con collare ungherese "H207" inserito da pullo a Sarród, Ungheria, il 17 giugno 2017.

Oca granaiola *Anser fabalis*

- 1-4 ind. tra Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), e Brussa, Caorle (VE), tra l'1 dicembre 2021 e il 16 febbraio (F. Piccolo, P. Geromel, F. Salvini, N. Ciarla et al. [1] [5] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2022b), appartenenti alla ssp. *rossicus*, oca granaiola della tundra.

Si ricorda che nella lista IOC (GILL et al., 2023) *Anser fabalis rossicus* è elencata come sottospecie di *A. serrirostris*, considerata specie separata da *A. fabalis*.

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano conteggi consistenti.

- 23.429 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio, in particolare 13.089 ind. in Laguna di Venezia, 10.812 ind. in Laguna di Caorle-Bibione (BASSO, 2022).
- 6.000 ind. dal 30 ottobre al 6 marzo 2023 tra Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), Villaviera e Brussa, Caorle (VE), Prati Nuovi, San Michele al Tagliamento (VE) (M. Darpin, F. Piccolo, S. Faggian, F. Salvini et al. [5]).

Oca lombardella minore *Anser erythropus*

- 1-2 ind. tra Valle Vecchia e Brussa, Caorle (VE), tra il 23 dicembre 2021 e l'11 marzo (F. Salvini, F. Piccolo, N. Ciarla, F. Felici et al. [1] [5] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).

Si tratta della nona segnalazione per il Veneto, tutte in provincia di Venezia, le ultime otto negli ultimi dodici inverni (SEMENZATO & SCARTON, 1998; SIGHELE et al., 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

- 1 ind. a Sant'Erasmo, Venezia, il 15 e il 16 gennaio (S. Castelli [5]).
- 1 ind. alla foce Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), dal 28 gennaio al 2 aprile (G. Cuccurullo, A. Bertoli, P. Vacilotto et al. [5] [6]).
- 1 ind. alla foce dell'Adige (RO/VE) tra il 29 gennaio e il 17 aprile (F. Salvini, N. Adestri, L. Giraud et al. [5] [8]).
- 2 ind. in volo sul golfo di Peschiera (VR) il 18 aprile (M. Cadin [1] [5]).
- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) tra il 20 dicembre e il 23 febbraio 2023 (G. Feltrin et al. [5]).

Quella del Lago di Santa Croce rappresenta la seconda segnalazione nota per la provincia di Belluno dopo quella del 2020 (SIGHELE et al., 2021).

Orco marino *Melanitta fusca*

- 13 ind. alla bocca di porto del Lido, Venezia, il 14 gennaio (S. Davison [5]).
- 7-8 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), tra il 23 gennaio e il 13 febbraio (G. Assandri, M. Darpin, A. Bertoli, L. Rossi et al. [5]).
- 1 ind. alla foce dell'Adige (VE/RO) l'1 febbraio (F. Piccolo, R. Corvino et al. [5]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

- 2 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), il 23 gennaio, 1 ind. il 29 gennaio, 6 ind. il 23 febbraio (G. Assandri, G. Bazzi, P. Grion, M. Darpin, F. Salvini [5]).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano segnalazioni in località inusuali al di fuori dei siti noti nei bacini del Brenta, del Piave e del Garda, dove la specie è segnalata con regolarità.

- 1 ind. a Porto Baseleghe, San Michele al Tagliamento, e Caorle (VE), il 3 gennaio (P. Speggorin, D. Speggorin [5]).
- 2-4 ind. in Adige tra Ceraino, Dolcè, e Santa Lucia di Pol, Pescantina (VR), tra il 22 gennaio e il 3 aprile (L. Thijs, L. Corrier, C. Chiappisi, R. Boscaini, V. Fanelli [3] [5]).
- 3-4 ind. in Adige a Verona tra il 15 febbraio e il 13 aprile (C. Zanini, M. Sighele, M. Allen, M. Dosso, L. Corrier, R. Fiorentini [3]).
- 1 ind. in volo sopra Ca' Roman, Venezia, il 25 marzo, poi posato in mare (P. Scarpa, A. Civiero).
- 1 ind. a Campalto, Venezia, il 20 aprile (N. Wittling [5]).

Smergo minore *Mergus serrator*

Si elencano segnalazioni nelle province di Belluno e Vicenza, dove la specie è di comparsa irregolare.

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 21 gennaio e il 24 aprile (P. Grotto, F. Salvini, G. Feltrin et al. [5]).
- 1 ind. al Laghetto di Altavilla Vicentina (VI) il 27 dicembre (M. Vicariotto [5]).

Quella di Altavilla Vicentina rappresenta la prima segnalazione recente per la provincia di Vicenza.

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

Si riportano le segnalazioni di maggiore consistenza numerica.

- 3-15 ind. tra Villaviera, Bacino Villa e Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 18 agosto e il 15 ottobre, in particolare 15 ind. il 25 settembre (P. Geromel, N. Ciarla, A. Pastorini, M. Carmona, P. Vacilotto et al. [5] [8]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano un conteggio consistente e le segnalazioni più interessanti al di fuori dell'area costiera.

- 24.275 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 2-7 ind. nel golfo di Peschiera (VR) tra il 7 marzo e il 3 aprile (S. Tascio, C. Zanini [3] [5]).
- 2-6 ind. in risaia a Vigasio (VR), tra il 23 aprile e l'8 maggio (L. Corrier, M. Allen, A. Mosele et al. [3] [5]).
- 1 ind. alla Busa de Giarretta (PD) il 25 e 27 aprile (F. Moretto, P. Benedetti [5]).
- 1 ind. in Adige a Verona il 6 luglio (R. Zanella [1] [5]).
- 12 ind. in volo sul Piave a Negrizia, Ponte di Piave (TV), il 23 luglio (E. Pavan [5]).
- 8 ind. nel golfo di Peschiera (VR) il 10 dicembre (E. Bissardella [5]).
- 1 ind. in volo alle Rotte del Guà, Trissino (VI), il 20 dicembre (M. Bertacco [5]).

- 4 ind. a Legnago (VR) il 20 dicembre (G. Rigo [1]).

Casarca *Tadorna ferruginea*

Si elencano le segnalazioni in località inusuali.

- 1 ind. in Palude di Cona (VE) il 27 febbraio (F. Scarton [5]).
- 1 ind. a Fusina, Venezia, il 14 marzo (S. Munsch [5]).
- 1 ind. a Polesine Camerini, Porto Tolle (RO), il 16 e il 18 aprile, 1 ind. l'11 giugno (G. Bonaccorsi et al. [5]).
- 1 ind. alla foce del Po di Gnocca (RO) il 5 agosto (R. Alba, P. Salvador [5]).
- 2 ind. al Lago di Fimon (VI) il 13 dicembre (M. Vicariotto [5]).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente in località poco note per la specie.

- 2 ind. a Battaglia Terme (PD) il 4 gennaio (G. Piras [5]).
- 1 f. a Bassano del Grappa (VI) il 23 gennaio e il 4 febbraio (G. Nassi [5]).
- 3 m. e 1 f. alle Sorgenti del fiume Storga, Treviso, il 26 marzo (L. Boscain [5]).
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 10 ottobre (F. Salvini [5]).
- 1 ind. a Noale (VE), tra il 21 novembre e il 10 dicembre (L. Quaresemin, R. Pellizzon [5]).
- 1 ind. in Valle Zignago, Caorle (VE), il 6 dicembre (N. Ciarla [5]).

Fistione turco *Netta rufina*

Si elencano segnalazioni in provincia di Treviso, dove la specie è di comparsa occasionale, un conteggio consistente e informazioni sulla riproduzione in provincia di Rovigo, dove la specie nidifica sporadicamente.

- 6 ind. a Quinto di Treviso (TV) il 16 febbraio, 1 ind. il 28 marzo (F. Salvini, R. Storer, L. Boscain, F. Zanatta et al. [5] [6] [7]).
- 20-53 ind. in Tenuta Ca' Tron, Roncade (TV), dal 4 marzo al 30 aprile (C. Bertolin, P. Vacilotto, A. Battistel [5]).
- 550 ind. lungo il Canale Nicesolo, Caorle (VE), il 20 marzo (N. Ciarla [5]).
- 2 cp. hanno probabilmente nidificato nel Delta del Po (RO), 1 cp. nelle Valli di Porto Viro e 1 cp. nelle Valli di Rosolina nord (VERZA et al., 2023b).

Netta rufina* x *Anas platyrhynchos

- 2 ind. all'Isola dell'Olivo, Malcesine (VR), il 9 gennaio, 1 ind. il 24 gennaio, quindi successivamente 1 ind. il 10 dicembre (M. Azzolini, R. Della Putta, A. Palmarin, R. Boscaini [3] [5]); 1 ind. era presente anche negli inverni precedenti (SIGHELE et al., 2020, 2021).

Moriglione *Aythya ferina*

Si elencano conteggi consistenti.

- 14.321 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio, dei quali 2.100 ind. in Valle Figheri (BASSO, 2022 – M. Bon [5]).
- 2.958 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 9 gennaio (Verona Birdwatching – IWC).
- 2.000 ind. ca. al Laghetto del Frassino (VR) tra il 18 e il 22 dicembre (L. Prada, E. Carta [5]).

Aythya ferina* x *Aythya nyroca

- 1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 9 gennaio (L. Dalla Libera, G. Sighele, S. Gaetani – IWC).
- 1 ind. a Peschiera del Garda (VR) il 17 ottobre (S. Tascio [3]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano le segnalazioni di maggiore consistenza numerica, quelle in periodo invernale e nuove informazioni sulla nidificazione.

- 3-25 ind. tra Porto Falconera e Valle Vecchia, Caorle (VE), tra l'8 gennaio e il 21 marzo (T. Montenegro, P. Speggorin, D. Speggorin, L. Lipparini, M. Bozza, G. Sgorlon et al. [5]).
- 1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 9 gennaio (L. Dalla Libera, G. Sighele, S. Gaetani – IWC).
- 23 ind. alla Busa de Giarretta (PD) l'11 marzo (D. de Marchi, F. Moretto [5] [6]).
- 1 cp. ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 1 f. in cova a Ca' Pasta (VERZA et al., 2023b).
- 56 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), l'11 ottobre (F. Piccolo [5]).
- 2 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 9 dicembre (L. Prada [5]).

Quella di Ca' Pasta è la prima nidificazione per la provincia di Rovigo.

Moretta *Aythya fuligula*

Si elencano conteggi consistenti e una segnalazione in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 2.170 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 9 gennaio (Verona Birdwatching – IWC).
- 1.500-2.000 ind. al Laghetto del Frassino (VR) tra l'11 e il 22 dicembre (M. Carabella, L. Prada, E. Carta [5]).
- 2 ind. al Laghetto di Altavilla Vicentina (VI) il 27 dicembre (M. Vicariotto [5]).

Moretta grigia *Aythya marila*

- 1 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 1 ind. al Laghetto del Frassino (VR) il 7 gennaio, 1 m. dal 5 al 12 febbraio, 1 m. il 6 marzo (J. Peruzzo, M. Vicariotto, L. Dalla Libera et al. [5]).
- 4-6 ind. ai Laghi di Revine (TV) tra il 3 febbraio e il 6 marzo (G. Feltrin, M. Cargasacchi et al. [5] [7]).
- 1 f. tra Quinto di Treviso (TV) e Canizzano, Treviso, tra il 9 e il 17 febbraio (F. Salvini, N. Beggio, R. Storer, L. Boscain, P. Vacilotto [5] [7]).

- 1 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), tra il 14 febbraio e il 1 marzo (M. Toller, P. Geromel, L. Boscain, D. Guarnieri, F. Salvini et al. [5] [7] [8]).

- 2 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 21 e il 26 marzo (G. Sgorlon, P. Venturi [5]).

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 24 dicembre (P. Grotto [5]).

Per la provincia di Treviso in precedenza era nota una sola altra segnalazione (SIGHELE et al., 2017).

Mestolone *Spatula clypeata*

Si riporta un conteggio consistente.

- 3.227 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).

Canapiglia *Mareca strepera*

Si elencano conteggi consistenti.

- 2.106 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 1.500 ind. in Valle Ca' Pasta (RO) il 26 novembre (G. Zappaterra).

Fischione *Mareca penelope*

Si riporta un conteggio consistente.

- 25.347 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si elencano conteggi consistenti.

- 33.763 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 600 ind. alle cave di Nogarole Rocca (VR) il 26 gennaio (V. Fanelli – IWC), 300 ind. l'8 settembre (M. Sighele [3]).

Codone *Anas acuta*

Si riporta un conteggio consistente.

- 23.919 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).

Alzavola *Anas crecca*

Si elencano conteggi consistenti.

- 201.073 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 9.685 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 4 gennaio (E. Ceconello, L. Sattin).
- 15.000 ind. ca. a Lio Maggiore, Venezia, il 3 febbraio (M. Cappelletto [5]).

Podicipediformes**Podicipedidae****Svasso collaroso *Podiceps grisegena***

- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 31 ottobre 2021 e il 6 gennaio, 1 ind. il 3 marzo (S. Risser, M. Castellucci, M. Nova, L. Bonanno et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).

- 2 ind. nella sponda orientale del medio Lago di Garda (VR) il 9 gennaio (M. Azzolini, R. Della Putta, A. Palmarin – IWC [3]).
- 1 ind. a Sant’Erasmo, Venezia, il 15 gennaio (S. Castelli [5]).
- 1 ind. sul mare di Valle Vecchia, Caorle (VE), il 18 gennaio (N. Ciarla [5]).
- 1 ind. al Lido di Venezia tra il 25 febbraio e il 2 aprile (S. Castelli, M.G. Mitri, P. Scarpa, E. Stival [5]).
- 1 ind. in Valle Nova, Caorle (VE), il 10 settembre (E. Catalano [5]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 14 ottobre e il 28 gennaio 2023 (M. Fenati, P. Vacilotto, F. Piccolo et al. [5] [6] [7]).
- 1-2 ind. alla bocca di porto del Lido, Venezia, tra il 30 dicembre e il 3 gennaio 2023 (A. Borgo, M.G. Mitri [5]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) tra novembre 2021 e l’1 febbraio (M. Castellucci, N. Adestri, P. Melandri, R. Corvino et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b), ancora 1 ind. il 24 aprile (M. Peverati).
- 1 ind. tra San Nicolò e la bocca di porto del Lido, Venezia, tra il 28 dicembre 2021 e il 29 gennaio (S. Castelli [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1 ind. alla Palude delle Zumelle, San Michele al Tagliamento (VE), il 6 gennaio, 2 ind. a Porto Baseleghe, Caorle, e San Michele al Tagliamento (VE), il 16 e il 18 gennaio (N. Ciarla [5]).
- 1 ind. a Venezia l’11 gennaio e l’11 febbraio (U. Mayer, Z. Zaninoto [5]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 e il 29 dicembre (F. Salvini, D. Trombin [5]).
- 1 ind. alla bocca di porto del Lido, Venezia, tra il 31 dicembre e il 3 gennaio 2023 (M.G. Mitri [5]).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Si riporta una segnalazione in provincia di Treviso, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Vedelago (TV) il 6 gennaio e il 6 febbraio (P. Salvador [5]).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopus roseus*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni di individui marcati di un certo interesse.

- 19.402 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio, dei quali 7.500 ind. in Valle Dogà (BASSO, 2022 – M. Bon [5]).
- 1 ind. in Valle Pozzadini Novi, Rosolina (RO), il 19 febbraio (A. Sartori), marcato con anello “IAAV” inserito da pullo a Comacchio (FE) il 2 luglio 2002.
- 1 ind. in Valle Sacchettina, Cavallino-Treporti (VE), il 25 febbraio (A. Sartori), marcato con anello “T/FAC” inserito da pullo a Camalti Tuziasi, Turchia,

il 29 luglio 2007, osservato più volte in Emilia Romagna e Veneto.

- 1 ind. in Laguna di Venezia il 20 agosto (A. Sartori), marcato con anello “X/XDV” inserito da pullo a Punta de la Banya, Spagna, il 18 agosto 2018.
- 1 ind. a Chioggia (VE) il 4 ottobre (A. Sartori), marcato con anello “IAFT” inserito da pullo a Comacchio (FE) il 2 luglio 2002.
- 1 ind. in Valle Pozzadini, Rosolina (RO), il 9 ottobre (A. Sartori), marcato con anello “M/XW” inserito da pullo a Marismas del Odiel, Spagna, il 23 luglio 2011, osservato più volte in provincia di Latina.
- 13.038 ind. in Veneto il 6 dicembre, nella giornata di censimento di questa specie nelle zone umide dell’Alto Adriatico (VERZA et al., 2023a).

Columbiformes

Columbidae

Colombella *Columba oenas*

Si elencano conteggi consistenti e una segnalazione in località inusuale.

- 100-200 ind. tra Sindacale, Concordia Sagittaria, e Villaviera, Caorle (VE), tra il 7 e il 29 gennaio (L. Boscain, N. Ciarla, J. Ferrario, L. Bonomelli [5]).
- 2 ind. a Vicenza il 2 marzo (M. Vicariotto [5]).
- 900-1.700 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 12 novembre (N. Ciarla, E. Stival, E. Carta [5]).
- 100 ind. a Eraclea (VE) il 12 dicembre (E. Stival [5]).

Colombaccio *Columba palumbus*

Si riporta una concentrazione consistente.

- 10.000 ind. nelle risaie a sud di Ca’ Mello, Porto Tolle (RO), il 16 ottobre (V. Bellettato).

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Si riporta una concentrazione consistente.

- 150 ind. a Ca’ Dolfin, Porto Tolle (RO), l’1 settembre, su un campo di girasoli (G. Zappaterra).

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Si riporta una segnalazione dal Cadore, dove la specie è ancora poco conosciuta.

- 1 ind. in canto a Reane, Auronzo di Cadore (BL), il 5 maggio (A. Peri [5]).

Apodiformes

Apodidae

Rondone pallido *Apus pallidus*

- 3 ind. a Garda (VR) il 17 aprile (N. Wittling [5]).

- 2 ind. sul Monte Maggio, Laghi (VI), il 12 giugno (S. Bellintani [5]).
- 3-19 ind. a Venezia tra il 15 luglio e il 1 ottobre (A. Pastorini, E. Stival, M.G. Mitri, L. Cocco, M. Faas [5] [8]).
- 2 ind. a Campalto, Venezia l'8 settembre (S. Faggian [5]).

Apus sp.

- 2 ind. senza identificazione certa (*Apus pallidus* o *Apus apus*) a Venezia l'11 gennaio (A. Kulikova [1] [5]).

Gruiformes

Rallidae

Schiribilla *Zapornia parva*

Si riporta una segnalazione in ambiente urbano.

- 1 ind. lungo un canale a Padova tra il 20 e il 23 marzo (J. Giordano, T. Bisol, N. Fagotto, G. Piras [5] [6]).

Folaga *Fulica atra*

Si elencano segnalazioni di individui marcati.

- 1 ind. nel golfo di Peschiera (VR) il 15 ottobre (A. Mosele [3] [5]), marcato con collare polacco "Z95" inserito da adulto a Lodz, Polonia, nell'aprile 2022 (Polring).
- 1 ind. nel golfo di Peschiera (VR) il 15 ottobre (A. Mosele [3] [5]), marcato con collare polacco "7E1" inserito da adulto a Varsavia, Polonia, nel 2021 (Polring).
- 1 ind. in Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 19 ottobre 2021 e il 15 marzo, marcato con collare polacco "W42", e nuovamente l'inverno successivo nelle stesse acque tra il 6 novembre e l'11 febbraio 2023 (R. Boscaini, G. Speranza [3] [5]). Il collare era stato inserito da adulto a Sarnòw, Polonia, nel giugno 2017, osservato sul Lago di Garda anche negli inverni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (archivio ISPRA – SIGHELE et al., 2022b).

Gruidae

Gru *Grus grus*

Si elencano segnalazioni di individui in sosta in periodo invernale o stormi consistenti.

- 9 ind. in sosta in Brussa, Caorle (VE), il 7 gennaio, 12 ind. il 30 gennaio (N. Ciarla, L. Visentin, M. Sighele, F. Menegat [5]).
- 15 ind. in sosta a Cavarzere (VE) il 31 gennaio (E. Stival [5]).
- 2.000 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 20 febbraio (N. Ciarla [5]).
- 500 ind. a Pozzonovo (PD) il 21 febbraio (A. Tonelli [5]).
- 700 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 5

novembre (N. Ciarla [5]).

- 670 ind. a Mestre, Venezia, l'11 novembre (P. Ugo [5]).
- 2.093 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 24 novembre (F. Salvini, F. Piccolo [5]).
- 600 ind. a Padova il 27 novembre (L. Grassi [5]).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

Si riporta la segnalazione di maggiore consistenza numerica in provincia di Venezia, dove la specie è di comparsa regolare.

- 7 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), il 27 dicembre (M. Trombetta [5]).

Procellariiformes

Procellariidae

Berta minore *Puffinus yelkouan*

- 8 ind. al largo della foce del Piave (VE) il 1 dicembre (G. Sgorlon [5]).

Ciconiiformes

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

Si elencano le segnalazioni con esclusione di quelle di individui singoli nei periodi di regolare transito migratorio.

- 3 ind. a Pozzonovo (PD) il 5 marzo (A. Tonelli [5]).
- 1 ind. sul Monte Colombera, Borso del Grappa (TV), il 24 giugno (R. Levert, L. Visentin [5]).
- 9 ind. transitati sopra Colle San Giorgio, Maser (TV), tra il 22 agosto e il 2 settembre (F. Salvini, F. Piccolo, L. Visentin et al. [5] [6]).
- 1 ind. posato nei pressi di Borso del Grappa (TV) il 6 ottobre (S. Tasca [5]).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Si riporta la segnalazione di maggiore consistenza numerica.

- 6 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 12 aprile (J. Echmalian [8]).

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano conteggi consistenti, segnalazioni nelle province di Vicenza e Verona, dove la specie è di comparsa occasionale, e informazioni sulla nidificazione.

- 99 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 3 ind. in volo sopra le Risorgive del Bacchiglione, Villaverla (VI), il 16 aprile (E. Carta, A. Alberi [5]).
- La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 13-15 cp. (VERZA et al., 2023b).
- 1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 21 agosto (A. Belosi [5]).
- 102 ind. a Codevigo (PD) il 25 ottobre, 73 ind. il 12 dicembre (L. Sattin [5]).
- 200 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 25 ottobre (L. Bedin, E. Ceconello, F. Gherardini).
- 1 ind. in volo tra Bovolone e Oppeano (VR) il 29 ottobre (E. Bissardella [3] [5]).

Quella di Villaverla rappresenta la prima segnalazione del XXI sec. in provincia di Vicenza.

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Si elencano conteggi consistenti, segnalazioni di individui marcati e una in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa occasionale, informazioni sulla nidificazione.

- 576 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022), 120-326 ind. a Chioggia (VE) tra il 4 gennaio e il 5 aprile (A. Sartori, A. Civiero, E. Fabiano di Gregorio, P. Scarpa, E. Stival [5]).
- 68 ind. a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD), il 7 gennaio (G. Piras [1] [5]).
- 1 ind. a Chioggia (VE) il 28 gennaio (A. Sartori), marcato con anello "J7" inserito da pullo a Comacchio (FE) l'1 maggio 2021.
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 30 marzo e il 15 aprile, quindi tra il 6 agosto e il 29 ottobre (F. Salvini, M. Cassol, G. Feltrin, P. Grotto et al. [5]).
- 1 ind. a Pellegrina, Isola della Scala (VR), il 9 aprile (L. Corrier), marcato con anello italiano "BDT".
- La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 35-40 cp. (VERZA et al., 2023b).
- 1 ind. a Chioggia (VE) il 5 novembre (A. Sartori), marcato con anello "BHV" inserito da pullo a Comacchio (FE) il 25 giugno 2022.
- 1 ind. a Codevigo (PD) il 13 novembre (E. Carta [5]), marcato con anello italiano "V5".
- 215-450 ind. a Chioggia (VE) tra il 26 novembre e il 12 dicembre (E. Stival, L. Sattin [5]).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

Si elencano concentrazioni consistenti, segnalazioni al di fuori dell'area costiera e informazioni sulla nidificazione.

- 69 ind. nelle valli di Rosolina (RO) il 4 gennaio (M. Vicariotto [5]).
- 48 ind. tra Ca' Venier e Ca' Pisani (RO) il 17 aprile (G. Bonaccorsi [5]).
- 2 ind. a Isola della Scala (VR) il 12 e il 13 maggio (C. Chiappisi, C. Zanini [3]).
- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) il 16

maggio (L. Balasini [5]).

- 1 ind. nei pressi di Casaleone (VR) il 30 maggio (G. Calvi [5]).
- 4-5 ind. tra le risaie a Quinto Vicentino (VI) il 17 e il 24 giugno (F. Moretto, R. Rusticali [1] [5]).
- 1 cp. con 3 pulli a Ca' di Mezzo, Codevigo (PD), il 18 giugno (E. Ceconello [4]).
- 47-86 ind. tra Porto Falconera e Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 28 luglio e il 23 agosto (N. Ciarla, P. Vacilotto, M. Panzarin et al. [1] [5]).

Quella di Ca' di Mezzo è la prima nidificazione per la provincia di Padova dopo l'ultima nota che risaliva al XIX secolo.

Ardeidae

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Si riporta una segnalazione in località inusuale in periodo invernale.

- 1 ind. a Torre di Fine, Eraclea (VE), il 22 gennaio (A. Sartori).

Airone bianco maggiore *Ardea alba*

Si riportano informazioni sulla nidificazione.

- La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 34-38 cp. (VERZA et al., 2023b).

Garzetta *Egretta garzetta*

Si riporta una concentrazione interessante per la provincia di Belluno.

- 120 ind. a Feltre (BL) il 16 luglio (P. Grotto [5]).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

- 1 ind. in Valle Cavallino, Jesolo (VE), il 23 aprile (C. Chiodin, P. Fantin [5]).
- 1 ind. a Campalto, Venezia, il 29 luglio (S. Faggian [5]).

Egretta gularis* x *Egretta garzetta

- 1 ind. a Saguado, Lendinara (RO), tra il 26 e il 30 ottobre (E. Cappello, P. Vacilotto, L. Lipparini [5]).

Phalacrocoracidae

Marangone minore *Microcarbo pygmaeus*

Si elencano segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa occasionale, un conteggio consistente e informazioni sulla nidificazione in provincia di Verona.

- 2 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 10 settembre 2021 e il 26 gennaio (P. Grotto et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 9.459 ind. ai dormitori in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 5 ind. al nido nella garzaia di Pellegrina (VR) il 15 maggio (L. Dalla Libera, P. Zucca [3] [5]).

Marangone dal ciuffo *Gulosus aristotelis*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni di individui marcati.

- 121 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).
- 83 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 27 giugno (D. Trombin, E. Vicentini).
- 1 ind. in Laguna di Venezia l'8 agosto (A. Sartori), marcato con anello "W04" inserito da adulto nell'isola di Gronghera, Croazia, il 10 aprile 2021.
- 1 ind. al Lido di Venezia il 7 ottobre (N. Fagotto), marcato con anello "W31" inserito da pullo nell'isola di Gronghera, Croazia, il 25 aprile 2022.

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.

- 1 ind. a Zevio (VR) il 5 marzo (L. Dalla Libera [3] [5]), marcato con anello lituano.

Charadriiformes**Burhinidae****Occhione *Burhinus oedicnemus***

Si elencano informazioni sullo svernamento e segnalazioni da località inusuali.

- 30-60 ind. a Spresiano (TV) tra dicembre 2021 e il 16 gennaio (L. Boscain, G. Sgorlon et al. [5]).
- 1 ind. in volo al quartiere San Bellino, Padova, l'1 aprile (L. Grassi [5]).
- 1 ind. in Valle Sacchettina, Cavallino-Treporti (VE), il 17 maggio (B. Gack, G. Gack [5]).
- 15-53 ind. a Spresiano (TV) tra il 6 novembre e il 26 dicembre (A. Nardotto, P. Vacilotto, F. Scarton, E. Pavan et al. [5]).

Quella di Padova dovrebbe rappresentare la prima segnalazione provinciale da oltre un secolo, l'ultima risaliva al 1914 (FOSCHI et al., 1996).

Haematopodidae**Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus***

Si elencano un conteggio consistente e una segnalazione al di fuori dell'area costiera.

- 240 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022), 150 ind. all'Isola del Bacan, Venezia, il 30 gennaio (S. Castelli).
- 1-2 ind. nel golfo di Peschiera (VR) tra il 7 e il 31 agosto, 1 ind. il 16 e il 17 ottobre (L. Dalla Libera, M. Lamera et al. [3] [5]).

Recurvirostridae**Avocetta *Recurvirostra avosetta***

Si elencano una concentrazione consistente e una segnalazione al di fuori dell'area costiera.

- 3.170 ind. in Palude di Cona (VE) il 6 febbraio

(A. Schneider [5]).

- 1 ind. alla Palude di Pellegrina (VR) l'1 aprile (E. Cavallini [5]).

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Si riporta una segnalazione tardiva.

- 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Levante (RO), l'1 novembre (A. Sartori).

Charadriidae**Pivieressa *Pluvialis squatarola***

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'area costiera.

- 1-6 ind. a Sermana, Peschiera del Garda (VR), tra il 23 settembre e il 23 ottobre (S. Tascio, M. Sighele, G. Sighele et al. [3] [5]).

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Si elencano concentrazioni consistenti.

- 1.210 ind. nelle bonifiche dell'Isola della Donzella (RO) il 16 gennaio (M. Passarella).
- 1.300 ind. in Palude delle Zumelle, San Michele al Tagliamento (VE), il 29 novembre (M. Cargasacchi, F. Piccolo [5]).

Piviere tortolino *Eudromias morinellus*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie.

- 1 ind. al Passo del Camino, Ferrara di Monte Baldo (VR), il 27 agosto (L. Mazzola [3]).
- 2 ind. sul Monte Altissimo, Monte Baldo (VR/TN) il 30 agosto (R. Boscaini [3] [5]).
- 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 24 settembre (N. Ciarla [5]).

Fratino *Charadrius alexandrinus*

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'area costiera.

- 1 ind. a Sermana, Peschiera del Garda (VR), tra il 30 settembre e il 5 ottobre (G. Speranza, M. Azzolini et al. [3] [5]).

Si tratta della seconda segnalazione recente per la provincia di Verona (M. D'offria, com. pers.).

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Si riporta una concentrazione consistente.

- 4.000 ind. a Porto Baseleghe, Caorle e San Michele al Tagliamento (VE), il 12 gennaio (N. Ciarla [5]).

Scolopacidae**Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus***

Si elencano segnalazioni nelle province di Padova e Verona, dove la specie è di comparsa irregolare.

- 1 ind. in Valle Morosina (PD) l'1 maggio (G. Piras [5]).

- 1 ind. a Sermana, Peschiera del Garda (VR), tra il 17 agosto e il 6 settembre (P. Bonvicini, L. Dalla Libera, C. Zanini et al. [1] [3] [5]).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa occasionale.

- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) tra il 25 agosto e il 4 settembre (G. Feltrin).

Quella del Lago di Santa Croce rappresenta la seconda segnalazione recente per la provincia di Belluno (SIGHELE et al., 2019).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Si riporta una segnalazione in provincia di Verona, dove la specie è di comparsa occasionale.

- 1-2 ind. a Sermana, Peschiera del Garda (VR), tra il 13 settembre e il 10 ottobre (C. Zanini et al. [3] [5]).

Si tratta della terza segnalazione di questo secolo per la provincia di Verona.

Voltapietre *Arenaria interpres*

Si elencano segnalazioni nelle province di Verona e Padova, dove la specie è di comparsa irregolare.

- 1-5 ind. nel golfo di Peschiera (VR) tra il 27 agosto e l'1 ottobre (A. Mosele, L. Dalla Libera, M. Lamera et al. [3] [5]).
- 1 ind. alla spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), tra il 27 settembre e il 13 novembre (D. de Marchi, G. Nassi, L. Gregnanin, E. Carta [5]).

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'area costiera, dove la specie è di comparsa regolare ma scarsa.

- 2 ind. a Sermana, Peschiera del Garda (VR), tra l'11 e il 22 settembre, 1 ind. tra l'1 e il 23 ottobre (P. Vacilotto, R. Boscaini et al. [1] [5]).

Si tratta della prima segnalazione recente per la provincia di Verona, le precedenti nel XIX secolo (PERINI, 1858).

Combattente *Calidris pugnax*

Si riporta una segnalazione in località inusuale per la specie.

- 1 ind. in pozza d'alpeggio a nord di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), 1.400 m s.l.m., il 10 maggio (E. Grippo [3] [5]).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Si elencano una concentrazione consistente e una segnalazione in provincia di Verona, dove la specie è di comparsa irregolare.

- 300 ind. a Ca' Roman, Venezia, l'8 gennaio (P. Scarpa [5]).
- 3-5 ind. nel golfo di Peschiera (VR) tra il 29 agosto e il 16 ottobre (E. Cavallini, S. Tascio, A. Pasqua, A. Mosele, C. Izzo et al. [3] [5]).

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Si elencano segnalazioni di individui marcati di un certo interesse.

- 1 ind. a Pellestrina, Venezia, il 26 agosto (S. Furlanetto, A. Sartori), marcato con anello "F31" inserito da adulto a Turnov, Bielorussia, il 15 maggio 2017, già osservato in Laguna di Venezia nel mese di agosto 2018 e in quello del 2020.
- 1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 4 ottobre (A. Sartori), marcato con anello "T0E" inserito da adulto alla foce della Vistola, Polonia, l'8 settembre 2017, già osservato in Laguna di Venezia nel gennaio 2018.

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Si elencano segnalazioni nella provincia di Vicenza e nella parte interna di quella di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Trissino (VI) il 23 settembre (G. Nassi [5]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 10 ottobre (F. Moretto [5] [6]).
- 1 ind. al bacino di laminazione di Caldogeno (VI) l'11 ottobre (M. Vicariotto [5]).

Croccolone *Gallinago media*

- 2 ind. a Capovilla, Caldogeno (VI), il 4 aprile (G. Nassi [5]).
- 1 ind. a Selva di Progno (VR) il 6 aprile (R. Ziviani [3]).
- 1 ind. al Laghetto Pilastroni, Dueville (VI), il 6 aprile (M. Vicariotto [5]).
- 1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 24 aprile (G. Fasoli [5]).

Frullino *Lymnocyptes minimus*

Si elencano segnalazioni in provincia di Padova e di Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Fontaniva (PD) il 6 febbraio (D. de Marchi [5]).
- 1 ind. a Mestre, Venezia, il 3 marzo (M. Semenzato [5]).
- 1 ind. a Dese, Venezia, il 17 marzo (M. Semenzato [5]).
- 1 ind. a Codevigo (PD) il 2 aprile e 13 novembre (D. de Marchi [5]).
- 4 ind. in Valle Perini (VE) il 3 aprile (M. Cappelletto [5]).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

- 2 ind. in una pozza d'alpeggio a Malga Camporotondo, Bosco Chiesanuova (VR), 1.500 m s.l.m., il 30 agosto e l'1 settembre (A. Vareschi, E. Iannone [1] [3]).

Si tratta della prima segnalazione in questo secolo per la provincia di Verona.

Pettegola *Tringa totanus*

Si elencano una segnalazione di individuo marcato e

una in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa occasionale.

- 1 ind. a Lio Piccolo, Cavallino-Treporti (VE), il 23 gennaio (A. Sartori), marcato con bandierina ungherese “78” inserita da adulto ad Apaj, Ungheria, il 31 marzo 2019.
- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 13 aprile (G. Feltrin [5]).

Quella del Lago di Santa Croce rappresenta la seconda segnalazione recente per la provincia di Belluno, la precedente nel 2015 (M. Cassol [5]).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Si riporta una segnalazione in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 23 aprile (P. Speggin, D. de Marchi, F. Moretto [5] [6]).

Glareolidae

Pernice di mare *Glareola pratincola*

Si riportano informazioni relative alla nidificazione.

- La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 31-32 cp., concentrate perlopiù nelle valli di Porto Viro e Porto Tolle (VERZA et al., 2023b).

Pernice di mare orientale *Glareola nordmanni*

- 1 ind. in Valle Ca' Pasta, Porto Viro (RO), il 7 giugno (M. Passarella [5]).

Si tratta della quinta segnalazione per il Veneto, la terza nel Delta del Po di Rovigo, le due precedenti nello stesso sito nel 2016 e nel 2017 (SIGHELE et al., 2017, 2018; FRACASSO et al., 2018); in attesa di conferma della COI.

Laridae

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

- 1 ind. al largo dello Scanno del Canarin (RO) l'8 dicembre (D. Trombin).

Gabbiano di Bonaparte *Larus philadelphia*

- 1 ind. del secondo calendario a Tessera, Venezia, il 27 maggio (E. Stival) (fig. 1).

Si tratta della prima segnalazione per l'Italia, confermata dalla COI (E. Fulco, com. pers.).

Gabbiano roseo *Larus geni*

Si elencano segnalazioni al di fuori del Delta del Po di Rovigo e della Laguna Nord di Venezia, dove la specie è di comparsa regolare, e informazioni sulla nidificazione.

- 1-4 ind. alla foce dell'Adige (VE/RO) tra il 31 gennaio e il 2 febbraio (E. Stival, R. Corvino, P. Vacilotto [5]).
- 1 ind. alla spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), il 19 febbraio (G. Piras [5]).

- La specie ha nidificato nel Delta del Po (RO) con 115-116 cp., concentrate perlopiù nell'area della Sacca di Scardovari (VERZA et al., 2023b).

- La specie ha nidificato per la prima volta in provincia di Venezia con 2 cp. che hanno portato a termine la riproduzione in Valle Sacchetta (PICONE et al., 2023).

Quella della Boschettona rappresenta la terza segnalazione per la provincia di Padova (SIGHELE et al., 2020, 2022b).

Gabbiano comune *Larus ridibundus*

Si elencano segnalazioni di individui marcati di un certo interesse.

- 1 ind. in Valle Chiusa, Porto Tolle (RO), il 5 luglio (A. Sartori), marcato con anello serbo “YEKZ”.

- 1 ind. a Chioggia (VE) il 16 luglio (A. Sartori), marcato con anello “UH41” inserito da adulto a Barmaki, Ucraina, il 21 maggio 2022.

- 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Levante (RO), il 7 agosto (A. Sartori), marcato con anello “B239” inserito da pullo a Ptujsko jezero, Slovenia, il 6 luglio 2020.

- 1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 7 settembre (A. Sartori), marcato con anello “HT52” inserito da pullo a Rétszilás, Ungheria, il 30 maggio 2010, già osservato nello stesso sito nel 2013 e successivamente più volte a Migliareto (MN) nei mesi invernali.

- 1 ind. a Sottomarina, Chioggia (VE), il 13 novembre (A. Sartori), marcato con anello “B221” inserito da pullo a Ptujsko jezero, Slovenia, il 6 luglio 2020, già osservato nello stesso sito nell'inverno 2021 (P. Scarpa).

- 1 ind. a Chioggia (VE) il 28 novembre (E. Stival, A. Schneider et al.), marcato con anello “S99Y” inserito da adulto a Jakuševčka, Croazia, il 3 marzo 2013, già osservato nello stesso sito dal 2015 nei mesi invernali.

- 1 ind. a Venezia il 15 dicembre (A. Sartori), marcato con anello “X58J” inserito da pullo a Löbnitz, Germania, il 14 luglio 2018.

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Si elencano un conteggio consistente, segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa irregolare, e quelle di individui marcati di un certo interesse.

- 4.052 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio (BASSO, 2022).

- 7 ind. a Calalzo di Cadore (BL) il 26 aprile (M. Cassol [5]).

- 1 ind. a Chioggia (VE) il 16 luglio (A. Sartori), marcato con anello “PKY9” inserito da pullo a Zbiornik Poraj, Polonia, il 4 giugno 2011, osservato saltuariamente in Laguna di Venezia (M. Basso, A. Sartori).

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 3 e il 5 agosto (E. Carta [5]).

- 1 ind. a Chioggia (VE) il 5 agosto (S. Furlanetto, A. Sartori), marcato con anello “383H” inserito da pullo ad Anversa, Belgio, il 17 giugno 2017, osservato anche a Comacchio (FE) il 7 luglio 2020 (G. Arveda).

Gavina *Larus canus*

Si elencano segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa irregolare.

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 27 novembre (F. Salvini [5]).
- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 20 dicembre (G. Feltrin [5]).

Zafferano *Larus fuscus*

Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e quelle al di fuori delle province di Venezia, Rovigo e Verona, dove la specie è di comparsa regolare.

- 3 ind. in Sacca di Bottonera (RO) il 5 febbraio (B. Perroud [5]).
- 1 ind. a Spresiano (TV) il 2 aprile (F. Scarton [5]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) tra il 30 settembre e l'11 novembre (F. Moretto [5] [6]).
- 1 ind. tra Schiavon e Nove (VI) tra il 27 ottobre e il 18 dicembre (M. Vicariotto, F. Moretto [5] [6]).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Si elencano segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.

- 2 ind. a Chioggia (VE) il 5 febbraio (A. Schneider [5]).
- 2 ind. a Chioggia (VE) il 18 dicembre (G. Nassi, L. Dalla Libera [5]).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Si elencano le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati e una in provincia di Vicenza, dove la specie è di comparsa occasionale.

- 3-4 ind. a Garda (VR) tra il 9 gennaio e il 5 febbraio (L. Dalla Libera et al. – IWC [3] [5]).
- 1 ind. al bacino di laminazione di Caldogeno (VI) il 28 dicembre (M. Vicariotto [5]).

Fratricello *Sternula albifrons*

Si riporta una concentrazione interessante.

- 545 ind. a Tessera, Venezia, il 5 agosto (E. Stival [5]).

Sterna zampanere *Gelochelidon nilotica*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

- 1 ind. a Maserada sul Piave (TV) l'1 maggio (F. Scarton [5]).
- 2-3 ind. in Tenuta Ca' Tron, Roncade (TV), tra il 2 maggio e l'8 giugno, 5-10 ind. in volo trofico sopra un campo in mietitura il 24 e il 25 giugno, ancora 1 ind. il 18 e il 28 luglio (R. Storer, A. Pastorini, A. Nardotto et al. [5]).
- 5 ind. a Padova tra il 4 luglio e l'1 agosto

(S. Castelli, L. Grassi, P. Melandri, G. Piras, M. Vianello [5]).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Si elencano segnalazioni al di fuori della zona costiera.

- 1 ind. a Quinto di Treviso (TV) il 20 aprile (F. Salvini [5]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 23 aprile (P. Speggiorin, D. de Marchi, F. Moretto [5] [6]).

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 9 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 13 giugno (F. Moretto [5]).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 12 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 29 aprile, quindi 1-3 ind. tra il 3 e il 7 maggio (F. Moretto [5]).

Mignattino comune *Chlidonias niger*

Si riportano segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è di comparsa irregolare.

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 5 e il 17 settembre (P. Grotto, M. Zenatello, G. Nassi [5]).

Sterna comune *Sterna hirundo*

Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.

- 1 ind. a Chioggia (VE) il 17 agosto, marcato con anello “SL1” (A. Sartori) inserito da pullo alla Riserva naturale di Val Stagnon, Slovenia, il 21 giugno 2022.

Beccapesci *Thalasseus sandvicensis*

Si elencano segnalazioni di individui marcati.

- 1 ind. alla foce del Dese (VE) il 21 agosto (A. Sartori), marcato con anello francese “00”.
- 1 ind. a Pellestrina, Venezia, il 22 settembre (A. Sartori), marcato con anello spagnolo “MM2”.

Stercorariidae

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

- 1 ind. al largo della spiaggia di Boccasette, Porto Tolle (RO), il 4 ottobre (E. Stival, M. Cargasacchi et al. [1] [5]).

Labbo *Stercorarius parasiticus*

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'area costiera.

- 1 ind. nel golfo di Peschiera (VR) tra il 7 e il 16 settembre (A. Gargioni et al. [5]).

Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus*

- 1 ind. nel golfo di Peschiera (VR) il 7 settembre

(P. Bonvicini [5]).

- 1 ind. a Boccasette, Porto Tolle (RO), il 22 settembre (I. Rösler [5]).

Strigiformes

Strigidae

Civetta nana *Glaucidium passerinum*

Si elencano segnalazioni in provincia di Verona, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. in canto nella Foresta dei Folignani, Bosco Chiesanuova (VR), l'1 gennaio (P. Parricelli [3]).
- 1 ind. in canto ai Tracchi, Bosco Chiesanuova (VR), il 6 dicembre (E. Castellucci [5]).
- 1 ind. recuperato ferito a Selva di Progno (VR) l'8 dicembre (CRAS Progetto Natura Verona).

Gufo di palude *Asio flammeus*

Si elencano segnalazioni nelle province di Padova e Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Piazzola sul Brenta (PD) il 18 aprile, recuperato dopo impatto con automobile (U. Tizian [7]).
- 1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 23 aprile (C. Izzo, M. Allen [3] [5]).
- 1 ind. a Vicenza il 6 settembre, recuperato in difficoltà (U. Tizian [7]).
- 1 ind. al bacino di laminazione di Caldogno (VI) il 17 dicembre (M. Vicariotto [5]).

Accipitriformes

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Si elencano segnalazioni relative al periodo invernale.

- 1 ind. tra Brussa, Valle Perera e Valle Vecchia, Caorle (VE), dal 3 dicembre 2021 al 6 febbraio (E. Benussi, N. Ciarla, V. Polo et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1 ind. a Ca' Pisani (RO) il 6 gennaio (M. Passarella, M. Tortarolo, M. Tomasi, P. Scarpa [5]).
- 1 ind. a Tenuta Ca' da Riva, Venezia, il 12 gennaio (M. Cappelletto [5]).
- 1 ind. nella via delle Valli, Rosolina (RO), il 27 dicembre (L. Forneris, R. Alba [5]).

Accipitridae

Nibbio bianco *Elanus caeruleus*

- 1 ind. a Campo, Borgo Valbelluna (BL), il 19 agosto (A. Cavalet [1]) (fig. 2).

Si tratta della terza segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Belluno (SIGHELE et al., 2011, 2018).

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si elencano i conteggi durante la migrazione post-riproduttiva.

- 5.175 ind. contati durante la migrazione post-riproduttiva a Colle San Giorgio, Maser (TV) (MEZZAVILLA et al., 2022).
- 3.576 ind. contati sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) (GARGIONI & BELLINTANI, 2022).

Capovaccaio *Neophron percnopterus*

- 1 ind. a Colle San Giorgio, Maser (TV), il 24 agosto (R. Levert, F. Salvini, F. Piccolo et al. [5] [6]).

Si tratta della quinta segnalazione per il Veneto, la prima per la provincia di Treviso (FOSCHI, 1976; DE FRANCESCHI, 1996; DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002; SIGHELE et al., 2014), oltre ad altra di dubbia veridicità (FRACASSO et al., 1985; TORMEN & DE COL, 2008).

Biancone *Circaetus gallicus*

Si elencano segnalazioni in provincia di Venezia, dove la specie è poco frequente, e una concentrazione consistente in dormitorio.

- 1 ind. in Valle Pierimpì, Campagna Lupia (VE), il 6 aprile (A. Pastorini [5]).
- Dormitorio di un massimo di 30 ind., con una media di 12 ind., sui Colli Euganei (PD) tra il 5 luglio e il 18 settembre, con un'analisi fotografica che ha stimato che almeno 50 ind. abbiano frequentato l'area (R. Guglielmi, A. Tonelli, E. Rizzo et al. – cfr. TONELLI et al., 2023).
- 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 25 settembre (N. Ciarla [5]).

Grifone *Gyps fulvus*

- 1 ind. ad Avesa, Verona, il 13 gennaio (A. Mosele).
- 1 ind. a Campanella, Gallio (VI), il 26 gennaio (E. Ferraro [5]).
- 5 ind. ad Arsiero (VI) il 26 febbraio (M. Kemeny).
- 4 ind. a Le Melette, Gallio (VI), il 28 marzo (D. Lunardi [5] [7]).
- 1 ind. in volo verso Passo Mariech, Valdobbiadene (TV), il 21 maggio (F. Scarton [5]).
- 1 ind. in volo sopra il Rifugio Dal Piaz, Sovramonte (BL), il 21 maggio (F. Menegat [5]).
- 3 ind. ad Arsiero (VI) il 10 giugno (C. Zanussi).
- 1 ind. sulle creste del Monte Baldo, Caprino Veronese (VR), l'11 giugno, 3 ind. il 12 giugno (A. Foki, A. Piva [3] [5]).
- 1 ind. sul Monte Fumana Secca, Quero (BL), il 12 giugno (F. Gnesotto [5] [7]).
- 1 ind. a La Posa, Revine Lago (TV), il 16 giugno (M. Cargasacchi, M. Cocco [1] [5]).
- 1 ind. sul Monte Rite (BL) il 20 luglio (E. Cecconello [7]).
- 2 ind. sul Col Quaternà, Comelico Superiore (BL), l'11 settembre (L. Gregnanin [1]).



Fig. 1. Gabbiano di Bonaparte (*Larus philadelphia*) a Tessera, Venezia, il 27 maggio 2022. Foto di E. Stival. **Fig. 2.** Nibbio bianco (*Elanus caeruleus*) a Campo, Borgo Valbelluna (BL), il 20 agosto 2022. Foto di A. Cavalet. **Fig. 3.** Allodola golagiulla (*Eremophila alpestris*) a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), il 2 dicembre 2022. Foto di G. Sighele.

Aquila anatraia maggiore *Clanga clanga*

- 1-2 ind. tra Valle Zignago, Valle Vecchia, Valle Perera, Brussa e Villaviera, Caorle (VE), tra il 24 novembre 2021 e l'1 marzo, 4 ind. il 21 gennaio (F. Salvini, A. Sutto, N. Ciarla, F. Piccolo et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1 ind. tra Valle Sacchetta, Valle Ca' Pisani e Valle Ca' Pasta (RO) tra il 7 dicembre 2021 e il 26 gennaio (F. Piccolo, D. Trombin et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1-2 ind. tra Villaviera, Valle Perera e Valle Zignago, Caorle (VE), tra il 10 dicembre e il 25 febbraio 2023 (L. Dalla Libera, P. Zucca, A. Sutto, A. Sartori et al. [5]).

Aquila minore *Hieraaetus pennatus*

- 1 ind. a Ca' Pisani (RO) il 7 gennaio (L. Gennari, L. Lanzani [5]).
- 1 ind. sul Monte Agnellezze, Vittorio Veneto (TV), il 2 maggio, forma scura (P. Vacilotto [5]).
- 1 ind. a La Bella-Ligonto, Follina (TV), il 7 agosto, forma chiara (R. Storer [5]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 25 ottobre, forma chiara (F. Gherardini [5]).

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Si elencano una segnalazione di individuo con piumaggio particolare e un conteggio consistente.

- 1 ind. in forma scura in Sacca degli Scardovari (RO) il 3 gennaio (D. Borgogno [5]).
- 115 ind. in provincia di Venezia tra il 3 e il 6 gennaio, dei quali 15 ind. in Valle Dogà (BASSO, 2022 – M. Bon [5]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

- 1 m. a Cava Bomba, Cinto Euganeo (PD), il 4 aprile (A. Tonelli [5]).

Astore *Accipiter gentilis*

Si elencano segnalazioni in località di pianura.

- 1 ad. a Oderzo (TV) il 20 febbraio (G. Sgorlon [5]).
- 1 ind. in Palude di Cona (VE) il 7 settembre (M. Mitchell [8]).
- 1 ind. a Piombino Dese (PD) il 26 settembre (P. Salvador [5]).
- 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 29 ottobre, 1 ind. il 10 dicembre (N. Ciarla, L. Dalla Libera, P. Zucca [5]).
- 1 ind. tra Palude delle Zumelle e Terzo Bacino di Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), l'11 novembre (F. Piccolo, R. Storer, P. Vacilotto [5]).
- 1 ind. del primo anno a Baone (PD) l'11 novembre (A. Tonelli [5]).
- 1 ind. del primo anno a Roncade (TV) il 19 novembre (P. Gambirasi).

- 1 ind. alla foce del Tagliamento (VE) il 26 dicembre (M. Trombetta [5]).

Nibbio reale *Milvus milvus*

Si elencano segnalazioni al di fuori dei regolari periodi migratori.

- 1 ind. tra Ca' Vendramin, Taglio di Po, e Rivà, Ariano nel Polesine (RO), il 4 gennaio (V. Bellettato).
- 1 ind. a Brussa, Caorle (VE), l'11 gennaio (M. Cargasacchi [5]).
- 1 ind. a Borgo Valbelluna (BL) il 7 giugno (D. Vendrami [5]).
- 1 ind. alla Palude del Busatello, Gazzo Veronese (VR), l'8 dicembre (S. Bellintani [5]).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 30 novembre (P. Geromel [5]).

Coraciiformes**Coraciidae****Ghiandaia marina *Coracias garrulus***

La nidificazione è stata accertata in tutte le province venete tranne quella di Belluno.

Piciformes**Picidae****Picchio cenerino *Picus canus***

Si elencano segnalazioni nelle province di Venezia e Verona.

- 1 cp. in Val di Revolto, Selva di Progno (VR), il 4 febbraio (P. Parricelli [3]).
- 1 f. all'Oasi Cave di Gaggio Nord, Marcon (VE), il 21 novembre (S. De Gobbi, B. Zavattin [5]).

Quella di Marcon rappresenta la terza segnalazione dal 1950 per la provincia di Venezia (FOSCHI et al., 1996; SIGHELE et al., 2016).

Picchio nero *Dryocopus martius*

Si elencano segnalazioni in località di pianura poco note per la specie.

- 1 ind. a Spinea (VE) il 28 gennaio (E. Stival [5]).
- 1 ind. a Marghera, Venezia, il 2 agosto (F. Piccolo [5]).

Picchio rosso minore *Dryobates minor*

Si elencano segnalazioni al di fuori della Val Belluna (BL), dove la specie è di presenza regolare.

- 1 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 5 marzo e il 15 aprile, quindi 1 ind. il 10 settembre e l'11 novembre (E. Pavan, G. Silveri [5] [7]).
- 1 ind. a Treviso il 25 dicembre (A. Zaninoto [1]).

Falconiformes Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*

- 2-5 ind. nella Bonifica di Loncon (VE) tra il 15 e il 18 maggio (M. Bozza, P. Vacilotto et al. [5]).
- 5 ind. a nord di Soave (VR) il 19 maggio (G. Sighele, S. Gaetani [3] [5]).
- 1 ind. sui Colli Euganei a Baone (PD), il 21 maggio (C. Fassina, G. Piras [1]).
- 1 ind. a San Giacomo, Romano d'Ezzelino (VI), il 28 maggio (L. Visentin [5]).
- 2-6 ind. a Cancellò, Verona, tra il 13 e il 15 agosto (C. Izzo, L. Milione [3] [5]).
- 1 ind. a Santissima Trinità, Badia Calavena (VR), il 21 agosto (M. Sighele, R. Vignola [3]).
- 1-5 ind. a Roverè Veronese (VR) tra il 2 e il 4 settembre (C. Chiappisi, L. Milione [3] [5]).

Gheppio *Falco tinnunculus*

Si riporta la segnalazione di una anomalia di piumaggio.

- 1 ind. leucistico ad Adria (RO) il 7 febbraio (D. Trombin [6]).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Si riporta una segnalazione in ambiente urbano.

- 1 ind. a Verona tra il 17 aprile e il 14 maggio (M. Allen [3]).

Falco della regina *Falco eleonorae*

- 1 ind. a Cima Grappa, Crespano del Grappa (TV), il 21 e il 23 giugno (L. Sebastiani, A. Pastorini [5]).
- 1 ind. a Vittorio Veneto (TV) il 14 agosto (F. Canzani [5]).
- 2 ind. a Malga Rialto, Valdagno (VI), il 22 agosto (D. Speggiorin, P. Speggiorin, T. Montenegro [5]).
- 1 ind. a Colle San Giorgio, Maser (TV), il 25 agosto (F. Salvini, L. Visentin et al. [5] [6]).
- 1 ind. a Volpago del Montello (TV) il 28 agosto (R. Storer [5]).

Smeriglio *Falco columbarius*

Si elencano segnalazioni in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Caldogeno (VI) il 13 gennaio (M. Vicariotto [5]).
- 1 ind. a Malo (VI) il 10 aprile (G. Nassi [5]).
- 1 ind. a Schio (VI) il 24 novembre (G. Paesani [5]).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. *calidus* (falco pellegrino siberiano).

- 1 ind. a Prati Nuovi, San Michele al Tagliamento (VE), l'8 gennaio (R. Corvino [5]).
- 1 ind. a Boccasette (RO) il 14 gennaio e il 21 febbraio (M. Cargasacchi, F. Piccolo [5]).
- 1 ind. a Ca' Pisani (RO) il 26 gennaio (D. Trombin [5]).

Passeriformes Laniidae

Averla cenerina *Lanius minor*

- 1 ind. nell'Oasi di Ca' Mello, Porto Tolle (RO), il 15 maggio e 1 ind. il 5 luglio (D. Trombin [5]).

Averla capirossa *Lanius senator*

- 1 ind. nei pressi di Villaga (VI) tra il 10 e il 29 maggio (M. Fenati et al. [5]).

Corvidae

Corvo comune *Corvus frugilegus*

Si elencano le segnalazioni di maggiore consistenza numerica.

- 10 ind. all'Isola di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 10 gennaio (P. Vacilotto [5]).
- 14 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 28 ottobre (F. Moretto [5]).
- 10 ind. a Cessalto (TV) il 4 novembre (G. Sgorlon [5]).

Corvo imperiale *Corvus corax*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie e una concentrazione interessante.

- 1 ind. a Roncade (TV) il 5 marzo (L. Vacilotto).
- 2 ind. tra Valle Vecchia, Caorle (VE), e Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), l'11 aprile, il 7 maggio, tra il 14 e il 21 agosto, l'11 settembre, tra l'8 e il 29 ottobre (N. Ciarla, M. Darpin, M. Panzarin, A. Battistel, G. Cuccurullo, F. Mason [1] [5]).
- 100 ind. ca. all'Ecocentro a Pies De Ra Mognes, Cortina d'Ampezzo (BL), il 25 luglio (M. Sighele).

Quella veneziana rappresenta la seconda segnalazione nota per la provincia, la precedente nel 2000 (M. Sighele).

Cornacchia *Corvus corone*

Si riporta la segnalazione di maggiore consistenza numerica di individui attribuiti alla ssp. nominale *corone* (cornacchia nera).

- 8 ind. tra Malga Modetto e Castelberto, Erbezzo (VR), il 29 gennaio (A. Pasqua [5]).

Si ricorda che nella lista IOC (GILL et al., 2023) *Corvus corone corone* e *Corvus corone cornix* sono considerate due specie diverse.

Paridae

Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*

Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia.

- 1 ind. in mangiatoia a Marcon (VE), il 27 gennaio, quindi 1 ind. il 2 marzo (S. Bertato [3]).

Si tratta della seconda segnalazione per la provincia di Venezia (SIGHELE et al., 2014; STIVAL & SIGHELE, 2022).

Remizidae**Pendolino *Remiz pendulinus***

Si riporta una segnalazione in periodo riproduttivo.

- 1 ind. alle Grave di Ciano, Crocetta del Montello (TV), il 28 maggio (G. Silveri [5]); nella stessa località la specie era stata segnalata anche nel giugno 2018 e nel luglio 2021 (SIGHELE et al., 2019, 2022b).

Alaudidae**Allodola golagialla *Eremophila alpestris***

- 1 ind. tra Bocca di Selva e Malga Camporotondo, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 30 novembre e il 14 marzo 2023 (L. Signori, F. Valbusa, A. Vareschi, M. Azzolini et al. [1] [3] [5] [6]) (fig. 3).

Si tratta della prima segnalazione del secolo per il Veneto, la settima dal 1950 in poi, la più recente nel marzo 1979 a Bolzano Vicentino (BONFIO, 1960; FAVERO, 1963; PAVAN, 1963; FANTIN, 1974, 1977, 1980).

Tottavilla *Lullula arborea*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie.

- 2-12 ind. a Borgo Redentore, Malo (VI), tra il 2 novembre 2021 e il 4 gennaio (G. Nassi [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 15-21 ind. alle Sorgenti del Sile, Piombino Dese (PD), tra il 24 dicembre 2021 e il 4 gennaio (P. Salvador [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 4-8 ind. a Borgo Redentore, Malo (VI), tra il 14 ottobre e l'8 febbraio 2023 (G. Nassi et al. [5]).
- 1 ind. a Lamon (BL) il 22 ottobre (D. Lopez [5]).
- 1 ind. a Isola Vicentina (VI) l'8 novembre (G. Nassi [5]).

Panuridae**Basettino *Panurus biarmicus***

- 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 19 e il 27 aprile (N. Ciarla, S. Faggian [1] [5]).
- 1-2 ind. in Valle Morosina (PD) il 3 e il 26 giugno (F. Scarton, G. Piras [5]).
- 2 ind. in Valle Morosina (PD) il 16 ottobre (D. de Marchi [1]).
- 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 5 novembre (N. Ciarla [5]).

Acrocephalidae**Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon***

Si elencano una segnalazione in provincia di Treviso, dove la specie è di comparsa irregolare, e segnalazioni in periodo invernale.

- 1 ind. a Quinto di Treviso (TV) il 6 aprile (F. Salvini et al. [5]).
- 1 ind. in Valle Morosina (PD) tra il 24 dicembre 2021 e il 4 gennaio (D. de Marchi, G. Piras [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 3 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 14 agosto (G. Feltrin [5]).

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

Si elencano le segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Feltre (BL) il 19 maggio (E. Vettorazzo [5]).
- 2 ind. al Lago di Busche (BL) il 22 maggio (L. Bonato [5]).

Locustellidae**Salciaiola *Locustella luscinioides***

- 1 ind. a Quinto di Treviso (TV) il 14 aprile (F. Salvini [1] [5]).
- 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 27 aprile (N. Ciarla [5]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 25 maggio (R. Corsi [5]).

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

- 1 ind. ad Affi (VR) il 24 aprile, dove la specie era stata segnalata nello stesso periodo anche nei due anni precedenti (M. Banterla [3] – cfr. SIGHELE et al., 2021, 2022b).
- 1 ind. alla Cava Girelli, Bussolengo (VR), il 26 aprile (C. Zanini [3]).
- 1 ind. in Valle Averno (VE) il 10 maggio (F. Scarton [5]).

Hirundinidae**Rondine rossiccia *Cecropis daurica***

- 1 ind. a Este (PD) il 24 aprile (A. Tonelli [5]).
- 1 ind. nella Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria (VE), il 25 aprile (M. Bozza [5]).

Quella di Este rappresenta la terza segnalazione per la provincia di Padova (SIGHELE et al., 2011, 2018).

Phylloscopidae**Lui bianco *Phylloscopus bonelli***

Si riporta una segnalazione in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto (PD) il 12 agosto (A. Frigo).



Fig. 4. Prisolone indiano (*Anthus hodgsoni*) a Bugano, Vicenza, il 19 dicembre 2022. Foto di P. Brunello. **Fig. 5.** Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*) a Malo (VI) il 29 maggio 2022. Foto di G. Nassi. **Fig. 6.** Zigolo minore (*Emberiza pusilla*) a Quinto di Treviso (TV) il 20 aprile 2022. Foto di F. Salvini.

Lù siberiano *Phylloscopus tristis*

Si elencano segnalazioni in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. alla Busa de Giarretta (PD) tra l'8 gennaio e il 26 marzo (F. Moretto, D. de Marchi, P. Speggiorin [5]).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto (PD) il 5 dicembre (A. Frigo).

Si ricorda che nella lista IOC (GILL et al., 2023) questo *taxon* è considerato sottospecie di *Phylloscopus collybita*.

Aegithalidae**Codibugnolo *Aegithalos caudatus***

Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. *caudatus* (codibugnolo testabianca).

- 1 ind. a Romano d'Ezzelino (VI) l'1 gennaio (L. Visentin [5]).
- 1 ind. a Torbe, Negrar di Valpolicella (VR), il 30 novembre (C. Bonaldi [3]).

Sylviidae**Bigia padovana *Sylvia nisoria***

- 1 cp. nei pressi di Campofontana, Selva di Progno (VR), il 18 giugno, 1 m. il 27 giugno (M. Bertacco [5]).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

- 1 ind. a Verona l'1 aprile, in un terrazzo in ambiente urbano (S. Ferrara [3]).
- 1-3 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), tra l'1 e il 3 aprile (P. Vacilotto, L. Boscain, N. Ciarla et al. [1] [5]).
- 1 ind. a Mira (VE) il 4 aprile (R. Michelini [5]).
- 1 ind. a Treviso il 4 aprile (R. Storer [5]).
- 1 ind. in Valle Scanarello (RO) l'8 aprile (L. Boscain).
- 1 ind. a Roncade (TV) il 10 aprile (A. Pastorini [5]).
- 1 ind. a Padova il 28 aprile (G. Piras [5]).
- 2 ind. ad Avesa, Verona, il 17 maggio (G. Sighele, S. Gaetani [3]).

Sittidae**Picchio muraiolo *Tichodroma muraria***

Si elencano segnalazioni in provincia di Rovigo, dove la specie è di comparsa occasionale.

- 1 ind. su una parete dell'ospedale di Rovigo nella primavera del 2022 (A. Zattarin).
- 1 ind. a Canarin, Porto Tolle (RO), il 25 settembre (E. Fregnan [4] [7]).

Rappresentano la quinta e la sesta segnalazione

per la provincia di Rovigo (DAL FIUME, 1896; SIGHELE et al., 2017; E. Tiso [5]).

Cinclidae**Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus***

Si elencano informazioni sulla nidificazione in località inusuali.

- 1 cp. ha nidificato sull'Adige a Verona, segnalata da gennaio, successivamente osservato 1 juv. a partire dalla terza decade di aprile (M. Allen, M. Sighele, M. Cristofolletti, R. Fiorentini et al. [3] [5]).
- 1 cp. impegnata nella costruzione del nido alla Diga di Salionze, Valeggio sul Mincio (VR), tra il 30 gennaio e il 17 febbraio (S. Tascio [3] [5]).

Sturnidae**Storno roseo *Pastor roseus***

- 25 ind. in volo a Rosà (VI) il 25 maggio (F. Moretto [5] [6]).
- 8-23 ind. a Boccasette (RO) tra il 27 maggio e l'1 giugno, 2 ind. il 10 giugno (R. Tinarelli, M. Fenati, F. Salvini, N. Adestriani et al. [5] [6]).
- 12 ind. in volo a Vigasio (VR) il 28 maggio (A. Mosele, P. Carletto [5]).
- 14 ind. in volo a Bassano del Grappa (VI) il 28 maggio (F. Moretto [5] [6]).
- 30-60 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), tra il 28 e il 30 maggio (J. Peruzzo, P. Speggiorin et al. [5]).
- 1 ind. a Marcon (VE) il 29 maggio (S. Niero [5]).
- 1 ind. a Lama Polesine, Ceregnano (RO), il 30 maggio (E. Verza [5]).
- 12 ind. a Raga San Zeno, Schio (VI), il 31 maggio (G. Paesani [5]).
- 15 ind. a Valdagno (VI) il 31 maggio (I. Bernava [5]).
- 2 ind. a Boccasette (RO) il 10 giugno (N. Adestriani).

Turdidae**Tordela *Turdus viscivorus***

Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Jesolo (VE) il 23 dicembre (E. Stival [5]).

Cesena *Turdus pilaris*

Si elencano segnalazioni in periodo riproduttivo in provincia di Vicenza, dove la specie si riproduce con pochissime coppie.

- 2 ind. a Campolongo, Rotzo (VI), il 4 giugno (F. Scarton [5]).
- 1 juv. già involato nei pressi di Contrada Tringole, Torrelbelvicino (VI), il 15 luglio (J. Peruzzo [5]).

Muscicapidae**Pettazzurro *Cyanecula svecica***

Si elencano segnalazioni nelle province di Padova e Treviso, dove la specie è poco frequente, e la segnalazione con la maggiore consistenza numerica.

- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 25 e il 26 marzo (F. Moretto et al. [5]).
- 1-2 ind. a Quinto di Treviso (TV) tra il 2 e il 4 aprile (F. Salvini, S. Morato, P. Vacilotto et al. [5]).
- 2-5 ind. a Villaviera, Caorle (VE), tra il 3 e l'11 settembre (N. Ciarla, M. Darpin, P. Vacilotto [5]).
- 1 ind. in Valle Millecampi (PD) il 27 settembre, 2 ind. l'1 novembre (D. de Marchi, F. Moretto [5]).
- 1-5 ind. a Vedelago (TV) tra il 29 settembre e il 25 ottobre (F. Salvini et al. [5]).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

- 1 ind. a Saletto, Breda di Piave (TV), il 24 aprile (R. Storer [5]).

Prunellidae**Sordone *Prunella collaris***

Si riportano segnalazioni in località poco nota per la specie.

- 3-6 ind. sui Colli Euganei a Vo' (PD) tra il 19 dicembre 2021 e il 13 febbraio, dove la specie aveva svernato anche nell'inverno 2019/2020 (M. Busato, G. Nassi, G. Piras et al. [1] [5] – cfr. SIGHELE et al., 2020, 2022b), presenti anche l'inverno successivo il 18 dicembre (M. Busato [5]).

Passeridae**Passera oltremontana *Passer domesticus***

Si riporta una segnalazione in località inusuale.

- 1 ind. in Val di Zoldo (BL) il 7 aprile (G. Feltrin [5]).

Passera d'Italia *Passer italiae*

Si riporta una concentrazione consistente.

- 150 ind. alla foce del Brenta, Chioggia (VE), il 28 agosto (P. Scarpa [5]).

Passera sarda *Passer hispaniolensis*

Si elencano segnalazioni al di fuori del Delta del Po di Rovigo, dove la specie è presente tutto l'anno.

- 6 ind. alla spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), il 6 febbraio (G. Piras [5]).
- 6 ind. alla spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), l'1 novembre (M. Busato [5]).

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Si elencano concentrazioni interessanti.

- 80 ind. ca. nei pressi del Rifugio Auronzo, Auronzo di Cadore (BL), l'11 ottobre (C. Mödinger [5]).

- 30-64 ind. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 3 dicembre e il 15 febbraio 2023 (M. Azzolini, C. Izzo, C. Zanini et al. [1] [3] [5] [6]), alcuni marcati con anello inserito nell'estate 2022 sul Monte Carega (TN).

Motacillidae**Prispolone indiano *Anthus hodgsoni***

- 1 ind. a Bugano, Longare (VI), il 19 dicembre (P. Brunello et al. [1] [5] [6] [7]) (fig. 4).
- 1 ind. a Ca' Roman, Venezia, il 24 dicembre (C. Gruppuso [8]).

Rappresentano la terza e la quarta segnalazione per il Veneto, le prime per le province di Vicenza e di Venezia (SIGHELE et al., 2021, 2022b).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

- 1 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), il 29 marzo (G. Nassi [5]).
- 1 ind. a Mansuè (TV) il 2 aprile (G. Sgorlon [1] [6]).
- 1 ind. a Caldogno (VI) il 15 aprile (M. Vicariotto [5]).
- 3 ind. a Cancellò, Verona, il 15 ottobre (C. Izzo [3] [5]).

Cutrettola *Motacilla flava*

Si riporta una segnalazione a quota inusuale.

- 1 ind. nei pressi del Sacrario del Pordoi, Livinallongo del Col di Lana (BL), 2.200 m s.l.m., il 26 agosto (A. Motta [5]).

Fringillidae**Frosone *Coccothraustes coccothraustes***

Si riporta una segnalazione in provincia di Rovigo, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Porto Caleri, Rosolina (RO), il 2 febbraio (P. Vacilotto [5]).

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. nominale *pyrrhula* (ciuffolotto maggiore).

- 1 ind. a Crocetta del Montello (TV) il 15 gennaio (F. Menegat [5]).
- 1 ind. a Gambugliano (VI) l'11 novembre (P. Spegginorin [5]).
- 1 ind. a Vigo di Cadore (BL) il 20 novembre (J. Peruzzo, M. Vicariotto [5]).

Organetto *Acanthis flammea*

Si elencano segnalazioni al di fuori delle note aree riproduttive nelle province di Belluno e Vicenza, tutte relative alla ssp. *cabaret* (organetto minore).

- 1 ind. a Malga Ime, Ferrara di Monte Baldo (VR), il 31 gennaio (G. Dalle Vedove [5]).

- 2 ind. a Prà Alpesina, Malcesine (VR), il 29 giugno (F. Roscelli [5]).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento sul Monte Pizzoc (TV) il 30 ottobre (A. Favaretto [5]).

Si ricorda che nella lista IOC (GILL et al., 2023) *Acanthis flammea flammea* e *Acanthis flammea cabaret* sono considerate due specie diverse.

Venturone alpino *Carduelis citrinella*

- 40-100 ind. sul Monte Baldo in Valfredda, Caprino Veronese (VR), tra l'1 e il 26 febbraio (E. Cavallini, A. Pasqua, C. Zanini, L. Corrier et al. [5]).
- 15 ind. in volo a Malga Folignano di Cima, Bosco Chiesanuova (VR), il 12 febbraio (A. Pasqua [5]).
- 1 ind. a Bribano, Sedico (BL), il 14 marzo (N. Barp [5]).
- 4 ind. a Malga Rin Bianco, Auronzo di Cadore (BL), il 12 maggio (A. Bossi [5]).
- 2-3 ind. nei pressi di Malga Fossetta, Asiago (VI), il 31 luglio (M. Sighele).
- 1 ind. ad Asiago (VI) il 4 agosto (S. Faggian [5]).
- 7 ind. a Croda Sora i Colesei, Comelico Superiore (BL), il 12 settembre (A. Bossi [5]).
- 20-30 ind. sul Monte Baldo in Valfredda, Caprino Veronese (VR), tra il 23 e il 30 ottobre (M. Busato, A. Amaretti, G. Sighele et al. [5]).

Calcaridae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

- 6 ind. sul Monte Cesen, Valdobbiadene (TV), il 7 gennaio (A. Buttolo [5]).
- 1 ind. sul Monte Serva (BL) tra il 20 e il 27 febbraio (M. Perinotto [1]).
- 1 ind. a Tenuta Ca' da Riva, Venezia, il 2 dicembre (A. Nardotto, C. Bertolin [1] [5] [7]).
- 1 ind. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), il 17 dicembre, quindi 1 ind. a Dosso Alto, Roverè Veronese (VR), tra il 19 e il 28 dicembre (A. Amaretti, M. Azzolini, S. Grossule et al. [3] [5]).
- 1 ind. a Pineta Cassella (RO) tra il 19 e il 29 dicembre (B. Biscuolo, D. Trombin [1] [4] [5]).

Emberizidae

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

- 1 ind. a Bacucco (RO) il 23 maggio, 1 ind. al margine del Biotopo Bonello (RO) il 25 maggio (M. Passarella, M. Tassinari, M. Crivellari, R. Corsi [5]).
- 1 m. in canto a Malo (VI) il 29 maggio (G. Nassi [3]) (fig. 5).

Quella del Delta del Po è la quinta segnalazione per la provincia di Rovigo (DAL FIUME, 1896; SIGHELE et al., 2021, 2022b).

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), il 6 gennaio (B. Balabani [5])

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Si elencano segnalazioni nelle province di Padova e Rovigo, dove la specie è poco frequente.

- alcuni ind. a Porto Levante (RO) il 5 febbraio (M. Cargasacchi [1]).
- 1 ind. tra Fontaniva e Carmignano di Brenta (PD) tra il 12 e il 22 dicembre (F. Moretto [5]).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

- 1-4 ind. lungo il Brenta tra Bassano del Grappa, Cartigliano e Nove (VI) tra il 10 novembre 2021 e il 9 marzo (F. Moretto et al. [5] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1-2 ind. a Maserada sul Piave (TV) tra il 10 gennaio e il 14 marzo (F. Salvini, P. Vacilotto et al. [1] [5] [6]).
- 1-4 ind. lungo il Brenta tra Bassano del Grappa, Cartigliano e Nove (VI) tra il 18 novembre e l'8 marzo 2023 (F. Moretto [5] [6]).
- 1 ind. a Montorio, Verona, il 24 novembre (L. Milione [5]).

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

Si riporta la segnalazione di un individuo marcato.

- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento all'Oasi San Daniele (TV) il 16 gennaio (S. Tasca, L. Visentin), marcato con anello inserito nello stesso sito il 24 gennaio 2016 e ricatturato anche nel novembre 2018 e nel febbraio 2020 (S. Tasca).

Zigolo minore *Emberiza pusilla*

- 1 ind. a Quinto di Treviso (TV) tra il 19 e il 21 aprile (F. Zanatta, F. Salvini, R. Storer et al. [5] [6]) (fig. 6).

SPECIE INTRODOTTE O PRESUMIBILMENTE SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Coturnice orientale *Alectoris chukar*

- 2 ind. a Grumoletto, Monteviale (VI), il 28 maggio (M. Dal Zotto [5]).

Dendrocigna beccorosso *Dendrocygna autumnalis*

- 1 ind. a Malcesine (VR) per tutto l'anno, segnalata qui dal 2016 (R. Boscaini, G. Speranza et al. – SIGHELE et al., 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022b).

Dendrocigna fulva *Dendrocygna bicolor*

- 2 ind. sull'Adige a Nassar, San Pietro in Cariano

(VR), nel mese di dicembre 2021, 1 ind. l'1 gennaio (M. Dosso, M. Sighele [3]).

Oca indiana *Anser indicus*

Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente.

- 1 ind. a Valle Serraglia, Campagna Lupia (VE), il 4 gennaio (M. Bon [5]).
- 1 ind. in volo verso Battaglia Terme (PD) l'11 maggio (P. Vacilotto [5]).
- 5 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 17 novembre (F. Piccolo [5]).

Casarca australiana *Tadorna tadornoides*

- 1 ind. in Sacca del Canarin (RO) il 20 settembre (censimenti Sagittaria).

Anatra sposa *Aix sponsa*

- 3 ind. sul fiume Sile a Treviso il 15 gennaio, 1 m. a Quinto di Treviso (TV) il 30 gennaio (S. Morato, G. Nicola [5]).
- 1 ind. a Nove (VI) tra il 19 gennaio e il 7 febbraio, erano 2 ind. nel dicembre 2021 (F. Moretto, M. Vicariotto [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1 f. a Bassano del Grappa (VI) il 23 gennaio, 1 ind. l'8 maggio (G. Nassi, F. Moretto [5]).
- 2 m. a Morgano (TV) il 7 maggio, 2 m. a Quinto di Treviso (TV) l'1 dicembre (G. Nicola, R. Storer, F. Salvini [5]).
- 1 ind. in Valle Zignago, Caorle (VE), il 29 ottobre (M. Marcuzzo [5]).
- 1 ind. a Piombino Dese (PD) il 24 dicembre (P. Salvador [5]).

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*

- 1 ind. a Motta di Livenza (TV) tra il 2 e il 14 ottobre (A. Lippi, A. Sutto [5]).

Fischione americano *Anas americana*

- 1 ind. a Sant'Erasmo, Venezia, l'11 maggio (E. Staffhorst [5]).

Alzavola beccogiallo *Anas flavirostris*

- 2 ind. a Vedelago (TV) il 27 febbraio (P. Salvador [5]).

Phoenicopterus chilensis* x *Phoenicopterus ruber

- 1 ind. in via delle Valli, Rosolina (RO), il 26 gennaio (D. Trombin [1]).
- 1 ind. in Valle Spolverina, Rosolina (RO), il 9 dicembre, 1 ind. in via delle Valli, Rosolina (RO), il 29 dicembre (F. Guglielmo, M. Cargasacchi [5]).

Verosimilmente si tratta sempre dello stesso individuo, che mostra caratteri intermedi tra le due specie, segnalato sulla costa adriatica dal 2016 (SIGHELE et al., 2017, 2018, 2019, 2021, 2022b).

Tortora diamantina *Geopelia cuneata*

- 1 ind. a Mirano (VE) il 10 luglio (M. Contro [5]).

- 1 ind. a Mirano (VE) il 15 novembre (M. Chillon [5]).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale.

- 1-2 ind. a Sovizzo (VI) tra l'11 dicembre 2021 e l'8 marzo (M. Vicariotto et al. [5] – cfr. SIGHELE et al., 2022b).
- 1 ind. a Pescantina (VR) il 9 gennaio (C. Zanini [3] [5]).
- 10 ind. a Pesina, Caprino Veronese (VR), il 24 novembre, 3 ind. dal 26 novembre al 14 dicembre (C. Zanini, E. Cavallini, M. Guardini, R. Boscaini et al. [3] [5]).
- 1 ind. tra la Sacca di Scardovari e Bacucco (RO) dal 9 dicembre al 12 marzo 2023 (E. Verza et al. [1] [5]).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

- 1 ind. a Padova l'1 aprile (L. Grassi [5]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 25 aprile (F. Moretto [5]).
- 1 ind. a Venezia il 5 maggio (A. Pastorini [5]).
- 1 ind. ad Arsego, San Giorgio delle Pertiche (PD), il 24 maggio (D. de Marchi [5]).
- 1 ind. a Malo (VI) il 7 agosto (G. Nassi [5]).
- 1 ind. a Rosà (VI) il 22 agosto (F. Moretto [5]).
- 1 ind. a Vicenza il 22 dicembre (M. Vicariotto [5] [7]).
- 2 ind. a Treviso il 25 dicembre (A. Zaninoto [1]).

Rosella comune *Platycercus eximius*

- 1 ind. a Villorba (TV) il 14 dicembre (M. Limarilli [5]).

Lorichetto arcobaleno *Trichoglossus haematodus*

- 1 ind. a Negrar di Valpolicella (VR) il 19 agosto (P. Pavan [7]).

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*

- 1 ind. a Tarù, Venezia, il 19 luglio (M. Semenzato [5]).

Inseparabile facciarosa *Agapornis roseicollis*

- 1 ind. a Oderzo (TV) il 23 aprile (G. Sgorlon [5] [7]).
- 1 ind. a Valdagno (VI) il 9 giugno (J. Peruzzo [5] [7]).
- 1 ind. a Parona, Verona, il 9 luglio (R. Steiner [3]).

Inseparabile di Fischer *Agapornis fischeri*

- 1 ind. a Padova il 29 marzo (L. Grassi [5]).

Bengalino comune *Amandava amandava*

- 1 ind. a San Stino di Livenza (VE) il 29 ottobre (A. Sutto [5]).

Canarino *Serinus canaria*

- 1 ind. a Rosà (VI), il 4 aprile (F. Moretto [5]).

SEGNALAZIONI NON INSERITE IN PRECEDENTI
RAPPORTI ORNITOLOGICI

RAPPORTO ORNITOLOGICO ANNO 2021

Codone delle Bahamas *Anas bahamensis*

- 1 ind. recuperato deceduto a Pressana (VR) il 15 dicembre 2021 (fide P. Parricelli).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

- 1 ind. in Lessinia a Malga Pozza Morta, Bosco Chiesanuova (VR), il 25 novembre 2021 (P. Parricelli – cfr. SIGHELE et al., 2022a).

BIBLIOGRAFIA

BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014. La lista CISO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). *Avocetta*, 38: 1-21.

BACCETTI N., FRACASSO G., C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. *Avocetta*, 45: 21-82.

BASSO M., 2022. Censimenti degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (gennaio 2022). *Associazione Faunisti Veneti*, 25 pp.

BONFIO A., 1960. Catture interessanti avvenute nel Veneto. *Riv. ital. Orn.*, 30(2): 142.

DAL FIUME C., 1896. Contributo allo studio dell'avifauna del Polesine. *Atti Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat.*, s.2, v. 3(1), 40 pp.

DE FRANCESCHI P., 1996. Avifauna veronese. Aggiornamenti e analisi dei fattori ecologici che influiscono sulla dinamica di alcune popolazioni. *Atti Mem. Accad. Agric. Sci. Lett. Verona*, 170: 79-99.

DE FRANCESCHI P.F., PARRICELLI P., 2002. Aquila reale, Pellegrino ed altri rapaci diurni in Lessinia. *La Lessinia - Ieri Oggi Domani - Quaderno Culturale*, 25: 103-112.

FANTIN G., 1974. Veneto: un anno importante. *Riv. ital. Orn.*, 44(2): 140-148.

FANTIN G., 1977. Veneto 1976: consuntivo di un anno. *Uccelli d'Italia*, 2: 181-189.

FANTIN G., 1980. Rapporto dal Veneto 1979. *Uccelli d'Italia*, 5: 190-211.

FAVERO L., 1963. Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, 33(1-2): 43-45.

FOSCHI F., 1976. Ettore Arrigoni Degli Oddi (1887-1942). *Uccelli d'Italia*, 1: 97-103.

FOSCHI U.F., BULGARINI F., CIGNINI B., LIPPERI M., MELETTI M., PIZZARRI T., VISENTIN M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica “Arrigoni degli Oddi” del Museo Civico di Zoologia di Roma. *Ric. Biol. Selvaggina*, 97, 176 pp.

FRACASSO G., JANNI O., FULCO E., LIUZZI C., 2018. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 27. *Avocetta*, 42: 45-54.

FRACASSO G., DE FRANCESCHI P., PERCO F., PERCO FR., RALLO G., SPAGNESI M., 1985. Situazione faunistica. In: Leporati L., Perco Fr., Cattani V., Mattedi S., De Franceschi P., Fracasso G., Perco F., Rallo G., Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione Veneto - Giunta Regionale. *Antoniana Spa Industria Grafica*, Padova: 159-252.

GARGIONI A., BELLINTANI S., 2022. La migrazione post-riproduttiva 2022 dei rapaci diurni nel Parco del Mincio (Colline Moreniche del Lago di Garda: BS, MN, VR). *Infomigrans*, 50: 6-7.

GILL F., DONSKER D., RASMUSSEN P. (eds.), 2023. IOC World Bird List (v13.2). doi: 10.14344/IOC.ML.13.2 www.worldbirdnames.org.

HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2022. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 7.0 (December 2022). datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v7_Dec22.zip

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli ornitologi e i birdwatcher che hanno condiviso le loro segnalazioni. Un ringraziamento particolare a Michele Cassol e Aldo Tonelli.

MEZZAVILLA F., SALVINI F., PICCOLO F., SILVERI G., 2022. Migrazione post riproduttiva dei rapaci sopra i Colli Asolani (Maser, TV) - Anno 2020. *Infomigrans*, 50: 16-17.

PAVAN U., 1963. Catture e segnalazioni. *Diana*, 58(6): 73.

PERINI G., 1858. Uccelli Veronesi. *Tip. Vicentini*, Verona, 320 pp.

PICONE M., BASSO M., BERTON F., PANZARIN L., 2023. Prima segnalazione di nidificazione di Gabbiano roseo (*Chroicocephalus genei*) in Laguna di Venezia. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 74: 99-100.

SEMENZATO M., SCARTON F., 1998. Interessanti reperti conservati nella collezione “Americo Giol” di Oderzo (Treviso). *Riv. ital. Orn.*, 68(2): 189-192.

SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2011. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 62: 181-218.

SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2012. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 63: 135-171.

SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2013. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2012. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 64: 81-114.

SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2014. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2013. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 65: 181-213.

SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2016. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2015. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 67: 77-112.

SIGHELE M., BON M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M. (eds.), 2017. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2016. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 68: 71-94.

SIGHELE M., BON M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M. (eds.), 2018. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2017. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 69: 101-127.

SIGHELE M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2019. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2018. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 70: 37-62.

SIGHELE M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2020. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2019. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 71: 89-111.

SIGHELE M., STIVAL E., VERZA E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2021. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 72: 33-58.

SIGHELE M., FANELLI V., SIGHELE G., IZZO C., CHIAPPISI C., ZANINI C., LERCO R., GAETANI S., DALLA LIBERA L. (a cura di), 2022a. Resoconto ornitologico della Lessinia. Anno 2021. *Verona Birdwatching*, 48 pp.

SIGHELE M., STIVAL E., VERZA E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2022b. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2021. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 73: 45-68.

STIVAL E., SIGHELE M., 2019. Atlante FotoSonoro degli Uccelli del Veneto, ed. 2019 – www.birdingveneto.eu/atlasven2019/.

STIVAL E., SIGHELE M., 2022. Check-list degli Uccelli della provincia di Venezia aggiornata al 31.12.2021.

- www.birdingveneto.eu/venezia/index.html
- TONELLI A., RIZZO E., ZAMBOLIN B., BENETTON G., GUGLIEMI R., 2023. Roosting behaviour and phenological aspects of the Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* in the Euganean Hills Regional Park (Padova-Italy). In: Brambilla M., Martinoli A. (eds.), Atti XXI Conv. It. Ornitologia, *CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici*: 112.
- TORMEN G., DE COL S., 2008. Rapaci diurni e notturni della provincia di Belluno. In: Gruppo Natura Bellunese, Atti 2° Convegno Aspetti Naturalistici della provincia di Belluno, Belluno 23.11.2008, *Tipografia Piave*, Belluno: 183-217.
- VERZA E., SARTORI A., GRION M., RAVAGNANI A., STIVAL E., 2023a. Censimento del fenicottero (*Phoenicopterus roseus*) presso le zone umide della costa alto adriatica (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) - Inverno 2022. www.birdingveneto.eu/feniday/.
- VERZA E., VALLE R., ZANELLA L., CORVINO R., SARTORI A., 2023b. Avifauna acquatica nidificante in provincia di Rovigo Anno 2022. www.birdingveneto.eu/pubbl/RO_nidificanti_2022.pdf

SITOGRAFIA

Birding Veneto: www.birdingveneto.eu
 Venezia BW: groups.google.com/g/veneziabw
 Verona BW: www.veronabirdwatching.org
 Delta Po BW: www.facebook.com/groups/DeltaPoB

Ornitho: www.ornitho.it
 EBN Italia/ubird: www.ebnitalia.it – www.ubird.ebnitalia.it
 iNaturalist: www.inaturalist.org
 ebird: ebird.org

INDIRIZZI DEGLI AUTORI

Maurizio Sighele - Associazione Verona Birdwatching; Birding Veneto
 Emanuele Stival - Associazione Venezia Birdwatching; Birding Veneto
 Roberto Corvino - Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria; Birding Veneto
 Niccolò Fagotto - Birding Veneto
 Vittorio Fanelli - Associazione Verona Birdwatching
 Gloria Feltrin - Birding Veneto
 Fabio Moretto - Birding Veneto
 Giacomo Sgorlon - Birding Veneto
 Leonardo Visentin - Associazione Venezia Birdwatching; Birding Veneto
 Tomaso Bisol - Birding Veneto
 Alessandro Sartori - Laboratorio della Biodiversità Rurale
 Emiliano Verza - Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria; Birding Veneto