

GLI STERCORARI NEL BASSO GARDA ORIENTALE (VERONA) E NEL VENETO

Maurizio Sighele
Associazione Verona Birdwatching



Le quattro specie di stercorari note per l'Italia sono state segnalate in provincia di Verona già nel XIX secolo, soprattutto per catture sul Lago di Garda, ma anche in Lessinia o nelle Grandi Valli Veronesi (ogni bonificate). Proprio dalla bassa veronese proviene l'unica segnalazione provinciale di **stercorario maggiore** (*Stercorarius skua*), il 1° ottobre 1882, che corrisponde anche alla prima conosciuta per il Veneto e per l'Italia intera.

Sono poche le segnalazioni provinciali di **stercorario mezzano** (*Stercorarius pomarinus*), tutte riferite a oltre 100 anni orsono, quando la specie era considerata rara, ma non rarissima, per catture perlopiù nel Garda, ma anche in Lessinia. Anche nel resto del Veneto la specie è sempre stata considerata piuttosto sporadica.

Di comparsa irregolare in regione erano anche **labbo** (*Stercorarius parasiticus*) e **labbo codalunga** (*Stercorarius longicaudus*); in provincia di Verona erano comunque considerati abbastanza frequenti, in particolare il secondo, anche se non ci sono molte catture o pubblicazioni che confortino queste affermazioni, che forse presumevano una sottostima di informazioni per queste specie pelagiche, difficili da osservare dalla costa anche nel bacino del Garda.


Negli ultimi anni l'aumento d'interesse verso il *seawatching* anche in Veneto sembrerebbe confermare l'ipotesi soprattutto per il labbo, oggi visitatore regolare dell'alto Adriatico, dove sono ancora scarsi, da ritenersi irregolari, labbo codalunga e stercorario mezzano. L'osservazione dalla costa ha inoltre permesso di contattare occasionalmente anche lo stercorario maggiore.

Tra il 2010 e il 2014 l'osservazione mirata dalla costa integrata dall'uso di natanti ha portato un certo numero di osservazioni di stercorari anche nel basso Garda veronese, in particolare tra la prima decade di settembre e la seconda di ottobre; a parte 1-2 casi, si è trattato quasi sempre di individui nati nell'anno.

Il piumaggio giovanile, associato alla distanza di osservazione e alla verosimile scarsa esperienza con queste specie, ha reso però assai difficile l'identificazione specifica e solo l'utilizzo di barche per avvicinare e fotografare questi soggetti ha reso possibile una corretta determinazione, lasciando molti interrogativi per gli individui vagliati esclusivamente dalla costa. È suggestivo in tal senso come la presenza di labbo codalunga sia sempre stata accertata grazie a immagini documentative, mentre tutte le osservazioni dalla distanza siano state comunicate come labbo.

Negli ultimi cinque anni nel basso Garda veronese sono stati osservati con certezza labbo, labbo codalunga e nel 2014, dopo oltre un secolo, anche alcuni individui di stercorario mezzano.

segnalazioni di stercorari in Veneto dal 2000 ad oggi



Veneto: anni di segnalazione	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stercorario maggiore															
Stercorario mezzano															
Labbo															
Labbo codalunga															
Labbo sp.															

Lago di Garda (VR): anni di segnalazione	2010	2011	2012	2013	2014
Stercorario mezzano					
Labbo					
Labbo codalunga					
Labbo sp.					

colori pieni in caso di determinazione con conferma fotografica